This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

6000300631

8.190. a. 4.

E. BIBL. RADCL.

1619 e. 227. 1

Lehrbuch

der

Gynäkologie,

oder

systematische Darstellung der Lehren

von Erkenntniß und Behandlung eigenthümlicher gesunder und krankhafter Zustände, sowohl der nicht schwangern, schwangern und gebärenden Frauen, als der Wöchnerinnen und neugebornen Kinder.

Zur

Grundlage akademischer Vorlesungen,

und zum Gebrauche für praktische Aerzte, Wundärzte und Geburtshelfer,

ausgearbeitet

von

Carl Gustav Carus,

Dr. der Philosophie, Medicin und Chirurgie, Professor der Entbindungskunst an der medicinisch-chirurgischen Akademie zu Dresden, und Director des dasigen Königl. Sächs. Hebammeninstituts, der Kais. Leopoldin. Akademie zu Bonn, der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Erlangen, der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der naturforschenden zu Leipzig, der Kön. Sächs. ökonomischen und der mineralogischen zu Dresden Mitglied.

Erster Theil.

Mit einer Kupfertafel.

Leipzig, bey Gerhard Fleischer.

1820.

Vorrede.

Wenn die Lehre von der Behandlung gesunder und krankhafter Zustände des weiblichen Körpers überhaupt, und besonders während des höchstwichtigen Zeitpunktes der Geburt, in neuer Zeit, verglichen mit dem Zustande in welchem sie sich noch vor ungefähr hundert Jahren befunden, so große Fortschritte gemacht hat, so verdanken wir dieses unfehlbar außer dem Einflusse des Fortschreitens gesammter ärztlicher Wissenschaft, doch insbesondere der auch in diesem Zweige nach und nach immer mehr verlöschenden widernatürlichen Trennung zwi-

schen Chirurgie und Medicin. Man darf sicher behaupten daß vorzüglich die Behandlung des Geburtsgeschäfts wenig ersprießliche Folgen haben konnte, so lange sie als bloßes Conglomerat gewisser mechanischer Fertigkeiten erschien, die Beobachtung eigentlicher lebendiger Wirksamkeit des Organismus aber fast ausgeschlossen blieb, und man darf sogar überhaupt annehmen daß Krankheiten des weiblichen Körpers, so lange dem Arzte nicht eine klare Einsicht in die eigenthümliche Natur dieses Geschlechts vorschwebte, nur wenig naturgemäß behandelt werden konnten. Die Erkenntniß dieser Wahrheiten hat nun allmählig immer mehr auf Vernichtung der engen Grenzen, worin die Entbindungskunst sich eingezwängt sah, hingewiesen, und darauf gedrungen, die Lehre von der Hülfsleistung bei der Geburt nur als eine besondere Disciplin der Lehre von der Natur und Behandlung des weiblichen Körpers überhaupt anzuerkennen. Männer wie Boër, mein trefflicher ehemaliger Lehrer Professor Jörg, Schmidmüller, Nolde, Schmitt, Faust, haben in diesem Sinne gelehrt und geschrieben, und wie ich mich selbst praktisch mehr mit diesem Zweige der Heilkunde befaßte, vorzüglich aber

ſeit ich 1814 die Direktion einer bedeutenden Entbindungsanſtalt überkam, wurde mir dieſes ſo zur feſten Ueberzeugung, daß ich nicht nur nach dieſen Grundſätzen meine Vorträge ordnete, ſondern fortwährend darauf bedacht war, Materialien zu ſammeln, um eine Darſtellung der geſammten Gynäkologie, welche als Ganzes bisher noch nirgens abgehandelt iſt, einſt daraus zu geſtalten.

Nachdem ich endlich mit der Ausarbeitung meiner naturwiſſenſchaftlichen Studien zu einem Ganzen, durch die Herausgabe meiner Zootomie, nicht ſowohl abgeſchloſſen, ſondern mich nur durch Ordnung des Erworbenen zu weitern Forſchungen vorbereitet und erleichtert hatte, ſchritt ich zur Ausführung dieſes Plans, welche Arbeit jetzt dem Publikum zu übergeben ich mich im Begriff ſehe. Ich lege dieſe Schrift fortwährend meinen Vorträgen zum Grunde, und würde mich freuen wenn auch andere Lehrer dieſelbe für gleichen Zweck zu benutzen angemeſſen fänden, habe denn auch deßhalb durchgängig einer Präciſion nachgeſtrebt, wodurch die Betrachtung der vielfachen hierher gehörigen Gegenſtände, welche in anderen Werken (z. B. dem in 4 Bänden noch nicht

geschlossenen schätzbaren Lehr- und Handbuche über Entbindungskunst und Frauenzimmerkrankheiten des H. v. Siebold) in einem größern Umfange abgehandelt worden sind, in dem Raum zweier Bände zu beendigen möglich wurde. Demungeachtet hat mich indeß diese Rücksicht auch nicht abhalten können, bey möglicher Kürze doch den einzelnen Gegenständen diejenige Ausführung zu geben, wodurch dieses Buch zugleich Handbuch für angehende Aerzte, und überhaupt zum Nachschlagen für besondere Fälle im praktischen Leben brauchbar werden konnte; denn was den mündlichen Vortrag betrifft, so glaube ich nicht, daß er etwa nur dadurch indem er dem Zuhörer einige Kenntniße welche in dem absichtlich gewählten dürftigen Compendium fehlen, mittheilt (obwohl man sie in jedem andern Handbuche leicht nachlesen kann), sondern dadurch seine wahre Bedeutung erfüllt, daß er durch lebendiges Wort und Wechselrede den Sinn für das selbstthätige Eindringen in irgend eine Wissenschaft erwecke. —

Mit Beifügung literarischer Notizen glaubte ich nur sparsam verfahren zu müssen, da ich es hier für

die Hauptaufgabe hielt, zunächst die Sache selbst, und zwar das Geprüfte und durch Erfahrung Bewährte, klar und bestimmt darzustellen. — Daß die zweckmäßige Benutzung des von Andern Geleisteten hierbei nicht übergangen ist, wird man hoffentlich bemerken, jedoch auch sich überzeugen daß ich, wo die Natur mir einen andern Weg zeigte, durchaus keiner bloßen Autorität gefolgt bin. Außer den literarischen Hülfsmitteln und in manchen schwierigen Punkten dem Rath gelehrter Freunde, unter denen ich insbesondre meine verehrten Collegen Hofrath Seiler und Kreysig zu nennen mich verpflichtet fühle, habe ich so viel als möglich durchgängig auf Naturbeobachtung mich gestützt, wozu mir insbesondre die seit 1814 in den Annalen der Entbindungsanstalt genau aufgezeichneten mehr als tausend Geburtsfälle Materialien liefern konnten, und so unterwerfe ich mit dem Bewußtseyn überall das Beste treu beabsichtigt zu haben, diese Arbeit dem Urtheile sachkundiger Richter.

Der Druck dieses ersten Theils war übrigens bereits im vorigen Jahre beendigt, und wenn er selbst erst jetzt erscheint, so ist es nur um den zweiten Theil,

welcher die physiologischen und pathologischen Zustände der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen umfassen wird, diesem ersteren in kurzer Zeit nachfolgen zu lassen.

Dresden, d. 1. Mai 1820.

Dr. C. G. Carus.

Inhalt

des ersten Theils der Gynäkologie.

Einleitung . . . . . Seite 1

I. Allgemeine Gynäkologie.

Erster Abschnitt. Von den Eigenthümlichkeiten im Baue und Leben des Weibes (allgemeine Physiologie) . . . . . — 15

1) Eigenthümlichkeiten in der Gesammtform des weiblichen Körpers . . . . . — —

2) Eigenthümlichkeiten im Baue der weiblichen Geschlechtstheile und des weiblichen Beckens . . . — 20

I. Zeichenlehre der weiblichen Geschlechtstheile . . — 35

II. Zeichen des regelmäßig gebildeten Beckens . . — 40

3) Eigenthümlichkeiten der weiblichen physischen und psychischen Lebensäußerungen . . . . . — —

Zweiter Abschnitt. Von der Eigenthümlichkeit in den Krankheiten des weiblichen Geschlechts (allgemeine Pathologie . . . . . — 57

Dritter Abschnitt. Von der ärztlichen Behandlung des weiblichen Organismus im gesunden und kranken Zustande (allgemeine Diätetik und Therapie . Seite 61

I. Von der Persönlichkeit des Frauenarztes und Geburtshelfers . . . . . — 62

II. Von der Art und Weise die verschiedenen Zustände des weiblichen Körpers auszumitteln und zu untersuchen.

1) Untersuchung durch Gesicht und Getast.

a) die äußerliche . . . . . — 68

b) Innere Manualuntersuchung. . . . . — 72

2) Instrumental-Untersuchung . . . . . — 76

III. Von den allgemeinen Regeln der Diätetik und Therapie für das weibliche Geschlecht.

a) Diätetik . . . . . — 80

b) Therapie . . . . . — 84

II. Specielle Gynäkologie.

Erster Theil.

Vom Leben des Weibes an und für sich, im gesunden und kranken Zustande.

Erster, physiologisch-diätetischer Abschnitt.

I. Von der normalen Entwickelung, Reife und Ertödtung des Geschlechtscharakters . . . . . — 89

II. Von den Regeln der Diätetik während der drei weiblichen Lebensperioden insbesondere . . . . — 98

Zweiter, pathologisch-therapeutischer Abschnitt.

Erste Abtheilung. Von den Krankheiten in der ersten Lebensperiode des weiblichen Körpers . . . . — 101

I. Von den angebornen Fehlern weiblicher Genitalien.

1) Von krankhaften Bildungen der äußern Geschlechtstheile . . . . . Seite 101

2) Von krankhaften Bildungen der innern Geschlechtstheile . . . . . — 104

II. Von der krankhaft zu zeitig entwickelten Pubertät — 106

Zweite Abtheilung. Von den Krankheiten in der Zeit der Geschlechtsreife . . . . . — 113

I. Allgemeine Krankheitszustände.

1) Unregelmäßigkeiten der Menstrualfunktion . . — 114

A. Mangelnde oder verzögerte Entwickelung der Menstrualfunktion . . . . . — 115

B. Unvollkommene Menstruation . . . . . — 127

C. Uebermäßiges Hervortreten der Menstrualfunktion — 143

D. Hemmung oder Unterdrückung der Menstrualfunktion — 151

2) Besondere durch Unregelmäßigkeiten der Pubertätsentwickelung begründete Krankheitszustände . — 156

1. Verstimmung der Reproduktion während der Pubertätsentwickelung.

Bleichsucht . . . . . — 158

2. Verstimmung der animalen Funktionen während der Pubertätsentwickelung . . . . . — 172

3) Mutterwuth, Mannstollheit . . . . . — 216

4) Unfruchtbarkeit . . . . . — 221

5) Hysterie, Mutterbeschwerung . . . . . — 231

II. Krankheitszustände der einzelnen weiblichen Geschlechtsorgane . . . . . — 253

I. Krankheiten der Gebärmutter.

A. Störungen des Bildungstriebes.

1) Entzündung der nicht schwangern Gebärmutter . Seite 264

2) Wurfluß der nicht schwangern Gebärmutter . . — 272

3) Weißer Fluß, Schleimfluß der weiblichen Geschlechtstheile . . . . . — 294

4) Wassersucht der nicht schwangern Gebärmutter — 309

5) Von den verschiedenen fleischigen, steinigen oder knochernen Auswüchsen der nicht schwangern Gebärmutter . . . . . — 326

6) Von den polypösen Auswüchsen an der innern Fläche der Gebärmutter . . . . . — 326

7) Von der krebsartigen Verhärtung und dem offenen Krebse der Gebärmutter . . . . . — 339

B. Abnorme Lagen der nicht schwangern Gebärmutter.

1) Vorfall der nicht schwangern Gebärmutter . . — 364

2) Schieflagen der nicht schwangern Gebärmutter.

a) Vornüberbeugung . . . . . — 379

b) Rückwärtsbeugung oder Zurückbeugung . . . — 381

3) Umkehrung oder Umstülpung der nicht schwangern Gebärmutter . . . . . — 383

II. Krankheiten der Mutterscheide . . — 388

1) Von den Mutterscheidenpolypen . . . . . — —

2) Von dem Vorfalle der Mutterscheide . . . . — 389

3) Von dem Mutterscheidenbruche . . . . . — 393

Mittelfleischbruch . . . . . — 399

III. Krankheiten der Eierstöcke . . . . — 400

1) Entzündung der Eierstöcke . . . . . — —

2) Wassersucht der Eierstöcke . . . . . — 406

3) Von den Speck- und Fleischgeschwülsten, Verknöcherungen, so wie von Erzeugung fremder Körper in den Eierstöcken . . . . . Seite 412

IV. Krankheiten der Brüste . . . . . — 414

1) Krankhafte Entwickelung der Brüste in den Zeugungsfähigen Jahren überhaupt.

1) Congestionen nach den Brüsten und Schmerzhaftwerden derselben . . . . . — 415

2) Unvollkommene Ausbildung der Brüste und vorzeitiges Welken derselben . . . . . — 417

3) Uebermäßige Ernährung und Fettanhäufung um dieselben . . . . . — 418

2) Besondere Degenerationen im Innern der Brüste . . . . . — 419

1) Von den Milchknoten in den Brüsten . . . . — 420

2) Von den skrophulösen Verhärtungen der Brüste . — 422

3) Von den Balggeschwülsten der Brüste . . . . — 423

4) Lymphatische und Blutgeschwülste der Brüste . . — 427

5) Vom Skirrhus und Krebs der Brüste . . . . — 428

V. Von einigen krankhaften Zuständen der äußern Geburtstheile . . . . . — 441

VI. Von einigen krankhaften Zuständen der weiblichen Harnwege . . . . . — 445

1) Von der beträchtlichen Erweiterung der Harnröhre — —

2) Gefäßgeschwulst der Mündung der Harnröhre und Verdickung der die Harnröhre umgebenden Zellhaut, nebst varikösser Beschaffenheit ihrer Gefäße . — 447

3) Von den Steinbeschwerden des weiblichen Geschlechts . . . . . — 449

Dritte Abtheilung. Von den Krankheiten in der letzten Lebensperiode des weiblichen Körpers . . . Seite 454

I. Zu zeitiges Erlöschen der Menstrualfunktion . . — 455

II. Von der zu lange fortdauernden Menstrualfunktion . . . . . — 457.

Erklärung der zum ersten Theile gehörigen Kupfertafel — 459.

Lehrbuch
der
Gynäkologie.

Einleitung.

§. 1.

Viel des Eigenthümlichen und Beachtungswerthen sowohl seiner Bildung, als seinem Leben nach, bietet der weibliche Körper jeder aufmerksamen physiologischen und ärztlichen Forschung dar. Abgesehen sogar von den eigentlichen Werkzeugen des Geschlechts, finden wir so viel Ausgezeichnetes im Wesen und in der Art weiblicher Organisation, sehen dieß Alles auf so regelmäßige und merkwürdige Weise sich entfalten, nehmen wahr so mannigfaltiger Aeußerungen eines besondern Lebens, vom Erscheinen der Geschlechtsreife an, durch die höchste Entwicklung des Fortpflanzungsvermögens bis zum Erlöschen dieser Thätigkeit hin, und bemerken endlich in alle diesen Perioden so eigenthümliche, nur in diesem Körper mögliche Krankheitszustände, daß dieß uns wohl berechtigen darf, auch diesen Kreis in sich streng verbundener Naturerscheinungen, gleich so manchem andern, als ein geschlossenes Ganze, als einen abgesonderten, für sich bestehenden Zweig der Natur- und namentlich der Heilwissenschaft zu betrachten.

§. 2.

Indem es nun in vorliegender Arbeit unser Zweck ist, eine Uebersicht sämmtlicher hierher gehöriger Gegenstände, in so weit sie den ärztlichen Wirkungskreis berühren, zusammen-

zustellen; so glauben wir dieselben unter dem Namen der Gynäkologie*) schicklich vereinigen zu dürfen. Ohne demnach das Wort Gynäkologie in seiner weitesten Bedeutung zu nehmen (so wenig als wir dieß bey andern ähnlichen Worten z. B. Physiologie zu thun gewohnt sind) definiren wir es als: die Lehre von der Eigenthümlichkeit des weiblichen Körpers, seinem Bau, seinem Leben, seinen Krankheiten und der ihm angemessenen so diätetischen als ärztlichen Behandlung nach.

§. 3.

So gewiß aber im Allgemeinen der volle Begriff eines Theiles nur erlangt wird aus der wohlaufgefaßten Idee des Ganzen, so unmöglich es z. B. seyn würde eine treue Vorstellung vom Leben eines besondern Organs zu erhalten, ohne deutliche Ansicht des gesammten organischen Körpers, so unzweckmäßig scheint es auch zu seyn, wenn die Geschichte einiger besondern Vorgänge des weiblichen Lebens aus dem Ganzen der Gynäkologie herausgerissen und als eine in sich beschlossene Lehre dargestellt werden soll. Demohnerachtet hat ein solches Verfahren rücksichtlich der Geburtshülfe bisher fast allgemein Statt gefunden, und wir werden leicht hierin den Grund davon erkennen können, daß eben die Geburtshülfe bisher einer strengern wissenschaftlichen Ordnung so sehr ermangelte, ja sogar ihr Begriff von Verschiedenen auf so verschiedene Weise erfaßt wurde.

§. 4.

Streng genommen ist aber Entbindungskunde oder Geburtshülfe nur die Lehre von den Hülfsleistungen bey der Geburt, und doch, wer wird zu jeder dieser Hülfsleistungen geschickt seyn, wenn er nicht zugleich die Kenntniß der Schwangerschaft, des weiblichen Beckens und dergl. mit sich

*) Von γυνη, γυναικος Weib und λογος Wort, Lehre.

bringt? — welcher Geburtshelfer wird den an ihn gemachten Anforderungen entsprechen können, dafern er nicht vom normalen und abnormen Verlauf des Wochenbetts eine naturgemäße Ansicht sich erworben hat? — und wie endlich, können alle diese merkwürdigen Vorgänge des weiblichen Lebens begriffen werden ohne Erlangung einer klaren Idee vom Wesen und Charakter des weiblichen Körpers überhaupt?

§. 5.

Diese Bedürfnisse fühlend wurde nun das System der Geburtshülfe oft ein Aggregat der heterogensten Bestandtheile. Von einem Verfasser wurden ausführlichere anatomische Beschreibungen mit aufgenommen, von einem Andern die Krankheiten der Wöchnerinnen zugleich mit abgehandelt, von einem Dritten blos die Geschichte normaler und abnormer Geburten mit den nöthigen Vorkenntnissen aus der Schwangerschaftslehre durchgegangen und die Beschreibung der geburtshülflichen Operationen beigefügt, wieder andere wollten sie blos auf Kenntniß mechanischer Hülfsleistungen beschränken u. s. w., kurz man ließ weg, setzte zu, richtete ein, alles nach Willkühr, und wenn auch bey so verschiedenen Richtungen die Kunst im Ganzen bedeutend gefördert wurde und das Fortschreiten der Physiologie auch auf manche Punkte dieser Disciplin ein helleres Licht warf, so äußerte sich doch noch im Innern der Mangel wahrer wissenschaftlicher Gesetzmäßigkeit, ein Mangel welcher so lange gefühlt werden wird, als man etwas, das, gleich der Geburtshülfe, nur Fragment eines größern Ganzen ist, als ein für sich Bestehendes aufstellen will.

§. 6.

Bereits haben zwar mehrere scharfsinnige Gelehrte in diesem Fach das Unvollständige der Geburtshülfe durch Ausarbeitung eigener Schriften über die Krankheiten des weiblichen Geschlechts zu ergänzen, und so aus diesen beiden Theilen ein geordnetes Ganze zu schaffen gesucht; allein selbst diese Trennung scheint noch zu gewaltsam, da in der Natur

Rückkehr zu einem frühern Zustande, der Periode der Decrepidität entsprechen wird. In allen diesen drei Perioden ist sonach nicht mehr das Weib an und für sich, sondern im Verhältniß und in Wechselwirkung, mit einem zweiten in ihm Entstandenen, Gegenstand der Untersuchung, und so wie man daher längst sich genöthigt sah, den Körper und das Leben des Kindes bey der Geschichte der Geburt ausführlicher zu berücksichtigen, so wird es nun, bei einer umfassendern Behandlung nothwendig, das Erzeugte, gleichsam als einen Theil, als ein vom Mutterkörper aus ernährtes Gebild, seiner mannigfaltigen normalen sowohl als abnormen Beschaffenheit nach in allen jenen drei Perioden zu betrachten.

§. 11.

Es wird sich auf diese Weise der Plan für die ganze Gynäkologie in folgendem Schema darlegen lassen:

I. Das Allgemeine.

1) Vom Bau und Leben des Weibes (allgemeine Physiologie).
2) Von der Natur weiblicher Krankheiten (allgemeine Pathologie).
3) Von der Behandlung des weiblichen Organismus im gesunden und kranken Zustande (allgemeine Hygiastik und Therapie).

II. Das Besondre.

I. Vom Leben des Weibes an und für sich.

1. Entwicklung des Geschlechtscharakters.

a) Physiologie und Diätetik dieser Entwicklung. b) Pathologie und Therapie derselben.

2. Geschlechtsreife.

a) Physiologie und Diätetik der Geschlechtsreife. b) Pathologie und Therapie derselben.

3. Absterben des Geschlechtscharakters.

a) Physiologie und Diätetik dieser Periode. b) Pathologie und Therapie derselben.

II. Vom Leben des Weibes im Verhältniß zu einem Erzeugten.

1. Schwangerschaft.

a) Physiologie und Diätetik der Schwangern und Physiologie des Erzeugten. b) Pathologie und Therapie der Schwangern und Pathologie des Erzeugten.

2. Geburt.

a) Physiologie und Diätetik der Gebärenden u. des Geborenen. b) Pathologie und Therapie der Gebärenden u. des Geborenen.

3. Wochenbett und Stillungsperiode.

a) Physiologie und Diätetik der Wöchnerin, der Stillenden u. des Säuglings. b) Pathologie und Therapie der Wöchnerin, der Stillenden und des Säuglings.

Anmerkung. Es zeigt sich in diesem Schema, daß man die Abtheilung II der besondern Gynäkologie auch mit dem gemeinsamen Namen der Entbindungskunde (im weitern Sinne des Worts, denn im engern begriffe es nur die Physiologie, Diätetik, Pathologie und Therapie der Geburt), so wie die physiologische, diätetische und pathologische Seite dieser Abtheilung als Bereich der Hebammenkunst ansehen kann. Daß wir übrigens die Physiologie, Pathologie und Therapie des Erzeugten während der Schwangerschaft und Geburt so wie des Neugebornen selbst, hier mit aufnehmen, wird außer den §. 10. erwähnten Gründen, auch dadurch nothwendig, daß wir bedenken, wie selbst krankhafte Zustände des Erzeugten so vielfach auf den mütterlichen Körper überwirken. Was endlich die Art und Folge der Abhandlung dieser Gegenstände betrifft, so wird es am zweckmäßigsten seyn sowohl im ersten als zweiten speciellen Theile, erst das Physiologische und Diätetische durchzugehen und dann das Pathologische und Therapeutische desselben folgen zu lassen.

§. 12.

Die Art des Studiums der Gynäkologie ist, gleich dem der übrigen Zweige der Heilkunde, um nicht zu sagen der Naturwissenschaft überhaupt, eine dreifache. Gynäkologische Kenntnisse nämlich werden erworben durch mündlichen Unterricht, durch Benutzung der vorhandenen Schriften und durch Beobachtung der Natur selbst. Kein Weg von diesen dreien allein leitet indeß zum rechten Ziel, denn auf dem letzten versinken wir leicht in rohe Empirie, auf dem zweiten wird eine praktisch unhaltbare Gelehrsamkeit erworben, und der erstere kann das jurare in verba magistri wohl veranlassen. Wünschenswerth bleibt es daher stets, alle drei Verfahren zu einigen, obwohl für die vollkommenere Ausbildung, das Beobachten der überall unerschöpflichen Natur, in welcher erst viele Erfahrung uns recht einheimisch machen kann, das Wesentlichste bleiben wird. — Daß übrigens dem Studium der Gynäkologie immer viele und mannigfaltige Vorkenntnisse vorhergehen müssen, liegt wohl am Tage,

und als die wichtigsten hierher gehörigen erwähnen wir 1) die allgemeinen Lehren der Mathematik und besonders der Mechanik, 2) menschliche und vergleichende Anatomie und Physiologie, 3) Pathologie, Materia medica und Therapie, 4) Chirurgie.

§. 13.

Von der Eigenthümlichkeit in der praktischen Anwendung der Gynäkologie wird zum Theil noch ausführlicher bei Berücksichtigung derjenigen Eigenschaften die Rede seyn, welche den Frauenarzt und Geburtshelfer auszeichnen müssen, hier nur von der angenehmen, und von der Kehrseite dieses Zweiges der Heilkunde einige Worte. — Theilt nämlich auch die Behandlung des weiblichen und kindlichen Körpers mit Ausschluß der Geburtsperiode ziemlich die Vortheile und Nachtheile ärztlicher Praxis überhaupt, so ist doch die eigentliche Geburtshülfe um so mehr von letzterer unterschieden. — Als angenehme Seite geburtshülflicher Kunstübungen dürfen wir aber namentlich zählen: eine mehr gesicherte, auf festern zum Theil mathematischen Grundsätzen beruhende Physiologie, Pathologie und Therapie, so wie die so oft sich darbietende Möglichkeit schnelle und entscheidende, daher auch dankbarer anerkannte Hülfe zu leisten. Als Nachtheile hingegen sind die vielfachen, mit dieser Praxis unzertrennlich verbundenen geistigen und namentlich körperlichen Anstrengungen, die Widerwärtigkeit, um nicht zu sagen Ekelhaftigkeit mancher Untersuchungen und Operationen, ja selbst die nicht geringe von Ansteckungen u. s. w. zu befürchtende Gefahr zu erwähnen. — Ob man übrigens bey Behandlung von Frauen und Kindern im Allgemeinen für die dem Arzte durch Unfolgsamkeit, Nachlässigkeit, Redseligkeit, übermäßige Reizbarkeit u. s. w. veranlaßten Beschwerden, die Beobachtung und Behandlung einer zärtern und feinern Organisation als einigen Ersatz gelten lassen will, wird der Neigung und Eigenthümlichkeit des Arztes überlassen bleiben.

§. 14.

So wäre es denn am Schlusse dieser Einleitung vielleicht nur noch übrig von den Schicksalen der Gynäkologie

bei der Entwicklung der Wissenschaften überhaupt das Wichtigere zu erwähnen, zugleich aber auf die einzelnen Männer und ihre Werke hinzuweisen, welchen diese Disciplinen insbesondre eine weitere Bildung und Bereicherung verdanken; allein die Masse hierhergehöriger Nachrichten und Angaben ist groß und weitläuftig; eine ausführliche Bearbeitung derselben kann daher in einem Werke dessen Bestimmung es ist die geprüftesten und möglichst ersprießlichen Grundsätze der Wissenschaft selbst aufzustellen, keinen Platz finden, und einen flüchtigen Abriß davon zu geben (wie es in einigen Handbüchern geschehen ist) verschmähen wir um so mehr, da durch eine halbe Kenntniß überall wenig gewonnen ist, und besondere, das Ganze umfassende Schriften hierüber nicht fehlen *). Indem wir sonach auf diese sowohl, als

*) Unter den Werken welche die Geschichte der Gynäkologie von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten darlegen, verdient unstreitig neben der auch diesen Zweig berücksichtigenden Geschichte der Medicin von C. Sprengel,

Fr. B. Osiander's Lehrbuch der Entbindungskunst. 1r Thl. Literarische und pragmatische Geschichte dieser Kunst. Göttingen. 1799. 8.

den ersten Platz, denn obwohl hierin eigentlich nur ein Theil der Gynäkologie ins Auge gefaßt wird, sind doch auch die Fortschritte der Wissenschaft in den übrigen Theilen keineswegs unbeachtet geblieben. Ferner gehören hierher: theils eine Literarhistorie der Entbindungskunst von Le Roi, übers. 1779, theils die noch bessere Schrift:

Le Sue gelehrte und kritische Versuche einer Geschichte der Geburtshülfe a. d. Fr. Altenburg 1786. 2 Thle. 8. (das Original erschien 1779.)

Ferner geben eine tabellarische Geschichtsübersicht der Gynäkologie:

J. F. Schweighäuser tablettes chronologiques de l'histoire de la médecine puerpérale. Strasb. 1806. 8. —

so wie die (obwohl zunächst für Entbindungskunst berechneten)

Zeittafeln im theoretischpraktischen Handbuche der Geburtshülfe von Lud. Friedr. v. Froriep. 6te Aufl. Weimar 1818.

Und endlich sind auch noch einigen andern Lehrbüchern der Geburtshülfe Geschichtserzählungen angehängen: so unter den ältern den Werken von Smellie und Astruc, unter den neuern außer dem von Froriep auch dem Versuche eines vollständigen Systems d. Geburtshülfe von Fr. Hain v. Martens. (Leipzig 1804.)

hinsichtlich der Menge besonderer Abhandlungen über einzelne gynäkologische Gegenstände auf die Werke über Literatur der Medicin im Allgemeinen verweisen *) ist nur noch zu bemerken, daß am Schlusse oder auch im Texte der einzelnen Abschnitte stets eine Auswahl von den geprüftesten, auch dem angehenden Frauenarzt nothwendigen Werken, wo möglich mit einigen den Inhalt kurz andeutenden Worten aufgeführt werden sollen. — So viel indeß scheint hier zu erwähnen unerläßlich, daß, wenn es hier unternommen wird, die Gynäkologie unter den Neuern zuerst in ihrer Gesammtheit als medicinische Wissenschaft aufzustellen,

*) Was die Aufzählung einzelner über gynäkologische Gegenstände erschienener Schriften betrifft, so verweisen wir vorzüglich auf

Guil. God. Ploucquet Literatura medica digesta s. Repertorium medicinae practicae, chirurgiae atque artis obstetriciae T. I—IV. Tub. 1808. 4. u. Supplem. Tub. 1813. 4. (Hauptwerk.)

K. Fr. Burdach Literatur der Heilwissenschaft. 2 Bde. 1810. 8.

J. S. Ersch, Literatur der Medicin seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. Leipz. 1812. (Als kurzes, freilich auch für diesen Zeitraum nicht vollständiges Handbuch, zu empfehlen.)

Auch erschienen mehrere literarische Sammlungen für Gynäkologie insbesondre, welche indeß meist nur kurze Zeit fortgesetzt worden sind. Dahin gehören:

D. H. Römer Annalen d. Gebrtshülfe, Frauenzimmer- u. Kinderkrankheiten für 1790—91. Winterthur 1793—94.

F. H. Martens kritisches Jahrbuch der Geburtshülfe 1802. und ein ähnliches von J. A. Schmidtmüller 1807. So wie denn zum Theil auch die allgem. gelehrten Zeitschriften und noch mehr die Journale f. Chirurgie u. Geburtshülfe, z. B. die Stein'schen Annalen, Mursinna's Journal f. Chirurgie, Stark's Archiv, v. Siebold's Lucina u. deren Fortsetzung als Journal f. Geb.hlf. u. s. w., die Salzburger Zeitungen und die Allgemeinen medicin. Annalen hier aufzuführen sind. Endlich aber ist zu bemerken daß auch in einzelnen Handbüchern, z. B. in v. Siebold's theoret. prakt. Lehrbuche der Entbindungsk. so wie in dessen Handbuche zur Erkenntniß u. Heilung d. Frauenzimmerkrankheiten, und im theoret. prakt. Handbuch d. Geburtshülfe v. Lud. Fr. v. Froriep die Literatur über die meisten Gegenstände der Gynäkologie ziemlich vollständig aufgeführt ist.

doch deshalb dieses Unternehmen nicht überhaupt als früher gänzlich unversucht betrachtet werden dürfe, indem vielmehr gerade die ältesten Schriften über diese Gegenstände keine Trennung zwischen Geburtshülfe und Frauenkrankheitslehre anerkannten, wovon theils die dem Hippokrates zugeschriebenen Bücher, theils Moschions, theils des Octavii Horatiani Gynäcia, theils des Albertus magnus, und Anderer Schriften Zeugniß geben, welche man der Mehrzahl nach in einzelnen Sammlungen *) abgedruckt finden kann. — Doch ist es ja wohl das Schicksal der meisten Wissenschaften, daß zwar schon der erste Blick in ihr Feld den Gesammtkreis derselben ahnen läßt, späterhin aber die größere Ausbildung einzelner Zweige mannigfaltige Spaltungen nöthig macht, bis denn endlich die Vereinigung der getrennten Theile zu einem Ganzen unumgänglich nothwendig wird.

*) Eine solche Sammlung wurde z. B. von Conrad Gesner begonnen, von Casp. Wolf weiter geführt, von Casp. Bauhin u. später von Israel Spach erneut und zwar unter dem Titel: Gynaeciorum sive de mulierum tum communibus, tum gravidarum parientium, et puerperarum affectibus et morbis, Libri Graecorum, Arabum, Latinorum veterum et recentium quotquot extant etc. Argentin. 1597. Fol.

I.

Allgemeine Gynäkologie.

Erster Abschnitt.

Von den Eigenthümlichkeiten im Baue und Leben des Weibes (allgemeine Physiologie).

§. 15.

Bevor wir den weiblichen Körper in den einzelnen Stadien seines Lebens betrachten und verfolgen können, ist es nöthig theils ein allgemeines Bild der Eigenthümlichkeit seiner Organisation wie seines Lebens darzulegen, theils gewisse Organe, deren Bildung und Verrichtung für das weibliche Leben vorzüglich wichtig sind, einer genauern Betrachtung zu unterwerfen.

1. Eigenthümlichkeiten in der Gesammtform des weiblichen Körpers.

§. 16.

Stellen wir einen wohlausgebildeten männlichen und einen ähnlichen weiblichen Körper einander gegenüber, so ergeben sich alsbald die beträchtlichsten und bedeutungsvollsten Verschiedenheiten, deren Wesentliches, um es sogleich im Ganzen anzudeuten, auf Vorwalten der für Assimilation

und Reproduktion bestimmten Gebilde, oder (was eben hierdurch begründet wird) auf ein Hinneigen zum Typus des nicht vollkommen ausgebildeten, des kindlichen Körpers zurückgeführt werden kann.

§. 17.

Wichtig ist zuvörderst in dieser Hinsicht die allgemeine Körpergröße. Das Weib ist der Regel nach kleiner als der Mann, es ist dieß das Resultat der früher beendigten, beschränkten individuellen Entwicklung, deren Ursache wiederum aus der mehr hervorgehobenen geschlechtlichen Productivität sich ergeben wird. Eben aber weil die geringere Körpergröße die Folge einer frühzeitiger beschränkten Entwicklung ist, zeigen auch Kopf, Rumpf und Glieder andere Verhältnisse als im männlichen, länger fortwachsenden, zu größerer Reife gelangenden Körper, und eben diese Eigenthümlichkeit der Verhältnisse ist es, welche vorzüglich die Annäherung an die kindlichen Formen zeigt und jetzt noch eine nähere Bestimmung fordert.

§. 18.

Zunächst aber das Verhältniß des Rumpfs zu den Gliedern angehend, so sind die letztern durch die Zärtheit und geringere Länge ihrer Knochen, wie durch die weniger ausgewirkten Muskeln (eine Eigenthümlichkeit des weiblichen Körpers überhaupt) besonders ausgezeichnet. Der zartere Bau ist es, welcher sich in den obern Gliedmaaßen vornehmlich, und zwar an der schlankern Form des Ober- und Vorderarms so wie in der schmälern Hand zu erkennen giebt; die geringere Länge der untern Gliedmaaßen ist dagegen namentliche Ursache der verringerten Länge des ganzen Körpers, als welche aus dem Baue des Rumpfes allein keineswegs sich ergeben würde. Also wie bey dem Kinde der Rumpf zu den Gliedern verhältnißmäßig größer ist als bey den Erwachsenen, so auch, obwohl in geringerem Verhältnisse, im weiblichen Körper.

§. 19.

Am Rumpfe selbst fällt sogleich der größere Umfang des Unterleibes im Verhältniß der Brust (wieder wie beym Kinde) in die Augen, der ganze Rumpf, welcher bey dem Manne eine mit der Basis nach oben gerichtete Pyramide darstellt, zeigt hier das umgekehrte Verhältniß und wird aufwärts nach der Schultergegend zarter und schmäler, die Bauchfläche selbst tritt gewölbter hervor, die Darmbeine weichen mehr auswärts, die Schambeine schließen sich in einem stärker gewölbten Bogen und aus dieser breitern Basis des Rumpfes sind ferner die stärkern Schenkelmuskeln und breitern Hüften erklärlich. Innen untersucht, zeigt die weibliche Bauchhöhle ebenfalls, theils größere Länge (von der längern Säule der Lendenwirbel abhängig), theils, und zwar besonders abwärts, größere Weite (oberwärts, wo sie vom Thorax mit umschloßen wird, ist sie etwas enger als beym Manne). Eben so ist daher der Darmkanal verhältnißmäßig länger, die Leber (als lungenartiges, als Absonderungsorgan, und im obersten Theile der Bauchhöhle liegend), kleiner.

§. 20.

Die Brusthöhle betreffend, so ist sie von schlankern, gebogenern Rippen, mit verhältnißmäßig längern Rippenknorpeln und schwächern geradern Schlüßelbeinen umgeben, ihr Raum, der äußern Form entsprechend, beschränkter, und die darin befindlichen Organe, namentlich Herz und Lungen, kleiner. Mit letzterm Umstande zeigt sich ferner die Eigenschaft der Stimmwerkzeuge in nothwendiger Verbindung und wir beobachten deßhalb eine engere 5 — 6 Knorpelringe mehr haltende Luftröhre, und einen engern, etwas höhern, elastischern, an der Vorderfläche mehr abgerundetern Kehlkopf.

§. 21.

Diese Verschiedenheiten sind nun in Beziehung auf die oben (§. 16.) erwähnten allgemeinen Bildungsmomente von besonderer Wichtigkeit. 1) Der Körper, seinem Stoffwechsel

nach betrachtet, zeigt uns nämlich in der Athmungs- und Absonderungs-Funktion ein stätes Verflüchtigen und Abscheiden organischen Stoffes, welches eben so stätig dann durch Assimilation eingenommener Stoffe compensirt wird. Eben deßhalb sehen wir dann das Verhältniß überwiegender Produktivität im Weibe durch das Ueberwiegen der, namentlich der Assimilation bestimmten Bauchhöhle über die der Athmung bestimmten Brusthöhle ausgesprochen, ja in der doch im Ganzen größern Bauchhöhle wieder die Leber verhältnißmäßig kleiner. 2) Wie die niedern Thiergattungen, z. B. Fische, einen Rumpf besitzen, welcher noch fast nichts als Bauchhöhle ist, wie die Bauchhöhle auch im Rumpfe des menschlichen Fötus die Brusthöhle außerordentlich und je früher um so mehr überwiegt, so erscheint auch im Weibe dieses Verhältniß als eine zum Typus niederer oder unvollendeter Organisation sich hinneigende Eigenthümlichkeit. 3) Wie in den niedriger stehenden Thiergattungen, z. B. Fischen, oder in den noch unvollkommen entwickelten Fötus die Knochen und Muskeln, kurz die Bewegungsorgane verhältnißmäßig weniger ausgearbeitet sind, wie überhaupt größere Muskelthätigkeit und stärkere so wie ausgedehntere Respiration gewöhnlich (z. B. bey dem Vogel) sich verbunden finden, so hängt mit dieser Beschränkung der Respiration und überwiegenden Produktivität, der schlankere, zartere Knochen*)- und Muskelbau des Weibes zusammen. 4) Die größere Bauchhöhle ferner, so wie der längere Darmkanal, entspricht eben so der stärkern Assimilation, als 5) die geringere Entwicklung der Brusteingeweide, die Neigung zu Brustkrankheiten und der zartern (kindlichern) Stimme.

§. 22.

Die Verhältniße am Kopfe des Weibes endlich, zeigen abermals ein deutliches Hinneigen zur kindlichen Form, und zwar theils in dem feinern Knochenbau desselben, theils in den weniger entwickelten Zügen des Gesichtes, der kleinern

*) Am Weibe haben die Knochen nur ungefähr $\frac{1}{20}$, im Manne $\frac{1}{18}$ der gesammten Körperschwere.

Nase, den nicht so hervorgehobenen Wangenbeinen, vorzüglich aber in dem, dem Kinde so eigenthümlichen Uebergewichte des Schädels gegen das Antlitz, welches Verhältniß, obwohl in geringerem Grade, auch am Weibe bemerklich ist. Es steht ferner wieder mit dem Bau des Schädels in genauestem Zusammenhange, wenn das Gehirn im Weibe verhältnißmäßig größer und schwerer als im Manne gefunden wird, so daß, obwohl das Rückenmark in beiden ziemlich gleich ist*), doch im Weibe das Gehirn, auch im Verhältniß zum Rückenmark, mehr als im Manne prädominirt, wobey wir wieder an das im Manne größere, im Weibe schwächere Vermögen willkührlicher Bewegung denken müßen.

§. 23.

Was die Nerven und Gefäße des Weibes betrifft, so finden die erstern sich im Allgemeinen, und ihrem Verhältniße zum Gehirn nach, so wie das Rückenmark selbst, feiner, mit Ausnahme der Riechnerven, welche durch ihre größere Stärke wieder an die starken Riechnerven des Kindes erinnern. Eben so scheinen dann endlich auch die Arterien im Verhältniße des kleinern Herzens von geringerer Weite (die zu den Geschlechtsorganen gerichteten Stämme ausgenommen); wenn hingegen die Venen offenbar ein Erweiterungsvermögen besitzen, welches im männlichen Körper nur selten beobachtet wird, und wodurch diese Gefäße an den wichtigsten Funktionen des weiblichen Körpers auf das Entschiedenste Theil nehmen. Eine ähnliche Bewandtniß scheint es mit den Saugadern zu haben, deren hier größere Entwicklung und Thätigkeit mit dem schnellern organischen Stoffwechsel des weiblichen Körpers in genauer Verbindung steht.

§. 24.

Endlich, nachdem wir allgemeine Körpergröße, so wie die Verhältniße der einzelnen Körpergegenden und der wichtigern innern Organe betrachtet haben, bleibt uns noch die

*) Ich fand es bey einigen Wägungen ganz gleich.

nach betrachtet, zeigt uns nämlich in der Athmungs- und Absonderungs-Funktion ein stätes Verflüchtigen und Abscheiden organischen Stoffes, welches eben so stätig dann durch Assimilation eingenommener Stoffe compensirt wird. Eben deßhalb sehen wir dann das Verhältniß überwiegender Produktivität im Weibe durch das Ueberwiegen der, namentlich der Assimilation bestimmten Bauchhöhle über die der Athmung bestimmten Brusthöhle ausgesprochen, ja in der doch im Ganzen größern Bauchhöhle wieder die Leber verhältnißmäßig kleiner. 2) Wie die niedern Thiergattungen, z. B. Fische, einen Rumpf besitzen, welcher noch fast nichts als Bauchhöhle ist, wie die Bauchhöhle auch im Rumpfe des menschlichen Fötus die Brusthöhle außerordentlich und je früher um so mehr überwiegt, so erscheint auch im Weibe dieses Verhältniß als eine zum Typus niederer oder unvollendeter Organisation sich hinneigende Eigenthümlichkeit. 3) Wie in den niedriger stehenden Thiergattungen, z. B. Fischen, oder in den noch unvollkommen entwickelten Fötus die Knochen und Muskeln, kurz die Bewegungsorgane verhältnißmäßig weniger ausgearbeitet sind, wie überhaupt größere Muskelthätigkeit und stärkere so wie ausgedehntere Respiration gewöhnlich (z. B. bey dem Vogel) sich verbunden finden, so hängt mit dieser Beschränkung der Respiration und überwiegenden Produktivität, der schlankere, zartere Knochen*)- und Muskelbau des Weibes zusammen. 4) Die größere Bauchhöhle ferner, so wie der längere Darmkanal, entspricht eben so der stärkern Assimilation, als 5) die geringere Entwicklung der Brusteingeweide, die Neigung zu Brustkrankheiten und der zartern (kindlichern) Stimme.

§. 22.

Die Verhältniße am Kopfe des Weibes endlich, zeigen abermals ein deutliches Hinneigen zur kindlichen Form, und zwar theils in dem feinern Knochenbau desselben, theils in den weniger entwickelten Zügen des Gesichtes, der kleinern

*) Am Weibe haben die Knochen nur ungefähr $\frac{1}{100}$, im Manne $\frac{1}{75}$ der gesammten Körperschwere.

Nase, den nicht so hervorgehobenen Wangenbeinen, vorzüglich aber in dem, dem Kinde so eigenthümlichen Uebergewichte des Schädels gegen das Antlitz, welches Verhältniß, obwohl in geringerem Grade, auch am Weibe bemerklich ist. Es steht ferner wieder mit dem Bau des Schädels in genauestem Zusammenhange, wenn das Gehirn im Weibe verhältnißmäßig größer und schwerer als im Manne gefunden wird, so daß, obwohl das Rückenmark in beiden ziemlich gleich ist*), doch im Weibe das Gehirn, auch im Verhältniß zum Rückenmark, mehr als im Manne prädominirt, wobey wir wieder an das im Manne größere, im Weibe schwächere Vermögen willkührlicher Bewegung denken müßen.

§. 23.

Was die Nerven und Gefäße des Weibes betrifft, so finden die erstern sich im Allgemeinen, und ihrem Verhältniße zum Gehirn nach, so wie das Rückenmark selbst, feiner, mit Ausnahme der Riechnerven, welche durch ihre größere Stärke wieder an die starken Riechnerven des Kindes erinnern. Eben so scheinen dann endlich auch die Arterien im Verhältniße des kleinern Herzens von geringerer Weite (die zu den Geschlechtsorganen gerichteten Stämme ausgenommen); wenn hingegen die Venen offenbar ein Erweiterungsvermögen besitzen, welches im männlichen Körper nur selten beobachtet wird, und wodurch diese Gefäße an den wichtigsten Funktionen des weiblichen Körpers auf das Entschiedenste Theil nehmen. Eine ähnliche Bewandtniß scheint es mit den Saugadern zu haben, deren hier größere Entwicklung und Thätigkeit mit dem schnellern organischen Stoffwechsel des weiblichen Körpers in genauer Verbindung steht.

§. 24.

Endlich, nachdem wir allgemeine Körpergröße, so wie die Verhältniße der einzelnen Körpergegenden und der wichtigern innern Organe betrachtet haben, bleibt uns noch die

*) Ich fand es bey einigen Wägungen ganz gleich.

Eigenthümlichkeit der Körperoberfläche zu berücksichtigen übrig. Auch diese aber deutet durch ihre Beschaffenheit wieder bestimmt auf die oben (§. 16. u. 21.) angegebenen Hauptmomente. — Die Hautfläche nähmlich ist weicher, wellenförmiger, weniger Umrisse von Knochen und Muskeln zeigend, theils wegen geringerer Entwicklung der letztern, theils wegen stärkerer Unterlage von Fett und Zellgewebe in Folge der vermehrten Produktivität, zugleich aber wieder selbst im zartern Baue des Hautorgans, die Annäherung an den Typus eines kindlichen Körpers darstellend. Dasselbe gilt endlich auch von den Produktionen der Haut; das Haar ist weicher, feiner, länger, üppiger hervorkeimend, allein wie im Kinde auf kleinere Flächen beschränkt, so daß Mund, Kinn und After unbedeckt von Haaren bleiben, ja auch am übrigen Körper auf Brust, Ober- und Unterschenkel eine sparsamere Entwicklung beobachtet wird.

2. Eigenthümlichkeiten im Baue der weiblichen Geschlechtstheile und des weiblichen Beckens.

§. 25.

Ohne die ausführlichere anatomische Beschreibung hier zu berücksichtigen, haben wir für jetzt nur auf diejenigen Momente in der Entwicklungs-Geschichte und in der vollendeten Form dieser Theile zu achten, welche für die Physiologie des weiblichen Körpers überhaupt und namentlich für die Geschichte der Schwangerschaft und Geburt von Wichtigkeit seyn können.

§. 26.

Die Geschlechtstheile betreffend, so nehmen wir hier zuerst auf die Bildung der innern Geschlechtstheile, und zwar insbesondere auf die des Fruchtbehälters und seiner Fortsetzungen Rücksicht, indem von den Eyerstöcken nur eben die Einfachheit und Gleichförmigkeit ihrer Struktur Erwähnung verdient. — Untersuchen wir nähmlich die Eyerstöcke

anderer Thierklassen, z. B. der Vögel, der Amphibien u. s. w. so nehmen wir wahr, daß sie bey diesen als aus wirklichen Eykeimen zusammengesetzt erscheinen, welche, indem sie nach, oder auch vor der Befruchtung sich absondern, das deutlich sichtbare Material zur Bildung des Fötus abgeben. Selbst bey mehreren Säugethieren ist eine solche Zusammenhäufung von Eybläschen am Eyerstocke noch sichtbar; z. B. bey mehreren Nagethieren, den Hasen, Kaninchen u. s. w., da hingegen in den menschlichen Ovarien bekanntlich die Eybläschen so undeutlich werden, daß mehrere Physiologen (neuerlich Wilbrand) die Bildung des Embryo aus einem von den Ovarien kommenden Keime geläugnet haben, womit wir indeß um so weniger übereinstimmen können, da auch an den menschlichen Ovarien die Narben abgelöster Eykeime deutlich zu sehen sind. Von der Bedeutung dieser Eigenthümlichkeit der Ovarien und namentlich des menschlichen Weibes kann indeß erst späterhin bey der Geschichte der Empfängniß und Schwangerschaft die Rede seyn.

§. 27.

Was ferner die Bildung der Fallopischen Röhren, des Fruchthälters und der Scheide betrifft, so ist es zuvörderst nothwendig, um eine naturgemäße Vorstellung von Entstehung ihrer Form, und der Eigenthümlichkeit ihres Lebens zu erhalten, alle drei Theile, als ein Continuum, als einen aufwärts getheilten Y förmigen Gang zu betrachten, wie wir im Embryo, und in tiefern Thierklassen dann diese Form wirklich, nämlich als bloßen Eyergang (Oviductus), und zwar entweder einfach (wie bey den Vögeln), oder doppelt (wie bey den Amphibien und Fischen) antreffen. *) In dieser Gestalt erscheint ein solcher Kanal vollkommen darmartig, mündet noch oft (wie bey den Amphibien und Vögeln) in den untern Theil des Darmkanals, erscheint dadurch gleichsam als Anhang desselben und erinnert dadurch eines Theils an die Fortpflanzung der niedrigsten Thiergattungen, wo, wie bey vielen Pflanzen-

*) S. mein Lehrbuch der Zootomie S. 611 u. f.

thieren, der Darmkanal selbst Geschlechtshöhle ist, so wie andern Theils dadurch der in der Thätigkeit von Geschlechts- und Verdauungswerkzeugen, als ursprünglich gleichartigen Theilen, so deutlich bemerkbare Consensus erklärt wird.

§. 28.

Wie nun überhaupt die fortschreitende organische Ausbildung wesentlich in immer größerer Theilung nach verschiedenen Richtungen begründet ist, so zeigt sich nun auch bey der Entwicklung des Thierkörpers das Trennen dieses einfachen oder doppelten Eyerganges in mehrere Theile. Bey der Mehrzahl der Säugethiere nämlich bildet sich die untere Abtheilung beider Ovidukten (Fallopischen Röhren) in einen Fruchthälter aus, welcher ebendeßhalb als zweihörnig (Uterus bicornis), d. i. Vförmig erscheint. Diese Hörner werden dann bey der aufsteigenden Thierreihe immer kürzer, bis im menschlichen Uterus (obwohl auch dieser jene Bildungsstadien durchläuft) nur die Stelle des Zusammentreffens beyder Eyergänge sich bestimmter als Fruchthälter entwickelt, weßhalb dann auch die Bildung desselben am untersten Ende, nämlich am eigentlichen Punkte der Vereinigung beyder Gänge, d. i. am Muttermunde früher als an den obern Theilen vervollständigt wird. Untersucht man daher den Uterus eines neugeborneu Mädchens, so findet man den Grund desselben noch sehr klein, die Höhle wenig, d. i. nicht mehr als den Kanal des Mutterhalses entwickelt, den äußern Muttermund hingegen sehr groß, die Wände des Mutterhalses stärker, als die des Gebärmutterkörpers, kurz man darf sagen, daß in dieser Periode die Region des Scheidentheils des Uterus, die Region der Fruchthöhle, eben so bestimmt überwiegt, als bey vollendeter Entwicklung der Fruchthälterkörper und Grund den Scheidentheil überwiegt; ja es wird dieß noch auffallender, wenn man an die Entwicklung des Uterus in der Schwangerschaft denkt, wo die Höhle eine so außerordentliche Ausbildung erlangt und die Vaginalportion zuletzt völlig verschwindet (vergl. Tab. I. Fig. I. u. II.).

§. 29.

Weit entfernt indeß, daß der Uterus, als mehr entwickelter Theil des gesammten Fruchtganges (Fallopische Röhren, Uterus und Scheide), von der darmartigen Struktur dieses ursprünglichen Gebildes gänzlich abweichen sollte, so zeigt sich vielmehr in diesem Organe die Urbildung des gemeinsamen Ganzen in ihrer vollsten Ausbildung, ohngefähr auf gleiche Weise, wie das Herz die ausgezeichnetst entwickelte Stelle des Gefäßsystems genannt werden kann. Gerade so nämlich wie der Ovidukt eyerlegender Thiere gleich dem Darmkanale 1) aus einer äußern, vom Bauchfelle herrührenden Haut, 2) aus einer Muskelhaut, 3) aus einer Gefäß- und Nervenhaut, und 4) aus einer innersten Flockenhaut besteht, so auch der gesammte Fruchtgang des menschlichen Weibes, und namentlich der aus ihm entwickelte Uterus, an welchem man den untern Theil, die Vaginalportion, gleichsam als eine Einschiebung in die Mutterscheide (Intussusceptio) betrachten kann; so wie die bedeutende Lage der (namentlich venösen) Gefäßgeflechte als Gefäßhaut, und die, vorzüglich zur Zeit der Schwangerschaft so äußerst bestimmt entwickelte Faserlage, als Muskelhaut betrachtet werden muß.

§. 30.

Im Uterus finden wir sonach alle die Gebilde, welche der ihm eigenthümlichen Thätigkeitsform entsprechen, mit vollkommenster Bestimmtheit vor: nämlich 1) Gefäße, als der bildenden Thätigkeit entsprechend (wobey vorzüglich das am allerstärksten während der Schwangerschaft bemerkbare Uebergewicht der Venen physiologisch wichtig ist, indem die Venen überhaupt als die frühern und verhältnißmäßig weniger entwickelten Gefäße des weiblichen Organismus vorherrschend sind (§. 13.), und an seiner stärkern Produktivität mehr, als man wohl bisher gemeynt hat, Antheil nehmen); 2) Nerven, obwohl in minderer Anzahl, und verhältnißmäßig zum Uterus (namentlich denselben in schwangerm Zustande gedacht) keineswegs bedeutend. Auch dieser Punkt seiner Or-

ganisation ist aber in so ferne wichtig, als damit gerade das außerordentlich thätige Bildungsvermögen des Organs zusammenhängt. Im ganzen Thierreiche sehen wir nämlich die Thätigkeit der Reproduktion, und die Entwicklung des Nervensystems im umgekehrten Verhältniße; Thiere, bey welchen gar kein, oder nur ein sehr unvollkommenes Nervensystem nachzuweisen ist, zeigen das größte Reproduktionsvermögen (man denke z. B. an die ungeheuere Regenerationskraft der Polypen, der Krebse, Schnecken, Salamander u. s. w.), ja selbst im Menschen sehen wir die nervenlosen Gebilde der größten Regeneration fähig, z. B. der Haare, Nägel u. s. w. Es ist also hiermit vollkommen im Einklange, wenn der Uterus überhaupt, und namentlich in der Gegend des Körpers und Grundes, nervenärmer gefunden wird, die Gegend des Muttermundes aber empfindlicher und nervenreicher sich zeigt, indem das letztere eben sowohl mit der zur Empfängniß nöthigen Reitzung, als das erstere mit der außerordentlichen Entwicklung des obern Gebärmuttertheils in der Schwangerschaft zusammenhängt.

§. 31.

Die Muskelfasern endlich sind als integrirende Theile des Uterus bekanntlich von mehreren Anatomen und Physiologen (noch neuerlich von Wenzel) geläugnet worden, wir haben daher die Gründe anzuführen, welche uns zu deren Annahme berechtigen. Nämlich 1) die Bildungsgeschichte des Uterus als eines vollkommen darmartigen Gebildes, 2) die Analogie, indem bey dem darmartigen Uterus der größern Säugethiere, selbst im ungeschwängerten Zustande, die Muskelfasern deutlichst erscheinen; 3) die unläugbare Anwesenheit von starken Faserlagen am schwangern menschlichen Uterus, welche ihrer Farbe, Gestalt, und ihrem Verlaufe nach ganz mit den Faserlagen der Harnblase u. s. w. übereinstimmen, und welchen man nicht etwa aus dem Grunde die muskulöse Beschaffenheit absprechen darf, weil sie außer der Schwangerschaft beynahe unmerklich sind, indem a) der Uterus in der Schwangerschaft erst als in seiner wahrhaften und vollkommenen Ausbildung begriffen anzusehen ist, und

es folglich damit sehr übereinstimmt, wenn wir außer dieser Periode nicht alle seine Gebilde bestimmt entwickelt finden, eben so, wie z. B. niemand im Stande seyn wird, an dem noch nicht vollkommen entwickelten Darmkanal des Embryo, die Muskelfasern sichtlich darzustellen; b) ferner kann aber auch das Ausbilden der Muskelfasern in der Schwangerschaft, und späterhin das wieder Verwischtwerden derselben, so wie ihre Reproduktion in einer künftigen Schwangerschaft keineswegs als etwas der Natur so widersprechendes angesehen werden, indem in einem Gebilde dessen Produktivität im Allgemeinen so sehr überwiegt, auch Erscheinungen dieser Art, so wenig als das Wiedererzeugen von Gliedern mit allen Muskeln bey Krebsen und Salamandern, unmöglich bleiben. 4) Die Thätigkeitsäußerungen des Uterus, in welchen wir das Wirken einer außerordentlich starken Bewegkraft nicht verkennen dürfen, als eine Kraft, deren Organ im ganzen thierischen Organismus eben die Muskelfaser ist. 5) Das Aufregen dieser Thätigkeit durch Reitze, welche überhaupt Muskulartháthigkeit zu erwecken pflegen, wohin theils mechanische Reitzung gehört (so z. B. erwecken Friktionen des Unterleibes Wehen), theils aber insbesondere der galvanische Reitz als das eigentlichste Reagens für Muskelfaser zu rechnen ist (bekanntlich sah Reil schon das Zusammenziehen des darmartigen trächtigen Uterus in frisch getödteten Kaninchen unter Anwendung des Galvanismus; Versuche, welche ich mit gleichem Erfolge wiederholte).

§. 32.

Rücksichtlich der Fallopischen Röhren und der Scheide, so ergiebt sich nun ferner schon aus dem Vorigen, daß diese als weniger entwickelte Theile des allgemeinen Fruchtganges (§. 27. 28.) angesehen werden müssen, folglich das Wesentliche ihrer Organisation noch mit der des Fruchthälters übereinstimmen wird, beiden daher auch dieselben Lagen von Membranen eigen sind, mit Ausnahme der Scheide, welcher der Ueberzug des Bauchfelles abgeht. Unstreitig ist es hingegen, daß beiden, gleich dem Uterus, Gefäße und Muskelfasern zukommen, von welchen letztern, daß sie in den Fallopischen

Mähren verbunden sind, die bey Säugethieren bestimmt nach-zuweisende peristaltische Fortbewegung des Eyes, Zeugniß abgiebt, so wie von der muskulösen Struktur der Scheide an-dem Theils, die am Eingange derselben verdichteten Faserlagen (Constrictor cunni), ferner die Querfaltung der innern Haut (gerade dieselbe Erscheinung zeigt sich auch am entleerten Darme), und endlich mehrere, z. B. bey der Geburt, der Nachgeburt, wahrnehmbare Thätigkeitsäußerungen derselben Beweise liefern.

§. 33.

Der Brüste endlich gedenken wir hier unter den Geschlechtstheilen noch insbesondere, um theils auf die Gründe ihres für die praktische Anwendung der Gynäkologie so wichtigen Consensus mit dem Uterus hin zu weisen, theils gewisse Eigenthümlichkeiten ihrer Struktur bemerklich zu machen. — Wenn nämlich überhaupt das Geschlechtssystem gleichsam nur als ein dem lebendigen Körper eingepflanzter Theil anzusehen ist, so daß auch ohne dasselbe die individuelle organische Existenz allerdings möglich bliebe (obwohl nicht die Existenz der Gattung), so gilt dieß vorzüglich auch von den Ernährungsorganen des Fötus im menschlichen Weibe, und namentlich von den Brüsten. Auf sehr merkwürdige Weise nämlich ist die Brustdrüse gleichsam wie der Mutterkuchen an den Uterus, so auf die äußere Fläche des Thorax geheftet (die Placenta wurde daher schon von alten Physiologen als Mamma uterina bezeichnet); dort empfängt sie die Säfte, welche noch nach der Geburt zur Ernährung des Kindes erfordert werden, und welche in niedern Klassen dem Jungen sogleich vom Eyerstocke aus als Dottersack, als gemeinsamer Chylusbehälter mitgetheilt zu werden pflegen, hier aber, nachdem sie zuvor im Fruchthälter selbst dem Fötus zugeführt worden, zu den Brüsten sich wenden. — Fruchthälter und Brüste sind also in dieser Hinsicht von gleicher Bedeutung, und daher der im Leben derselben deutlich bemerkbare Zusammenhang; denn nicht sowohl in Verbindung von einzelnen Nervenfädchen und Gefäßen (z. B. wollten Einige den Consensus zwischen Uterus

und Brüsten aus der Anastomose der epigastrischen Gefäße und der Art. mammaria interna erklären) ist die Begründung solcher Mitleidenschaft zu suchen, sondern eben in der organischen Bedeutung und ursprünglichen Gleichartigkeit oder Entgegensetzung verschiedener Theile, weßhalb dann auch manche durch Nerven und Gefäße nahe verbundene Theile keinen Consensus zeigen, da hingegen bey andern, wo diese Verbindung als sehr unerheblich erscheint, die Mitleidenschaft bedeutend ist.

§. 34.

Bey der Bildung der Größe insbesondere ist ferner theils auf ihre, dem Uterus völlig gleichmäßige Entwicklung überhaupt Rücksicht zu nehmen, theils die Gleichmäßigkeit des Verlaufes der Milchadern nach der Warze, und der Blutadern nach dem Nabelstrange an der Placanta zu bemerken; in welcher letztern Hinsicht auch erwähnt zu werden verdient, daß selbst bey Thieren eine Uebereinstimmung der Placenta und Brüste in so weit statt findet, so daß demnach bey Thieren, wo das Chorion am Eye die Stelle der Placenta vertritt, auch die Brüste sehr platt sind (z. B. beym Pferde), da hingegen, wo am Eye viele Placenten sich finden, auch die Zahl der Zitzen sich vervielfacht (z. B. bey der Kuh mit 4 Zitzen für ein Junges), und endlich bey mehrfach werfenden Thieren die Zahl der Jungen (folglich auch die Zahl der Placenten) mit der der Zitzen übereinstimmt (z. B. bey Hunden). — Es wird hierdurch erklärlich, daß und warum auch bey verschiedenen menschlichen Individuen die Eigenthümlichkeit der Brüste in der Regel mit der der Placenten übereinstimmen werde, so wie umgekehrt die Placenta für die Prognose des Stillungsgeschäftes wichtig wird, wovon weiter unten das Nähere.

§. 35.

Wir kommen nun zur Betrachtung des Beckens, als eines knöchernen Kanals, durch welchen das Kind bey der Geburt hindurchgetrieben wird, und in welchem die innern Geschlechtsorgane enthalten sind. In ersterer Hinsicht werden

und sonach die Dimensionen und verschiedenen Richtungen der einzelnen Beckengegenden interessiren, in letzterer physiologischer Hinsicht muß uns die der Entwicklung der Geschlechtstheile gleichmäßige Entwicklung der gesammten Beckenform merkwürdig seyn. Wir beginnen, mit Uebergehung der Zusammensetzung desselben aus Knochen und Bändern, bey der Eintheilung und Ausmessung desselben.

§. 36.

Das ganze Becken also theilen wir in das große und kleine Becken (Cavitas pelvis major s. superior et minor s. inferior), so zwar, daß die über den Vorberg (Promontorium) und den obern Rand des Schambogens verlaufende ungenannte Linie (Linea innominata) die Gränze beyder abgiebt. — Die Höhle des großen Beckens nun insbesondere betrachtet, welche von hinten durch die Lendenwirbelsäule, von der Seite durch die schieflaufenden Darmbeinflächen, und von vorne durch die weichen Bauchwände begränzt wird, zeichnet sich aus durch eine, oben breite und weite, abwärts verengerte, also beynahe trichterförmige Höhle, deren Querdurchmesser im wohlgebauten weiblichen Körper, von der Mitte eines Hüftbeinkammes bis zum andern, 9 bis 10 Pariser Zoll beträgt, wo dagegen ihre Breite am Eingange ins kleine Becken bis auf 5 Zoll verringert erscheint. — Für den Verlauf des Geburtsgeschäftes nun, so wie für den Zustand der Schwangerschaft, ist diese Trichterform in mehrerer Hinsicht wichtig; einmal nämlich, indem dadurch der schwangere Uterus die sicherste und angemessenste Unterstützung erhält, andern Theils, indem durch diese schiefen Flächen, namentlich das Einrichten der Längenachse des Kindes in die Führungslinie des Beckens, und das Eintreten des Kindeskopfes in das kleine Becken vorbereitet und erleichtert, ja sogar bedingt wird.

§. 37.

Mannigfacher begränzt, und deßhalb schwerer auszumessen, ist der Raum des kleinen Beckens, an welchem folgende drei Gegenden daher besonders betrachtet und ausge-

meſſen werden: — 1) der Eingang (Apertura pelvis superior), eine von der ungenannten Linie begränzte Fläche; 2) die Höhle (Cavitas pelvis minoris), eine Fläche, deren Umfang durch eine in die Verbindung des zweiten und dritten falſchen Kreuzwirbels und in die Mitte des Schambogens gelegte Kreislinié beſtimmt wird; 3) der Ausgang (Apertura pelvis inferior), welcher von den untern Rändern des Ossis sacri und coccygis, ſo wie den Ligamentis sacrotuberosis und sacrospinosis, und endlich von den ossibus ischii, pubis und der symphysis ossium pubis beſtimmt wird.

§. 38.

Die Dimenſionen dieſer Gegenden ſind beym wohlgebauten weiblichen Körper, und zwar nach dem hierbey üblichen Pariſer Maaß, folgende: 1. im Eingange a) der gerade Durchmeſſer Diameter recta s. conjugata) vom obern Rande der Schamfuge bis zum Vorberge = 4 Zoll, b) der Querdurchmeſſer (Diameter transversa) von den ausgeſchweifteſten Stellen zu beiden Seiten der ungenannten Linie = 5 Zoll, c) die ſchrägen oder Deventer'ſchen Durchmeſſer (Diametri obliquae), deren erſter von der rechten Kreuz- und Darmbeinverbindung (Symphysis sacro-iliaca) bis zur linken Scham- und Darmbeinverbindung (Synostosis pubo-iliaca), deren zweiter von der linken Kreuz- und Darmbeinverbindung bis zur rechten Scham- und Darmbeinverbindung reicht = 4½ Zoll. 2.) In der Beckenhöhle a) der gerade Durchmeſſer, von der Verbindung des zweiten und dritten falſchen Kreuzwirbels bis zur Mitte der Schamfuge = 4½ Zoll, b) der Querdurchmeſſer, von einem Sitzbeinſtachel (spina ossis ischii) zum andern = 4 Zoll. (Auch zieht man wohl noch eine Diagonalconjugata, Behufs der Anwendung innerer Beckenmeſſer, von der Mitte der Schamfuge bis zum Vorberge, eine Linie, welche dann der Conjugata der Beckenhöhle gleich, alſo 4½ Zoll, gefunden wird, und folglich aus ihrer Größe auch einen Schluß auf die Conjugata des Beckeneinganges erlaubt.) — 3. Im Beckenausgange: a) der gerade Durchmeſſer, vom untern Rande der Schamfuge bis zur Spitze des Schwanzbeines

= 3½ Zoll (beym Zurückweichen des Schwanzbeines jedoch auf 4 bis 4¼, ja 4½ Zoll vergrößert); b) der Querdurchmesser, von einem Sitzhöcker (Tuberositas ossis ischii) zum andern = 4 Zoll (vergl. Tab. I. Fig. III. IV. V.).

§. 39.

Man findet sonach bey diesen Ausmessungen, daß Beckeneingang und Höhle, als Ellipsen, der Beckenausgang hingegen (bey zurückgebogenem Schwanzbein) mehr als Kreisform sich darstelle, daß jedoch ferner der größte Durchmesser dieser Ellipsen nicht die gleiche Richtung habe, sondern im Eingange quer, in der Beckenhöhle gerade gestellt sey, eine für die Bewegung des Kindes durch das Becken äußerst wichtige Bemerkung. Endlich aber hat man auch zu beachten, daß der Eingang des kleinen Beckens in der Natur nicht als regelmäßige Ellipse sich darstelle, sondern durch das Hervorragen des Vorberges mehr die Gestalt eines im Ausschnitte sowohl, als an der Spitze abgestumpften Kartenherzens erhalte, so daß man eine etwas kleinere Ellipse von 4½ Zoll Länge, und 4 Zoll Breite, am angemessensten auf zweyerley Weise, nämlich nach der Richtung der zwei schiefen Durchmesser, und folglich in die zu beyden Seiten des Vorberges befindlichen Ausbiegungen auf den Kreuz- und Darmbeinverbindungen legen könne.

§. 40.

Ferner haben wir die Höhe des Beckens, den Schambogenwinkel, so wie Abstand und Richtung der Schenkelköpfe, und endlich auch Neigung und Krümmung des Beckens genauer zu bestimmen. — 1. Die Höhe des gesammten Beckens betreffend, so mißt sie 7 Zoll, wovon dem kleinen Becken an der Rückwand 4½ Zoll, an der Seitenwand 3½ Zoll, an der Vorderwand 1½ Zoll zukommen. 2. Der Winkel, welcher unter der Schamfuge durch Scham- und Sitzbeine gebildet wird, ist ein Winkel von 90° d. i. ein rechter Winkel (er unterscheidet insbesondere nebst der größern Wölbung des Schambogens und der auswärts gedrückten Ränder der aufsteigenden Sitzbeinäste, das weibliche vom männlichen Be-

cken, und ist namentlich für die Entwicklung des Kindeskopfes aus der untern Beckenöffnung von Wichtigkeit.)

§. 41.

3. Rücksichtlich der Verbindung der Schenkelknochen mit dem Becken achtet man theils auf den Winkel, welchen der Schenkelknochen und dessen Hals bildet; er beträgt 120°; theils auf den Winkel, welchen die Fortsetzung der Direktionslinie der Schenkelhälse vor dem Vorberge bildet; er beträgt 100°. Eine Linie vom äußern Umfange des großen Rollhügels am Schenkelknochen (Trochanter major) bis zu dem gleichen, gegenüberliegenden Punkte beträgt 13 Zoll.

§. 42.

4. Die Neigung (Inclinatio) des Beckens wird durch die Verbindung desselben mit der Wirbelsäule und sein Verhältniß zur Längenachse des Körpers bestimmt. Es finden sich nämlich die Seitenwandknochen des Beckens (Ossa innominata) unter ziemlich rechtem Winkel an das Kreuzbein geheftet; allein, da letzteres selbst rückwärts gebogen ist, so kann auch die Richtung jener Knochen nicht horizontal, sie muß vorwärts geneigt seyn, welches so viel beträgt, daß der obere Rand der Schambeinverbindung bey aufrechter Stellung gegen 3 Zoll tiefer als der Vorberg gefunden wird. Die Fläche des Beckeneinganges ist sonach stark nach vorwärts abhängig (geneigt), und will man diese Neigung nun noch genauer bestimmen, so muß man den Winkel messen, welchen die verlängerte Conjugata des Beckeneinganges mit der Horizontalebene bildet (vergl. über Neigung und Krümmung Tab. I. Fig. VI.). Diesen Winkel nun erklären die meisten Lehrbücher der Geburtshülfe, alle Levret*) folgend, für 55° betragend, H. Froriep setzt ihn dagegen auf 40—43°; indeß überzeugen mich meine Beobachtungen, daß auch dieß noch viel zu gering ist, wie man leicht sehen wird, wenn

*) Man darf nur das ganz verzeichnete Becken bey Levret (l'art des accouchemens. Paris 1766. Tab. 4.) ansehen, um das Unrichtige dieser Angabe zu fühlen.

man genau nach dieser Annahme einen Beckendurchschnitt aufzeichnet, oder an Skeletten diesen Winkel mißt, wo man ihn bey übrigens ganz regelmäßiger Körperform wohl bis zu 60—65° vergrößert sieht. Ich glaube daher der Regel am nächsten zu kommen, wenn ich denselben, als die Mittelzahl aus mehreren Messungen, auf 55° festsetze. Was dagegen die Fläche des Beckenausganges betrifft, so findet man auch diese schief gegen den Horizont gestellt, und zwar wieder so, daß die vordere Seite tiefer als die hintere steht, und folglich in gleicher Richtung ein Winkel mit dem Horizont gebildet wird, welcher 18° zu betragen pflegt. Subtrahirt man nun von dem Winkel des Beckeneinganges mit dem Horizont, den Winkel des Beckenausganges, so erhält man den Winkel, unter welchem die verlängerten Conjugaten des Beckeneinganges und Ausganges zusammenstoßen, nämlich einen Winkel = 55° — 18° = 37°.

Anmerkung. Fast in sämmtlichen Säugethieren ist die Neigung des Beckens so stark, daß die ganze Schamfuge bloß dem Schwanzbeine, und gar nicht mehr dem Kreuzbeine gegenübersteht, woher dann eben die stark rückwärts gerichteten Geschlechtstheile und die veränderte Begattungsweise (Coitus a posteriori) sich erklären.

§. 43.

5. Endlich die Beckenkrümmung betreffend, so ist es sowohl zur Verständniß des Geburtsmechanismus, als auch für zweckmäßiges Vollführen aller im und durch das Becken vorzunehmender Operationen und Untersuchungen wichtig, die Richtung derselben, welche man in Form einer durch das Becken geführten Linie sich vorstellt, auf das genaueste zu bestimmen. Früher nannte man nun diese Linie Achse des Beckens, und Levret bestimmte sie als eine senkrechte, auf die Mitte der Eingangsfläche fallende Linie, welche sich folglich zur senkrechten Längenachse des weiblichen Körpers genau eben so verhalten muß, als die verlängerte Conjugata zur Horizontalebene, d. i. welche mit derselben einen Winkel von 55° bilden, und deren Verlängerung vom Beckeneingange aufwärts ohngefähr den Nabel treffen würde. Offenbar

verdient nun aber diese Linie den Namen der Beckenachse keineswegs, indem für einen durchaus gekrümmten Gang keine gerade Linie als eigentliche Achse dienen kann. Um daher die Höhle des Beckens genauer zu bestimmen, zog Röderer eine zweite Linie senkrecht auf die Mitte der untern Beckenöffnung, welche um 18^{d} von der Längenachse des weiblichen Körpers rückwärts abweicht, und folglich in der Beckenhöhle mit der Levret'schen Achse unter einem Winkel von 143° sich kreuzt. Allein auch diese beyden Achsen zusammen genommen bestimmen die Beckenhöhle, so wie die Bewegung des Kindes und die Führung der Instrumente noch nicht genau, ja zum Theil ganz falsch (denn das Kind tritt nicht nach Röderers Achse nach hinten, sondern vielmehr nach vorwärts aus dem Becken), und man sah sich daher genöthigt, die Idee einer oder mehrerer Beckenachsen ganz zu verlassen, dagegen aber eine gekrümmte Linie (Führungslinie) anzunehmen.

§. 44.

Um nun diese Führungslinie wahrhaft geometrisch, und also vollkommen genau zu bestimmen, finde ich folgendes Verfahren am angemessensten: — Man nimmt die Mitte der Schambeinverbindung, da, wo die Conjugata der Beckenhöhle ausgeht, braucht von dieser Conjugata die Hälfte (also eine Linie von 2¼ Zoll) als Radius, und beschreibt nun mit diesem Halbmesser einen Kreis um die Synchondrose herum, wo sich dann ergeben wird, daß der in die Beckenhöhle fallende Abschnitt dieses Kreises sowohl die Mitte des Einganges als Ausganges durchschneidet, als überhaupt durchgängig in der Mitte der Beckenhöhle verlaufend, die wahre Führungslinie auf das Bestimmteste angiebt, woraus sich dann zugleich ergiebt, daß die Rückwand des Beckens, also die innere Fläche des Kreuzbeines und des im zurückgebogenen Zustande betrachteten Schwanzbeines, einen Kreisabschnitt darstellen müsse, dessen Radius die ganze Conjugata der Beckenhöhle ist; was dann beym vollkommen regelmäßigen Becken auch wirklich der Fall seyn wird.

Anmerkung. Weit seltner, als man gewöhnlich zu glauben scheint, ist es, daß ein weibliches Becken in aller Hinsicht als normal gebildet sich zeigt, und insbesondere habe ich dieß von der Krümmung der Beckenhöhle bestätigt gefunden, wo man oft unter einer beträchtlichen Reihe, übrigens ziemlich wohlgebauter Becken, kaum eines vorfindet, dessen Krümmung ganz der wahren Norm entspräche.

§. 45.

So weit denn die mathematische Betrachtung des Beckens; was das in physiologischer Hinsicht noch Bemerkungswerthe betrifft, so muß theils die Art seiner Knochenverbindungen, theils die Entwicklung desselben berücksichtigt werden. Die Art der Beckenverbindungen angehend, so sind von den vier Knochenverbindungen drei (nämlich zwei Darm- und Kreuzbeinfugen und die Schamfuge) im normalen Zustande keiner Bewegung, keines Auseinanderweichens (worauf man sonst wohl bey der Theorie der natürlichen Geburt Rücksicht nahm) fähig, dahingegen bey einigen Säugethieren (so nach Le Gallois beym Meerschweinchen) die Schamfuge sich wirklich öffnet, folglich die Seitenwandbeine sich allerdings bewegen, worin wir eine Aehnlichkeit mit dem beweglichen Becken niederer Thiergattungen, z. B. der Schildkröten, bemerken. Daß jedoch die Verbindung des Schwanz- und Kreuzknochens hinlängliche Bewegung zulassen müsse, um eine normale Weite der untern Beckenöffnung zuzulassen, ergiebt sich schon aus §. 38. Rücksichtlich der Entwicklung der ganzen Beckenform endlich bemerken wir, daß diejenige Gestalt, welche wir im Vorhergehenden als die eigentlich normale für den ausgebildeten weiblichen Körper beschrieben, nicht gleich im Kinde etwa nur in verjüngten Maaßstabe vorhanden sey, sondern ihre Eigenthümlichkeit erst späterhin erhalte. Untersucht man nämlich das Becken des neugebornen Mädchens, so ist allerdings wegen äußerst geringer Hervorragung des Vorberges und Schmalheit der Hüftgegend auch die obere Beckenöffnung mehr ein der Länge, als der Breite nach liegendes Oval; späterhin wird dann der ganze Beckenraum mehr kreisrund, bis erst während des Eintrittes der Ge-

schlechtsreife das Becken (die Knochenhöhle für Geschlechtsorgane, wie es der Thorax für Respirationsorgane ist) seine querovale Gestalt erhält, ja seine volle Ausbildung erst während der ersten Schwangerschaft erreicht, woher wir es leiten müssen, daß die Taille des weiblichen Körpers eine andere ist im jungfräulichen Zustande und eine andere nach der ersten Geburt, ein Unterschied, welchen schon die alten plastischen Künstler in der verschiedenen Bildung der Venus anadyomene (die dem Meere entstiegene) und der Venus genetrix (der Erzeugerin) sehr wohl ausgedrückt haben.

§. 46.

Es ist jetzt, bevor wir zur Betrachtung der Eigenthümlichkeiten des weiblichen Lebens übergehen, nothwendig, zuvor noch die Kennzeichen zu berücksichtigen, aus denen am lebenden Körper das wahrhaft normale Befinden und der verschiedene Zustand der einzelnen, vorher betrachteten Theile zu erkennen ist, als welches dann das Geschäft einer besondern Zeichenlehre der weiblichen Geschlechtstheile und des weiblichen Beckens seyn wird.

I. Zeichenlehre der weiblichen Geschlechtstheile.

§. 47.

1. Zeichen der normalen, zu Zeugung, Ernährung des Kindes und Geburt überhaupt geschickten weiblichen Geschlechtstheile. — Hierher gehören a) hinsichtlich der äußern Schamtheile: aneinanderschließende, doch nirgends verwachsene oder sonst verunstaltete, innerlich geröthete und glatte, äußerlich mit Haar bewachsene, große Schamlefzen; hinlänglich weite, weder zu sehr rückwärts noch vorwärts gerichtete Schamspalte (Rima genitalium); nicht zu weit vorragender und breiter, noch auch allzuschmaler oder zerrissener Damm (Perinaeum), und kein allzubreites Schambändchen (Frenulum vulvae). Ferner regelmäßig gebildete, weder zu starke und vorragende, noch zu kleine oder unempfindliche, lebhaft geröthete, mäßig feuchte,

nicht mit dickem Schleim überzogene, oder sonstigen Krankheitszustand verrathende kleine oder Wasserlefzen, empfindliche ohngefähr ¼ Zoll lange Klitoris, welche wenig vor dem Praeputio Clitoridis vorragt, und unter dieser, ohngefähr in der Tiefe von ¼ Zoll, der weder zu sehr erschlaffte und erweiterte, noch allzusehr verengerte Eingang in die Harnröhre (Orificium urethrae).

§. 48.

b) Hinsichtlich der Scheide und Gebärmutter: eine am Eingange 1 bis 1½ Zoll weite, weder durch ein zu festes, noch allzugroßes Hymen verschloßene Scheide, welche da, wo das Hymen mangelt, die myrthenförmigen Karunkeln erkennen läßt, und ein mäßig weiter, gegen 4 Zoll langer, nach der Richtung des untern Theiles der Beckenführungslinie sanft gebogener, mäßig durch Schleim befeuchteter, weder zu sehr, noch zu wenig erwärmter, weder mit zu starken oder gar herabgesunkenen Querfalten versehener, noch ganz glatter Scheidenkanal. Ferner eine verhältnißmäßig gebildete, hinter Schamfuge und Harnblase, und vor dem Mastdarme, zwischen Eingang und Höhle des kleinen Beckens liegende Gebärmutter, deren Längenachse der Levret'schen Beckenachse entspricht, und deren unteres Segment mittelst des 1 Zoll langen Mutterhalses (Cervix uteri) in die Scheide (welche diese Vaginalportion selbst äußerlich bekleidet) herabragt, woselbst der äußere Muttermund von gleicher elastischer Textur, ohne Verhärtungen und Auswüchse, etwas rückwärts gerichtet, mit etwas verlängerter vorderer Lippe, und zwar als Querspalte, oder zur Zeit der Menstruation als runde Oeffnung bemerkt wird.

§. 49.

c) Hinsichtlich der Brüste: weder allzugroße, mit zu vielem Fette überkleidete Brustdrüsen; gleichförmige Halbkugelgestalt beyder Brüste, welche weder platt aufliegend, noch zitzenartig herabhängend, weder innerlich Verhärtungen [illegible]end, noch allzusehr erschlafft, dagegen elastisch, mit einer [illegible] reinen Haut überzogen gefunden werden. Ferner re-

gelmäßig gestaltete, hinlänglich große, nicht gespaltene, mit röthlicher oder brauner Haut überdeckte, empfindliche, leicht turgescirende Warzen, und ein gegen $\frac{3}{4}$ Zoll breiter glatter, gleichmäßig mit den Warzen gefärbter Hof um dieselben.

§. 50.

2. Zeichen des jungfräulichen Zustandes dieser Theile insbesondere. Obwohl es unläugbar ist, daß der wahrhaft jungfräuliche Zustand des weiblichen Körpers schon in seiner allgemeinen Bildung dem schärfern Beobachter sich mit ziemlicher Bestimmtheit darstellt, so kann doch von diesem Gesammtüberblick namentlich für gerichtliche Fälle wenig Anwendung gemacht werden, indem die Entscheidung hierbey zu sehr der Individualität des Beobachters überlassen bliebe, es wäre denn, daß in dieser Hinsicht noch bestimmtere Merkmale aufgefunden würden, etwa gleich dem, welches nach Winkelmann bereits den Alten bekannt gewesen: daß nämlich die Schlankheit des Halses als Zeichen jungfräulichen Zustandes gelten kann, und, sobald ein um den Hals gemessener Faden, leicht über den Kopf weggeführt werden könne, dieß als Andeutung verlorener Jungfrauschaft zu betrachten sey. Sicherer als diese Merkmale bleibt daher zur Bestimmung des jungfräulichen Zustandes noch der Zustand der Genitalien, obwohl auch hier im Voraus bemerkt werden muß: erstens, daß wenn man, wie Einige thun, zwischen physischer und moralischer Jungfrauschaft unterscheiden will, die zu erwähnenden Kennzeichen natürlich blos für die erstere gültig sind; zweitens, daß ungewöhnliche ursprüngliche Bildungen der Genitalien, Krankheiten derselben, z. B. Leucorrhoe, Verletzungen, Entzündungen, Eiterungen u. s. w. sehr leicht einen Zustand herbeyführen können, welcher, indem er die Zeichen der Jungfrauschaft auch ohne statt gehabten Coitus zerstört, sehr leicht zu irrigen Urtheilen verleiten kann, weßhalb dann, indem auch viele der zu nennenden Kennzeichen, selbst das unverletzte Hymen auch nach gepflogenem Coitus bemerkt worden ist, in jeder Hinsicht bey den über diesen Gegenstand zu ziehenden Resultaten mit möglichster Umsicht und Benutzung aller Anhaltungspunkte zu verfahren ist.

§. 51.

Als Zeugen jungfräulichen Zustandes an den Geschlechtstheilen betrachten wir aber: unverletztes, auch nicht allzusehr erschlafftes Hymen; wulstige, dicht an einander schließende, elastische, innerlich glatte und lebhaft geröthete große Schamlefzen, welche die kleinen nicht allzuschlaffen oder verhärteten und gleichfalls lebhaft gerötheten Scham- oder Wasserlefzen bedecken. Ferner eine kleine, größtentheils von der Vorhaut bedeckte und zwischen den Schamlefzen verborgene Klitoris; ein enger, etwas wulstiger Rand der Harnröhrenöffnung, und ein überhaupt zusammen gezogener, kaum 1 Zoll weiter Eingang der Scheide. — Ferner der engere, stark quergefaltete Scheidenkanal, der schlankere 1 Zoll lange Fruchthälterhals von fester Substanz und glatter Oberfläche, nebst dem mit dichtschließenden Lippen (einer hintern kürzern und einer vordern längern) versehenen, eine Querspalte (zur Zeit der Menstruation jedoch bey wulstigern Lippen mehr gerundete Oeffnung) zeigenden, etwas rückwärts gekehrten Muttermunde; wobey durch das Scheidengewölbe so wie durch den Mastdarm der Gebärmutter-Körper und Grund, obwohl nur undeutlich, ebenfalls klein und von starker Substanz wahrgenommen werden. Endlich der glatte, gewölbte, weder besondere Hautfalten noch Flecken zeigende Unterleib und die kleinern elastischen, halbkuglichen Brüste mit hellrothen Warzen und Höfen um dieselben versehen.

§. 52.

3. Kennzeichen des statt gehabten Beyschlafs. Es gilt von ihnen, rücksichtlich ihrer Unsicherheit, beynahe dasselbe, was über die Zeichen des jungfräulichen Zustandes bemerkt wurde, und man darf annehmen, daß, wenn die zu erwähnenden Kennzeichen bestimmt vorhanden seyn sollen, theils mehrere Male wiederholter Coitus statt gehabt haben, theils derselbe vollständig (nicht etwa sine immissione penis) gewesen seyn müsse. Die Veränderungen, welche in diesem Falle an den Geschlechtstheilen wahrgenommen werden, sind aber folgende: — Schlaffes, zerrissenes oder ganz ver-

schwundenes Hymen, schlaffere innerlich bräunlich gefärbte mehr mit Schleim überzogene große Schamlefzen, längere oder härtere ebenfalls bräunliche mehr hervorragende Nymphen, empfindlichere weniger bedeckte Klitoris, weitere Harnröhrenmündung, schlaffere weniger dicht gefaltete Scheide, tiefer stehender, oft auch mehr angeschwollener Muttermund und Mutterhals, etwas schlaffere Brüste, dunklere Warzen und etwas vermehrtes Volumen der Schilddrüse.

§. 53.

4. Kennzeichen vorausgegangener Geburten. Auch rücksichtlich dieser muß bemerkt werden, daß wir eigentlich kein einziges haben, welches einzig und allein vollkommene Sicherheit der Unterscheidung gewährte, und daß durch vorausgegangene krankhafte Zustände der Genitalien, Polypen, Eiterungen, Syphilis, Wassersucht des Uterus u. s. w. mehrere Zeichen herbeygeführt werden können, welche ganz den Zustand vorhergegangener Geburten nachbilden, obwohl im Ganzen genommen, zumal da ähnliche Krankheitszustände doch seltner sind, sich auch sonst zu erkennen geben, diese Kennzeichen doch noch mehr Zuverläßigkeit als die vorhergehenden gewähren. Es sind folgende: — Mehr von einander klaffende große und kleine Schamlefzen und erweitertere Scheidenmündung bey stark ausgedehntem oder verletztem Schambändchen, oder eingerissenem Damme; schlaffere, weitere, glattere, oft mit theilweisem Vorfalle behaftete Mutterscheide; wulstigere, schwammigere Vaginalportion des Fruchthälters; größerer, durch das Scheidengewölbe leichter fühlbarer Gebärmutterkörper und dickerer Muttermund, an dessen weniger genau schließenden Lippen die Spuren früherer Einrisse als Narben sich darstellen. Endlich schlaffere Bauchbedeckungen mit Querfalten oder veränderter Hautfarbe bezeichnet, Spuren während der Schwangerschaft vorhanden gewesener Venengeschwülste der Schenkel; schlaffere, zuweilen mit fühlbaren vom Stillungsgeschäft zurückgebliebenen Milchknoten versehene Brüste mit dunkelfarbigen mehr hervorragenden Warzen.

gebildeten Beckens.

§. 54.

Weitere Kennzeichen sind zunächst die allgemeine Bildung des Körpers und insbesondre ächt weiblichem Typus zu bemerken, in der Wirbelsäule, gekrümmte Gliederknochen, veränderte Bewegungen der Glieder, wie beym häufig mit fehlerhafter Beckenbildung sich verbinden. Ferner hinlängliche Breite der Hüften (9 — 10 Zoll) und Schulterzeigegend (13 Zoll), regelmäßige Wölbung des Lendenbeins und Kreuzbeines, regelmäßige Tiefe des ganzen Beckens (7 Zoll), normale Vorwärtsneigung der Darmbeinkämme, und weder zu weit vorwärts noch zu weit rückwärts gerichtete äußere Schamtheile (Genitalia quoad situm media). Außerdem giebt vorzüglich die Geschichte vorhergegangener Geburten (namentlich kurz vorhergegangener) über die Beschaffenheit des Beckens Aufschluß, indem die normale Geburt eines ausgetragenen normal gebauten Kindes undenkbar ist ohne ein regelmäßig gebildetes Becken, obwohl auch ein solches späterhin sich verändern und vom Normalbaue beträchtlich abweichen kann. Das sicherste Merkmal bleibt daher immer die Anstellung einer genauen innern geburtshülflichen Untersuchung (von welcher späterhin die Rede seyn wird), auch wegen möglicher Weise vorhandener innerer Geschwülste und Knochenauswüchse, welche in der äußern Form sich nicht andeuten.

3. Eigenthümlichkeit der weiblichen physischen und psychischen Lebensäußerungen.

§. 55.

Wenn wir überhaupt an dem wichtigen physiologischen Satze festhalten, daß der Organismus nur eins sey und folglich seine Thätigkeit nicht etwas vom Organe wesentlich verschiedenes, sondern beydes nur verschiedene Seiten [illegible]igen, so werden auch die §. 16 — 24 betrachteten

Individualitäten der weiblichen Form uns im Voraus die wichtigern Eigenthümlichkeiten dieses Lebens andeuten können, unter welchen letztern wir übrigens die allgemeinern Momente wieder zuerst einer nähern Betrachtung unterwerfen. — So wie aber in der Natur überhaupt eine zweyfache Richtung allgemeiner Thätigkeit bemerkbar ist, eine nämlich, welche auf die Gestaltung des Einzelnen, auf Individualität abzweckt, und eine zweite, welche auf das Allgemeine und Gesetzmäßige sich bezieht, als Bestreben nach Einheit, nach Totalität erscheint, so wiederholt sich auch ein solcher Gegensatz von Kräften in den besondern Naturwesen auf die mannigfaltigste Weise. So nämlich sehen wir das Reich der Pflanzen und Thiere sich entgegengesetzt, wo im erstern die Existenz selbst der Hauptzweck der Lebensverrichtungen ist, und daher alle einzelnen Thätigkeiten der Pflanzen nur auf Nähren und Aussondern, Wachsen, Fortpflanzen und Abnehmen gerichtet sind, wenn hingegen der Zweck des thierischen Organismus mehr das Bestimmen der Existenz in Empfindung und Bewegung, die Willkühr ist. Eben so wiederholt sich dieser Gegensatz in der physischen und psychischen Natur des Menschen selbst, indem die erstere auf Bildung, Erhaltung und Wechsel des Stoffes gerichtet, die zweite aber auf Einheit und Freyheit gegründet ist, und will man diese Unterscheidung endlich noch mehr auf das körperliche des Organismus beziehen, so beruht auch darin der Gegensatz der vegetativen oder produktiven, und der animalen Sphäre, wo wir zur erstern die gleichsam aus der Pflanzenwelt entlehnten Organe der Assimilation, Cirkulation, Respiration und Secretion so wie der geschlechtlichen Reproduktion rechnen, wenn wir unter der zweiten die Gebilde der Sinneswerkzeuge, Bewegungswerkzeuge und des Nervensystems begreifen.

§. 56.

Endlich aber wiederholt sich dieser Gegensatz auch auf das Bestimmteste in dem Verhältniße der beiden Geschlechter. Wie nämlich das Universum eben nur durch die wechselseitige Durchdringung von gesetzmäßiger Einheit und Mannigfaltigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht, und in einer stäten

Umwandlung, d. i. in einem ſtäten Hervortreten, Erzeugen, und Auflöſen, Sterben begriffen iſt (welches ausführlicher nachzuweiſen, Sache der höheren Philoſophie der Natur iſt), ſo müſſen auch, wo ein Individuelles neu hervortreten, d. i. erzeugt werden ſoll, Entgegengeſetzte ſich verbinden, um in ihrer Durchdringung eine neue Verwendung der ewigen Subſtanz (keine eigentlich neue Erſchaffung, als welche undenkbar iſt) zu bewirken, und wir ſehen daher denn ſchon in der Pflanzenwelt das Hervortreten verſchiedenartiger Gebilde, von denen einige die materielle Anlage zur künftigen Frucht in ſich tragen (Staubwege, Pistilla), wenn andere die befruchtende, d. i. begeiſtigende Thätigkeit, die Idee der Geſetzmäßigkeit, der Beſtimmung einer regelmäßigen Entwicklung, enthalten (Staubfäden, Stamina).

§. 57.

Wenn indeß dieſes Verhältniß in der Pflanze, welche der Erde eingewurzelt gleichſam noch weniger in ſich beſchloſſen iſt, mit minderer Klarheit erſcheint, ſo tritt es dagegen in der Sexualverſchiedenheit der höheren Thiere, und am ſchönſten im Menſchen mit vollkommenſter Freiheit hervor; und wie wir in der Fortpflanzung das Weib als rein empfangend, das Körperliche geſtaltend, den Mann aber als befruchtend, als begeiſtigend finden, ſo iſt auch in ihrem geſammten Leben ein ſolcher Gegenſatz ausgeſprochen, welcher, obwohl der Gattungscharakter in Thätigkeit und Geſtalt beyden gemeinſam iſt, doch in dem Weibe das phyſiſche, das auf vegetatives oder produktives Leben ſich Beziehende eben ſo beſtimmt überwiegen läßt, als im Manne das pſychiſche, das animale Leben vorherrſchend erſcheint. — Es wird ſich dieß bey der nun erforderlichen Betrachtung der beſondern Aeußerungen weiblichen Lebens am ſicherſten und deutlichſten ergeben.

§. 58.

Berückſichtigen wir aber das weibliche Leben, in wie fern es ſich durch Aſſimilation, Cirkulation und Reſpiration, Se- und Excretion, ſo wie durch Geſchlechtsfunktion aus-

zeichnet, so finden wir 1) die Assimilation, die Stoffaufnahme betreffend, daß dem Weibe eine stärkere assimilative Kraft der Verdauungswerkzeuge eigenthümlich sey, welches erwiesen wird durch das geringere aber öfter wiederkehrende Bedürfniß an Nahrungsmitteln bey nichts desto weniger sehr reichlicher Chylusbereitung und rascher Ersetzung verlorener Stoffe. Zugleich muß indeß auch bemerkt werden, daß die Sensibilität der weiblichen Verdauungsorgane stärker sey, als die der männlichen, weßhalb öftere Störungen der Verdauung und größere Wirkung aufgenommener, reitzender, erregender Stoffe auf das allgemeine Befinden. Endlich pflegen selbst die Stuhlausleerungen, wegen der größern Thätigkeit der Auffaugung, fester und seltner zu seyn. — Was 2) die den organischen Stoffwechsel unterhaltende Gefäßthätigkeit betrifft, so hängt es eben von der raschen Assimilation ab, daß sich die Blutmasse im Weibe schneller als im Manne wieder erzeugt; ja überhaupt ist der Umtrieb der Säfte geschwinder, der Pulsschlag daher frequenter, obwohl gemeiniglich etwas kleiner, auch die Neigung zu Wallungen und leichtern Fieberbewegungen in diesem Geschlechte größer, und die Thätigkeit und Wichtigkeit des Nervensystems bedeutender als im Manne.

§. 59.

3) Die Athmung und Ausscheidung betreffend, so ist die Aushauchung der Lungen im weiblichen Geschlechte schwächer, dagegen die Ausdünstung und drüsige Absonderung der zartern Haut verhältnißmäßig allerdings bedeutender *), ferner wird auch in den größern innern Absonderungsorganen gleichwie in den Lungen geringere Excretion wahrgenommen, die kleinere Leber läßt auf schwächere Gallabsonderung schließen, und von den Nieren finden wir die Aussonderung einer geringern Quantität eines dunkler gefärbten, stärker riechen-

*) Wenn man nicht selten bemerkt, daß männliche Früchte leichter als weibliche unter der Geburt asphyktisch werden und schwerer zu erwecken sind, so scheint dieß allerdings mit dem größern Athmungsbedürfnisse im männlichen Körper in Verbindung zu stehen.

den Harnes bewerkstelligt. 4) Was endlich die Geschlechtsfunktion angeht, so werden die folgenden Abschnitte dieser Schrift die einzelnen hierher gehörigen Erscheinungen so ausführlich durchzugehen haben, daß eine besondere Erörterung derselben schon deßhalb hier überflüßig wird, und so begnügen wir uns daher jetzt nur im Allgemeinen zu bemerken, daß auch in der Reproduktion der Gattung, eben so wie in der individuellen Reproduktion, die überhaupt vorherrschende Thätigkeit der Stoffbildung sich deutlichst zeige, ja wie es physiologisch höchst merkwürdig sey, daß der Bildungsstoff, durch welchen das Weib bey der Fortpflanzung thätig ist, nicht sowohl wie beym Manne als ein abgesonderter Stoff, wie das Sperma, erscheint, sondern vielmehr durch das Blut selbst dargestellt wird, wie die Aussonderung des Blutes in der Periode nicht reger Geschlechtsthätigkeit (als Menstruation), und die höchst bedeutende Anhäufung des Blutes im schwangern Uterus, Behufs der Fötusernährung, beweiset.

§. 60.

Wir kommen nun zu den charakteristischen Erscheinungen des weiblichen Lebens, welche auf sensibele und Bewegungsfunktion, so wie auf höheres Nervenleben d. i. psychische Eigenthümlichkeit sich beziehen. — Was hier aber zuvörderst die sinnliche Wahrnehmung betrifft, so ist diese im Allgemeinen allerdings feiner zu nennen als im männlichen Körper, jedoch nicht so, daß die Reitzbarkeit und die Schärfe und Genauigkeit der Wahrnehmung in gleichem Maaße sich entwickelt zeigten. Gewiß nämlich ist das Auge des Weibes gegen helles Licht, scharf entgegengesetzte Farben u. s. w. empfindlicher, aber es ist weniger für unmittelbare Auffassung richtiger Verhältnisse, großer Gesammteindrücke u. s. w. geeignet; eben so wird das Ohr des Weibes gegen irgend einen heftigen Schall empfindlicher, für gewisse einzelne Klänge reitzbarer gefunden, dagegen ihm das scharf unterscheidende musikalische Gehör doch seltner zukommt, und es stimmt mit jener größern Reitzbarkeit (so wie selbst mit dem durch engern Gehörgang ausgezeichneten Baue des weiblichen Ohres) allerdings überein, daß in diesem Geschlechte

häufigere Abstumpfung dieses Sinnes und öftere Schwerhörigkeit bemerkt wird. Endlich was die Sinnesarten des Gastes, Geruchs und Geschmacks beym Weibe anbelangt, so ist auch in diesen eine größere Erregbarkeit und leichter mögliche Ueberreitzung deutlich wahrnehmbar. Die größere Receptivität sensibeler Organe ist übrigens auch in aller andern Hinsicht, z. B. der Wirkung der Arzneymittel, der Einflüsse äußerer Temperatur und Witterungsveränderungen, der größern Neigung zu exaltirten Zuständen des Nervensystems, der größern Empfänglichkeit gegen thierischen Magnetismus u. s. w. so unverkennbar und folgt aus der mehr hervorgehobenen vegetativen Natur, und somit weniger ausgesprochenen individuellen Selbstständigkeit so bestimmt, daß wir noch weitere Erläuterungen hierüber für überflüßig halten.

§. 61.

Die Bewegkraft angehend, so ist aus denselben Gründen, welche die erhöhte Sensibilität dieses Geschlechts erklären, auch die zwar schwächere, dafür aber auch dem Nervensysteme mehr unterworfene Muskelkraft zu folgern, und wir finden demnach in Uebereinstimmung mit der früher bemerkten geringern Entwicklung des Muskel- und Knochensystems, daß die Bewegungen des weiblichen Körpers, obwohl mit geringerer Energie, doch mit größerer Zierlichkeit und Leichtigkeit ausgeübt werden; wobey übrigens selbst der parallele Stand der verminderten Respiration und der schwächern Muskelkraft in so fern merkwürdig ist, als schon in der Thierreihe eine solche Gleichstellung nachgewiesen werden kann, und schwächere Respiration auch insgemein mit geringerer Muskelkraft verbunden ist. — Als Erzeugniß endlich von Bewegung und Athmung, von Sinneswahrnehmung und Reflexion zugleich, gehört noch hierher der Ton, die Sprache, als welche wir dann in Folge verminderter Athmung (§. 20.) und Bewegung auch schwächer und höher (kindlicher), zugleich aber auch gemüthvoller als die männliche finden.

§. 62.

Endlich rücksichtlich des höhern Nervenlebens, auf welches wir die Eigenthümlichkeit weiblicher Gemüthsstimmung,

weiblicher Temperamente und Leidenschaften beziehen, so ist auch hier das Psychische ein wahrer Spiegel des Körperlichen, ja vielmehr die ideale Seite des Organismus selbst. Wenn daher überhaupt im Reiche des geistigen Lebens (ganz gemäß den drei Richtungen oder Systemen im Organischen der animalen Sphäre) unterschieden werden kann zwischen Gemüth (Empfindungs-, Gefühlsvermögen), Geist (Reflexions-, Erkenntnißvermögen) und Willen (Thatkraft, Vermögen zur freien Bestimmung), so wird sich nun bereits aus dem Vorhergegangenen abnehmen lassen, welche Seiten im Weibe hervorgehoben, welche weniger ausgebildet seyn müssen. Wenn nämlich im Weibe überhaupt Animalität, und folglich schärfere Individualität so wie Selbstständigkeit weniger vorherrscht, so wird sich dieß auch im Psychischen äußern, und wir finden daher die Energie der Geisteskraft im Weibe nicht, welche dem Manne möglich ist. Das eigentliche Feld der Wissenschaft und Spekulation, die Schärfe des Urtheils, die Tiefe der männlichen Vernunft, sind der weiblichen Seele unzugänglich; dahingegen ist der Geist des Weibes feiner, schneller in der Auffassung, zur richtigen Erkenntniß der einzelnen und näheren Verhältnisse des menschlichen Lebens mehr geeignet, und ein gewisser Scharfsinn, Neigung zur List, so wie Fertigkeit im Uebergehen aus einer Vorstellungsreihe in die andere, ist ihm natürlich.

§. 63.

Im Gemüth hinwiederum ist die größere Reitzbarkeit, die Weichheit, Lebendigkeit des Gefühls, die Regsamkeit der Phantasie allerdings diesem Geschlechte charakteristisch, allein eben diese zu große Beweglichkeit läßt die Tiefe des Gefühls, die schöpferische Kraft der Phantasie, welche die Seele fähig macht zur Hervorbringung großer und hoher Werke der Dichtung und bildenden Kunst, vermissen. Ueberdieß ist hierin die vorherrschende Neigung zum Anmuthigen, Zierlichen und Kleinen begründet, da große und erhabene Gegenstände zu gewaltsam die Seele des Weibes erschüttern, als daß ein reines Wohlgefallen hieran ihm wenigstens ganz natürlich seyn könnte. — Vorzüglich endlich werden die Neu-

ßerungen weiblichen Gemüths durch die Geschlechtsverhältnisse des Weibes selbst bestimmt. Die Bestimmung, sich an einen Gatten anzuschließen, die Bestimmung, Mutter zu werden, ist schon in den Puppenspielen des Mädchens sichtbar, und äußert sich später, wenn der Kampf des Selbstgefühls und der Neigung gegen das andere Geschlecht sich im Busen regt, als das Gefühl holder jungfräulicher Scham, ja oft als ein gewisser edler jungfräulicher Trotz, bis endlich, wenn der Mann des Verlangens gefunden ist, alles dieses in anmuthige und seelenvollste Hingebung sich auflöst. Noch gewaltiger indeß als die Gattenliebe herrscht im Busen des Weibes die Mutterliebe, und hunderte von Beyspielen lassen uns die ungemeinen Aufopferungen bewundern, deren Mütter für ihre Kinder fähig waren.

§. 64.

An diese Grund-Regung und Richtung des weiblichen Gemüths schließen sich dann viele andere weibliche Neigungen und Leidenschaften an. Wir zählen dahin die aus dem Bedürfniße an einen Stärkern sich anzuschließen, und aus dem Gefühle der eigenen Schwäche hervorgehende Weichheit und Sanftmuth, die aus reger Phantasie und geringerer Energie des Geistes hervorgehende Neugier, die aus Hang zu gefallen und lebhafter Phantasie sich erzeugende Eitelkeit und Putzsucht, so wie die aus Neigung und Sorgfalt für Gatten und Kinder entstehende schöne Tugend der Häuslichkeit; dagegen aber liegt auch in ihnen Fähigkeit zu den heftigsten Ausbrüchen des Hasses und der Rache, wenn jener feurigen Liebe gegen Gatten oder Kind sich Hindernisse in den Weg drängen, oder diese Liebe selbst sich unerwiedert, ja betrogen sieht.

§. 65.

Die Kraft des Willens endlich zeigt in der weiblichen Seele ohngefähr dieselben Eigenthümlichkeiten, welche die Kraft der Bewegung im weiblichen Körper wahrnehmen ließ. Im Ganzen wird namentlich die Festigkeit und Beharrlichkeit des Entschlußes, so wie das Vermögen, schnell

nach Willkühr über alle Kräfte des Geistes und Körpers zu bestimmen (Gegenwart des Geistes) vermißt; obwohl dagegen nicht zu läugnen ist, daß das weibliche Geschlecht bey Ausdauer in kleinen Dingen, zu deren Ertragung oder Besiegung nicht sowohl Muth und Kraft, als Geduld und Ruhe erforderlich sind, häufig den Vorrang vor dem männlichen behauptet; worin wir (um dieß beyläufig zu erinnern) gewiß den Hauptgrund dafür finden können, daß das Weib weit mehr als der Mann zum stätigen Beystande, zur ruhigen Verpflegung und Besorgung Kranker, Gebärender, der Wöchnerinnen, so wie der Neugebornen sich eignet.

§. 66.

Noch haben wir nun, bevor wir die allgemeinen physiologischen Betrachtungen der weiblichen Individualität beschließen, die Entwicklung desselben nach seinen einzelnen Lebensperioden in einer Hauptübersicht zusammen zu stellen, wobey wir zuerst die Frage beleuchten müssen, ob wohl überhaupt bereits im ersten Keime ein Unterschied der Geschlechter anzunehmen sey, oder ob völlige Gleichheit derselben uranfänglich vorhanden und vielleicht (wie einige Physiologen wollen) zuerst alle Embryonen des weiblichen Geschlechts seyn möchten? — Wofern es aber gewiß ist, daß die organische Bildung nur ein Hervortreten, ein Auseinanderweichen, ein Trennen eines ursprünglich Einfachen in die verschiedenen Werkzeuge des Lebens sey, daß folglich in diesem Einen und Zuerstgegebenen der Idee nach bereits der ganze Organismus liege, und nur erst in der Zeit aus diesem Einfachen wirklich werde (und diesen Satz stellen Vernunft und Erfahrung gleichmäßig fest), so kann auch aus diesem Keime nicht ein qualitativ Anderes hervorgehen, als der Idee nach darin gegeben war, obwohl quantitative Abänderungen (z. B. durch unzureichende oder übermäßig angefachte Bildungskraft, Hemmungen oder abnorme Vergrößerungen) sehr leicht möglich sind; und es ist folglich erwiesen, daß die ersten Keime geschlechtlich verschiedener Individuen keineswegs allesamt weiblich, oder überhaupt einander ganz gleich seyn könnten, wenn nicht alsobald die

Nothwendigkeit, daß sie auch späterhin sich gleich seyn müßten, also (was doch nicht der Fall) zu lauter weiblichen Körpern anwüchsen, gefolgert werden sollte.

§. 67.

Erste Lebensperiode. Der Unterschied des Geschlechts muß daher als eine Verschiedenheit des ganzen Keimes nothwendig zugleich als ursprünglich angenommen werden, und eben wiefern das Ganze verschieden ist, wird diese Verschiedenheit auch in den größern organischen Verhältnissen des Leibes überhaupt, früher noch als in den eigentlichen Geschlechtsorganen angedeutet seyn. — Vergleicht man nun, um die Wahrheit dieses Vernunftsatzes auch durch die Erfahrung nachzuweisen, eine Reihe von Embryonen unter einander, so ergiebt sich allerdings, daß schon in zwei- und dreimonathlichen regelmäßig gebildeten menschlichen Früchten, der weibliche Typus an der größern Bauchhöhle, dem engern Thorax und den zartern obern Gliedmaaßen kenntlich sey, wenn dagegen im männlichen das umgekehrte Verhältniß Statt findet *). — Obwohl nun also bereits in dieser Periode das Charakteristische der weiblichen Form ausgesprochen ist, so erscheint diese Bezeichnung doch nur sehr schwach in den Geschlechtsorganen, und aller Geschlechtsunterschied in der Lebensthätigkeit ruht mit den wichtigsten übrigen Funktionen noch vollkommen. Selbst im Neugeborenen, bis zum bestimmten Erwachen der sensibeln Lebenserscheinungen, findet die größte Aehnlichkeit zwischen beiden Geschlechtern Statt, und das Geschlechtssystem liegt als Keim zu neuen Entwicklungen gleichsam noch schlafend im Körper des weiblichen Kindes.

§. 68.

Wie indeß die Ausbildung des Körpers im Allgemeinen vorschreitet, tritt auch der Typus des Geschlechts allmählig schärfer hervor; der zartere Gliederbau, die Länge des Unterleibes, die Zierlichkeit und Geschicklichkeit der Bewegungen

*) Unterschiede, welche in Sömmerings Iconibus embryonum. T. I. sehr schön wiedergegeben sind.

unterscheiden das Mädchen schon bedeutend vom Knaben, und eben so geben frühere geistige Entwicklung, größere Fertigkeit im Auffassen und Behalten, bald sichtbar werdende Neugier (vorzüglich wie Pockels bemerkt auch auf Geschlechtsgeheimnisse gerichtet), ferner eigene Spiele, in denen das Mütterliche und die häusliche Sorgfalt immer vorherrschend sind, bezeichnende Merkmale dieses Geschlechts ab. — Rascher entwickelt sich nun bey überwiegender produktiver Kraft der Körper, einer Pflanze vergleichbar, welche auf bessern Boden schneller zum Blühen gelangt, und nach und nach, so wie Erzeugung plastischer Stoffe sich häuft, bildet sich nun auch das Geschlechtssystem, dessen stufenweise Entfaltung wir noch im Speciellen weiter unten zu verfolgen haben, vollkommner aus.

§. 69.

Zweite Lebensperiode. Um vier bis sechs Jahre zeitiger als der männliche Körper erreicht nun der weibliche die Zeit seiner Reife. Die individuelle Fortbildung wird gehemmt und es tritt nun die Fortbildung der Gattung, die Fortpflanzungsthätigkeit hervor. Erst jetzt ist nun das Weib seinem Körperlichen und Geistigen nach, so wie wir es im Obigen beschrieben haben, vom Manne unterschieden und ausgebildet. Der größere Reichthum erzeugten Blutes drängt sich periodisch gegen das Geschlechtssystem, deutend auf seine Bestimmung zur Ausbildung eines neuen Organismus verwendet zu werden, und erzeugt hier einen Zustand von Ueberfüllung, welcher, in so fern nicht Schwangerschaft eintritt, gleichsam durch einen kritischen Blutfluß, d. i. durch die ihren besondern Erscheinungen nach weiter unten zu betrachtende Monathsreinigung oder Menstruation gehoben wird.

§. 70.

In wiefern nun schon aus dem Vorhergegangenen sich ergiebt, daß jene periodischen Congestionen nach dem Geschlechtssystem, welche die Menstruation erzeugen, auf die Fortpflanzung sich beziehen, könnte man (mit Cuvier) diesen Zustand ohngefähr der Brunst in den Thieren vergleichen, und

es knüpft sich somit an die Betrachtung dieser Eigenthümlichkeit des weiblichen Lebens zugleich die eines neuen Cyclus, welcher, indem er auf Reproduktion der Gattung abzweckt, nothwendig die Geschichte der individuellen Reproduktion mit ihren drei Stadien (Kindheit, Reife und Alter) wiederholt, und die Geschichte der durch die Empfängniß veranlaßten Veränderungen des weiblichen Körpers, d. i. der Schwangerschaft, der Geburt, so wie der Wochen- und Stillungsperiode, in sich faßt, von welchen denn gleichfalls noch die wichtigsten physiologischen Momente (im Einzelnen werden sie im zweiten Theile erörtert) hier durchzugehen sind.

§. 71.

Schwangerschaft. Von dem Zeitpunkte an nämlich, wo durch den Akt fruchtbarer Begattung, die Fransen der Fallopischen Röhren, von Blut strotzend, die Ovarien krampfhaft umfaßten, um den Urstoff einer späterhin im Uterus auszubildenden Frucht zu empfangen, tritt eine Umänderung im weiblichen Leben ein, in welcher das Ueberwiegen productiver Thätigkeit (an sich schon diesem Organismus charakteristisch) bis zum höchsten Grade sich entwickelt. Das Geschlechtssystem und insbesondere der Uterus wird hierbey der Heerd dieser neuangeregten Bildung und es erfolgt daher ein Zustand von Congestion nach diesen Theilen, welcher ohngefähr dem der Menstruation vorausgehenden analog ist, weßhalb denn so viele Symptome angehender Schwangerschaft mit denen angehender Menstruation übereinstimmen. Was indeß bey der letztern als Blutfluß sich entscheidet, geht hier in einen entzündungsartigen Zustand über, welcher sogar auf den übrigen Körper, gleich einer wahren beginnenden Entzündung wirkt, Fieberbewegungen, Nervenleiden, Temperaturwechsel, Verdauungsstörungen veranlaßt *). Endlich in einem

*) Wie sehr Entzündungs- und Bildungsprozeß im Wesen verwandt sind, läßt sich auf vielfache Art nachweisen; man vergleiche nur z. B. die Gefäßbildung im bebrüteten Ey und die Gefäßbildung an der gereitzten sich entzündenden Hautfläche, die Heilung von Wunden durch Entzündung, die vielen durch Entzündung entstehenden

Zeitraume, welcher den monathlichen Typus gerade zehnmal wiederholt, erlangt bey gleichmäßiger Entwicklung des mütterlichen Bildungsorgans, des Fruchthälters, auch die Frucht selbst ihre Reife, d. i. das Kind erreicht einen gewissen Grad von Selbstständigkeit, wobey es auch außer dem mütterlichen Körper sein Leben fortzusetzen fähig wird, und dieß ist der Grund, welcher die Trennung beider Körper herbeyführt.

§. 72.

Geburt. Wie nämlich etwa zwei Körper von gleichnamiger Elektricität, wie die gleichnamigen Pole der Magnetnadel sich abstoßen, so sondern sich am Ende der Schwangerschaft, sobald der Fötus der Möglichkeit individueller Existenz nach dem mütterlichen Körper gleich geworden, beyde Körper von einander ab, und es erwacht somit im weiblichen Körper das Bestreben, wieder in den Zustand, in welchem er vor der Empfängniß war, zurückzukehren und so diesen Cyclus zu beschließen. Vorzüglich deutlich tritt dieß im Fruchthälter selbst hervor, und er äußert sich daher bey der Geburt durch Zusammenziehungen, Contractionen d. i. Wehen, deren Zweck aber zum Theil die Austreibung der Frucht, allein eben so sehr auch die eigene Verkleinerung ist, weßhalb sie auch nach der Geburt fortdauern. — Die Geburtsthätigkeit selbst, als einen großen Theil mechanischer Kraft in Anspruch nehmend, als den Wendepunkt darstellend, von welchem aus die in der Schwangerschaft so bedeutend gesteigerte Bildungsthätigkeit wieder herabsinkt, ergreift und erschüttert fast alle organischen Systeme des Körpers gewaltsam, ist daher in vieler Hinsicht Veranlassung zu krankhaften Erscheinungen, und überhaupt eine der merkwürdigsten Revolutionen, welche im Leben des Weibes, und zwar mehrere Male, Statt finden kann.

---

krankhaften Gebilde u. s. w. (obwohl man allerdings zu weit geht, wenn man mit manchen Pathologen alle krankhaften Verbildungen für Produkte von Entzündungen hält).

§. 73.

Wochenbett und Säugungsperiode betreffend, so sind dieß nur Fortsetzungen und Abschließungen der vorigen Perioden. Im Wochenbett nämlich vollendet der Uterus seine Zusammenziehung und Wiederherstellung in den vorigen Stand, sowohl rücksichtlich seines Parenchyma's und seiner Form, als rücksichtlich seiner innern Flächen. Die besondere Gefäßthätigkeit im Innern desselben verliert sich, die in Bezug auf geschlechtliche Functionen überschüßig erzeugten Körpersäfte nehmen andere Richtungen, bewirken theils eine vermehrte Thätigkeit in der Haut, theils und hauptsächlich Hervortreten einer zum Behuf fernerer Ernährung des Kindes geschehenden Absonderung in den Brüsten, theils endlich bey krankhaften Zuständen wohl auch heftige Congestionen nach andern Organen, Entzündungen, Fieber u. s. w. — Am längsten nun erhält sich unter jenen für die Thätigkeit des Uterus eintretenden Functionen die der Milchsekretion; sie ist es, welche fortwährend, und zwar dem Gange der Natur nach ohngefähr in einem der Schwangerschaftsperiode selbst entsprechenden Zeitraum, die Menstruation ersetzt, und eine Empfängniß eben dadurch gewöhnlich hindert.

§. 74.

Nachdem wir sofort bemerkt haben, wie am Ende dieses Cyclus von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, der Körper wieder bis auf wenige übrig gebliebene Spuren, in den vorigen Zustand zurückkehrt, wie sich dieser Cyclus selbst ein oder mehrere Male, ja sehr häufig wiederholen kann, oder aber im Gegentheile auch wohl ganz fehlt, gar nicht eintritt, und blos die stets wiederkehrenden monathlichen Perioden die Zeit der Geschlechtsreife ausfüllen, so ist es nun noch übrig, den Zustand zu betrachten, welcher erfolgt, wenn bey vorrückendem Alter der Ueberschuß jener, Behufs der Reproduktion der Gattung erzeugten Säfte sich allmählich verliert, und der Körper rücksichtlich der Geschlechtsfunktion sich wieder dem kindlichen Zustande anschließt.

§. 75.

Dritte Lebensperiode. Wie nämlich in der ersten die Geschlechter sich mehr glichen, die weiblichen Geschlechtstheile ohne eigentliche Funktion waren, und der Uterus selbst, diesem angemessen, eine andere Gestalt und verdichtete weniger blutreiche Wände zeigte, so tritt ein ähnlicher Zustand nun auch im höhern Alter, in der dritten Lebensperiode des weiblichen Körpers ein. Der Uterus wird fester, ja beynahe knorpelartig, und die Vaginalportion ist bey Frauen, welche mehrere Male geboren haben, wulstig; der Muttermund uneben, und es erinnert so die allgemeine Gestalt des Fruchthälters wieder einigermaßen an die noch nicht entwickelte Form desselben im Kinde. Die Ovarien welken und fallen zusammen, ja sogar die äußern Geschlechtstheile erschlaffen und verlieren die ihnen vorher eigenthümliche Gestalt. Die äußern Schamlippen weichen aus einander, die innern Schamlippen und die Klitoris werden wieder (wie bey unreifen Mädchen) sichtbar; die Brüste verlieren ihre Elasticität, fallen zusammen, und sind, eben so wie der Uterus jetzt zur Ausscheidung der Menstruation unfähig wird, zu einer erhöhten absondernden Gefäßthätigkeit nicht mehr geeignet. — Auf gleiche Weise indeß wie die erhöhte Thätigkeit der Geschlechtsorgane in der Periode der Zeugungsfähigkeit nicht sowohl Ursache als vielmehr Folge allgemeiner Körperveränderungen war, so ist auch dieses Hinwelken im Alter nicht als Ursache, sondern als Folge von Umänderungen anzusehen, welche im allgemeinen Körperbefinden Statt gehabt haben und sich auf Sinken reproduktiver Thätigkeit beziehen.

§. 76.

Diese Verminderung der Assimilation und allgemeinen bildenden Thätigkeit, welche dem Organismus überhaupt bey vorrückender Lebenszeit nothwendig ist, und als Folge des Gegensatzes zwischen Individuum und Gesammtheit der Natur erscheint, äußert sich der Regel nach durch wirkliche Stoffabnahme; der Körper fällt zusammen, die reichlichen Ablagerungen von Fett und Zellgewebe verschwinden, die

Haut faltet sich, die Knochen treten mehr hervor, der Charakter weiblicher Form verliert sich mehr und mehr, die Aehnlichkeit desselben mit dem männlichen wird (wie im Kindesalter) größer, und indem so der Körper nicht einmal für eigene Erhaltung thätig seyn kann, muß nothwendig das Aufrechterhalten der Thätigkeit für Erhaltung der Gattung ganz unmöglich werden. — Wie denn nun aber die Aeußerungen des Geistes und Gemüthes immer wesentlich durch die Organisation bestimmt werden, so zeigt sich dieß auch hier: — Die Sanftheit, Zartheit, die Erregbarkeit und Anmuth des weiblichen Gemüths verlieren sich, die mindere Energie des Willens und Klarheit der Vernunft machen das Weib empfänglicher für die Schwächen des Alters, zu welchen übrigens eben so das männliche Alter geneigt, obwohl dagegen mehr geschützt ist, und erzeugen dann oft einen Charakter, welcher in eben so geringem Grade, als der der blühenden Jungfrau oft in hohem Grade liebenswürdig zu nennen ist.

W. Rouffel Physiologie des weiblichen Geschlechts. A. d. Franz. v. Michaelis. Berlin 1786. 8.

Jac. Fid. Ackermann über die körperliche Verschiedenheit des Mannes vom Weibe außer den Geschlechtstheilen. A. d. Lat. von Wenzel. Coblenz 1788. 8.

(Bey vielem Interessanten leider auf eine unstatthafte Hypothese gegründet, nämlich daß das vermehrte oder verminderte Vorwalten des Sauerstoffs die Grundursache der Geschlechtsverschiedenheit bedinge.)

C. Fr. Pockels Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts. Hannover 1806. 2te Aufl. in 4 Thln.

(Berücksichtigt hauptsächlich die psychische Natur dieses Geschlechts.)

Naturgeschichte des Weibes, ein Handbuch für Aerzte u. s. w. nach J. L. Moreau von Rink und J. K. F. Leune 4 Thle. Leipzig 1810. 8.

(Enthält vieles Interessante über die Verhältnisse des weiblichen Geschlechts in verschiedenen Zeiten und Ländern und umfaßt zugleich die Diätetik.)

Autenrieth über die Verschiedenheit beider Geschlechter in Reil's Archiv f. Phys. 7. Bd. 1. Hft.

Ueber die Analogie der männlichen und weiblichen Geschlechtstheile von Dr. J. Chr. Rosenmüller im 1. Bde d. Abhandlungen d. physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen.

C. L. Creve vom Baue des weiblichen Beckens. Leipzig 1794. 4.

S. Th. Soemmering Tabula Sceleti feminini. 1797. Traject. ad M. Fol.

J. H. F. Autenrieth p. Fischer diss. sistens nonnullas observationes de pelvi mammalium. Tub. 1798. übers. im 2n Hefte 2ten Bds d. Beyträge f. Zergliederungskunde v. Isenflamm u. Rosenmüller.

(Auch dienen zur nähern Kenntniß d. weibl. Beckens die künstlichen Pelvicarien z. B. v. Froriep.)

J. G. Walther Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin 1776.

J. Chr. G. Jörg über das Gebärorgan des Menschen und der Säugthiere. Fol. Leipz. 1808.

J. F. Lobstein Fragment d'anatomie physiologique sur l'organisation de la matrice dans l'espece humaine. Paris 1803.

J. G. Klees über die weiblichen Brüste. Frankf. a. M. 3te Aufl. 1806.

J. Ch. Rosenmüller quaedam de ovariis embryonum. 1803. 4.

J. G. Knebel Grundriß zu einer Zeichenlehre der gesammten Entbindungswissenschaft. 1798.

Zweiter Abschnitt.

Von der Eigenthümlichkeit in den Krankheiten des weiblichen Geschlechts (allgemeine Pathologie).

§. 77.

So wie der weibliche Körper rücksichtlich des Physiologischen zwar schon im Allgemeinen durch eigenthümliche Verhältnisse seiner organischen Systeme und äußern Gesammtbildung von dem männlichen abweicht, allein nur durch die geschlechtlichen Funktionen und Organe vollkommen von ihm sich unterscheidet, so auch rücksichtlich der pathologischen Zustände. — Es veranlaßt dieß die Krankheiten des weiblichen Organismus einzutheilen in solche, welche er mit dem männlichen gemein hat, und welche in ihrem Verlauf nur modificirt werden durch die Individualität des Körpers, an welchem sie vorkommen, und in andere, welche als auf die besondere Organisation des Weibes gegründet, nur in diesem Geschlecht möglich und ihm ganz eigenthümlich sind. Zur erstern Klasse gehört demnach das ganze Heer von Krankheiten, welchen der Mensch überhaupt unterworfen ist, als: Fieber, Entzündungen, Lähmungen, Krämpfe, Störungen organischer Bildung u. s. w.; zur zweiten Klasse hingegen rechnen wir die Störungen weiblicher Geschlechtsverrichtung und die daraus sich ergebenden allgemeinen oder örtlichen Krankheiten.

§. 78.

Hier nur kann es allein unser Zweck seyn, von der zweiten Klasse eine ausführlichere Darstellung zu geben, und wir erwähnen daher von der erstern blos dasjenige, wodurch die Individualität des weiblichen Körpers auch in den ihr nicht ausschließend eigenthümlichen Krankheitszuständen bezeichnet wird. Es ist aber hierüber zu bemerken: erstens, daß die größere Receptivität des weiblichen Organismus ihn im Allgemeinen für Einwirkung schädlicher Einflüsse empfänglicher, folglich zu Kränklichkeit überhaupt geneigter macht;

das Weib erkrankt daher häufiger, oft in Folge scheinbar unerheblicher Schädlichkeiten, und alles dieß natürlich um so mehr, je reitzbarer das Individuum ist (daher das unaufhörliche Kranksеyn mancher überfeinen weiblichen Constitution) und wir finden auch hier wieder die Aehnlichkeit mit dem Kindeskörper, von welchem dasselbe gilt. — Zweitens: Die geringere Energie in der Reaction des weiblichen Körpers überhaupt macht es indeß erklärlich, daß die von einwirkenden Schädlichkeiten erzeugten Krankheitsstürme minder heftig, Fälle schweren Erkrankens im Ganzen seltner zu seyn pflegen als im männlichen Geschlecht; Frauen zeigen eben deßhalb oft unter den beschwerlichsten Lagen bewundernswerthe Ausdauer, und werden weniger leicht ganz niedergeworfen aufs Krankenlager als Männer.

§. 79.

Drittens. Das Vorherrschen vegetativer Funktionen im weiblichen Körper bedingt ferner auch das häufigere Vorkommen von krankhaften Zuständen sowohl in den ersten Wegen des Assimilationsprozesses und den secernirenden Organen, als in der allgemeinen Bildungsthätigkeit, deren Träger das Gefäßsystem ist, woher denn theils das hier so häufige Vorkommen von Unordnungen in der Art der Blutcirkulation, theils die öftern Fälle abnormer, auf pathologische Bildung oder Ausscheidung abzweckender Gefäßthätigkeit, und somit die häufigen Krankheitsformen der Entzündung, Verwachsung, Verbildung, Gefäßerweiterung, Wasseranhäufung, Eiterung u. s. w. erklärlich werden. — Viertens wird der Verlauf der Krankheiten in Folge des obenerwähnten Uebergewichts produktiver Funktionen auch in so ferne modificirt, als der Körper selbst in Hebung und Entscheidung der Krankheiten sich thätiger beweiset, woher denn die außerordentliche Heilkraft der Natur oft in Fällen der bedeutendsten organischen Zerrüttungen (z. B. bey Eiterungen, durch Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter veranlaßt) abgeleitet werden kann. — Fünftens beruht es in dem besondern Vorwalten der Sensibilität dieses Geschlechts, daß Symptome, welche vom Nervensystem ausgehen, die meisten Krankheiten

der Weiber begleiten, daß Schmerzen, Krämpfe, Lähmungen, Sinnes-Täuschungen oder Ueberspannungen hier so ausgezeichnet häufig erscheinen und Rückwirkungen des Nervensystems auf andere Systeme und Organe auch öfters zu weitern Verstimmungen Anlaß geben, wenn hingegen Reaktionen des Muskularsystems, in Form von Convulsionen, Ausbrüchen von Manie u. s. w. weniger heftig als im männlichen Geschlecht zu seyn pflegen.

§. 80.

Wie nun durch die erwähnten Momente sowohl die Aetiologie als Symptomatologie weiblicher Krankheiten manches Eigenthümliche erhält, so ist auch endlich rücksichtlich der Prognose noch anzumerken, daß, so wie überhaupt der geringern Energie der Reaktionen wegen das weibliche Geschlecht mehr zu chronischen als acuten Krankheiten geneigt ist, auch acute Krankheiten selbst im Allgemeinen hier minder leicht eine so gefahrdrohende Höhe erreichen; woraus denn die Erfahrung erklärlich wird, daß in typhösen Epidemieen z. B. der Regel nach mehr Männer als Frauen verstarben. Ungünstiger hingegen muß eben dadurch die Prognose werden bey chronischen Krankheiten, theils wegen der größern Neigung zu organischen Verbildungen, Wasseransammlungen u. s. w.; theils wegen der schneller eintretenden Atonie, welche häufig durch den mehrmals sich wiederholenden Cyclus der höhern, so tief in den weiblichen Organismus eingreifenden Geschlechtsverrichtungen von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett unterhalten, befördert, oder doch vorbereitet wird; vorzüglich ungünstig muß jedoch die Prognose im Allgemeinen bey den chronischen Krankheitszuständen solcher Organe werden, deren Funktion schon an und für sich im weiblichen Körper beschränkter ist, z. B. bey Krankheiten der Lungen.

§. 81.

Was die zweite Klasse weiblicher Krankheiten, nämlich die diesem Geschlecht ausschließend eigenthümlichen betrifft, so ist von ihnen im Allgemeinen zu bemerken, daß, so wie die

Disposition dazu überhaupt nur durch den geschlechtlichen Charakter gegeben wird, ihr häufigeres oder minder häufiges Vorkommen auch an das Hervortreten oder Zurücktreten weiblicher Individualität geknüpft ist. Es wird daher erklärlich, warum z. B. das kindliche Alter, bey minder ausgeprägtem Geschlechtscharakter, auch beynahe gar keine dem weiblichen Geschlechte ausschließend eigenthümlichen Krankheitszustände zeigt, wenn hingegen in den zeugungsfähigen Jahren Krankheiten dieser Art in Menge vorkommen, und zwar auch hier wieder in größter Mannigfaltigkeit da, wo die Geschlechtsthätigkeit am stärksten hervorgehoben ist, also namentlich während der Schwangerschaft und dem Wochenbette, am allerhäufigsten jedoch bey der Geburt, als deren Abnormitäten mit ihrer Behandlung ja sogar zur Bildung einer eigenen Disciplin die Veranlassung gaben. Eben deßhalb sehen wir im höhern Alter, nach erloschener Zeugungsfunktion, zwar wohl manche der einer früheren Periode eigenthümlichen Krankheiten fortdauern oder sich entwickeln, aber wir vermissen Krankheiten, welche in dieser Lebensperiode des Weibes ausschließend vorkommen könnten, und sehen vielmehr im Pathologischen wie im Physiologischen den weiblichen Körper wieder mehr dem männlichen genähert.

§. 82.

Uebrigens gilt rücksichtlich der Aetiologie, Symptomatologie und Prognose auch von dieser Krankheitsklasse im Allgemeinen wieder was §. 78—80 über die erstere Klasse gesagt ist, so daß auch hier z. B. großes Vorwalten der Neigung zu abnormen Bildungen und chronischen Zuständen, so wie zu Störungen der Sensibilität bemerklich wird, wobey indeß noch außerdem erwähnt zu werden verdient, daß, so wie die weiblichen Geschlechtsverrichtungen überhaupt entschiedener und stärker in das Befinden des gesammten Organismus eingreifen, auch die Störungen dieser Funktionen von größerm Einfluße auf Erregung allgemeiner Krankheitszustände sind, als dieß z. B. vom männlichen Geschlechte behauptet werden kann. — Die Eintheilung dieser eigentlichen Geschlechtskrankheiten, deren nähere Erörterung nun vorzüg-

licher Gegenstand des speciellen Theils dieser Arbeit seyn wird, kann übrigens namentlich von zwey Standpunkten aus entworfen werden, d. i. entweder indem man unterscheidet zwischen örtlichen Krankheiten des Geschlechtssystems: Entzündungen, Verbildungen, fehlerhaften Lagen u. s. w. und allgemeinen obwohl von der Geschlechtsindividualität bedingten Krankheitszuständen, z. B. Bleichsucht, Hysterie u. s. w. — Oder indem man sie ordnet nach den einzelnen Lebensperioden, wie es geschehen in dem §. 11. entworfenen Schema. — Für unsern Zweck halten wir es am schicklichsten, beide Eintheilungsgründe zu verbinden, und sämmtliche Geschlechtskrankheiten der Weiber überhaupt nach den Lebensperioden, im Besondern aber nach ihrer Oertlichkeit oder Allgemeinheit zusammenzustellen.

Dritter Abschnitt.

Von der ärztlichen Behandlung des weiblichen Organismus im gesunden und kranken Zustande (allgemeine Diätetik und Therapie).

§. 83.

Unter den hierher gehörigen Gegenständen können wir unterscheiden, erstens die Beachtung der Persönlichkeit des Arztes für das weibliche Geschlecht, zweitens die Erörterung der Art und Weise, sowohl die verschiedenen physiologischen als pathologischen Zustände des weiblichen Körpers zu erforschen (also der Untersuchungsmethode), und drittens Erwägung der allgemeinen für die Behandlung selbst aufzustellenden Maximen.

I. Von der Persönlichkeit des Frauenarztes und Geburtshelfers.

§. 84.

Von einem jeden, der helfend und heilend auftreten will, fordert man mit Recht noch außer den genügenden Kenntnissen und Fertigkeiten eine gesunde kräftige Individualität, innere Sicherheit, Gegenwart des Geistes, Schärfe sinnlicher Wahrnehmungen, Rechtlichkeit und Milde in seinem Handeln. Auch der Frauenarzt und Geburtshelfer muß daher mit solchen Eigenschaften ausgestattet seyn, wenn er seinen Beruf würdig erfüllen soll, ja er muß es um so mehr, da das weibliche Geschlecht einen sehr feinen Sinn für männlichen Werth zu besitzen pflegt, und ihm leicht das Vertrauen, und mit ihm eine so wesentliche Bedingung der Heilung schwinden wird, wenn ein unsicheres, schwankendes oder wohl gar unschickliches Benehmen, Mangel eines wohlgegründeten Selbstvertrauens errathen läßt. Außerdem ist jedoch noch anzumerken, daß, wie namentlich die Entbindungskunst bey ihrer Ausübung mit so vielen Schwierigkeiten und Anstrengungen verknüpft ist, auch ebendeßhalb von dem sich ihrer Ausübung Widmenden eine vorzüglich dauerhafte Gesundheit, kräftige obwohl nicht allzuvöllige Bildung des Körpers, insbesondere aber kräftige, schlank- und wohlgebildete Arme und Hände so wie feinfühlende Finger erfordert werden; Erfordernisse, welche auf längere Zeit nur erhalten werden können durch eine sorgfältige, allen Ausschweifungen und Unmäßigkeiten absagende zweckmäßige Lebensordnung und wohlgeordnete Kultur und Uebung der Glieder.

§. 85.

Obwohl nun der Arzt mit diesen physischen und den obenerwähnten psychischen Eigenthümlichkeiten begabt, schwerlich die rechte Art des Benehmens gegen weibliche Kranke verfehlen wird, und wir gern ein kleinliches Savoir faire der Nation überlassen, welche auf Aeußerliches so streng haltend dieses unübersetzbare Wort gebildet hat (um so mehr, da durch ähnliche Kunstgriffe wohl oft ein gewöhnlicher Rou-

tinier *) größern Eingang als der gründliche und wissenschaftliche Arzt erhält) so darf man demohnerachtet mit Recht einige besondere Punkte dieser äußern Behandlung des weiblichen Geschlechts noch einer nähern Beachtung würdig erklären.

§. 86.

So gehört hierher zunächst schon die Aufmerksamkeit auf äußerliche Erscheinung des Arztes in Kleidung, Haltung und Betragen. — Ein Geschlecht, welches die Sitte als erste Richterin anerkennt, empfindet jede Unschicklichkeit dieser Art nothwendig mehr als der Mann, und eine jede gesuchte, geckenhafte Kleidung eben so sehr als ein allzuvernachläßigtes Aeußere, ein jedes Auffallende, nach konventionellen Grundsätzen Unpassende des Betragens wird das weibliche Gefühl unangenehm afficiren, ja zurückstoßen, wenn es von einem männlichen Individuum kaum bemerkt würde.

§. 87.

Außerdem hat das Betragen des Arztes sich insbesondere nach weiblicher Individualität zu fügen, theils bey Erforschung der Krankheitszustände, theils bey Anordnung des Heilplanes. In ersterer Hinsicht ist es die Aufgabe einerseits, zart und würdig den Frauen zu begegnen, damit sie es wagen mögen, vertrauensvoll selbst Geheimnisse, welche weibliche Schamhaftigkeit sonst gern verbirgt, dem Arzt offen darzulegen; ein Vertrauen, welches der Arzt durch eine einzige unschickliche leidenschaftliche Aeußerung bey zartfühlenden Frauen verscherzen wird. Andererseits ist aber auch Scharfblick, sichere Ordnung im Krankenexamen und vielfache Umsicht nöthig, um durch den gewandten, oft nur zu redseligen Vortrag der Kranken, ja durch absichtliche auf Täuschung abzweckende Darstellung eines zur List geneigten Geschlechts nicht von der richtigen Ansicht des eigentlichen Zustandes sich abbringen zu lassen; eine Aufgabe, welche oft namentlich

*) Möchte doch, so wenig als auch dieses Wort in unserer Sprache sich umschrieben wiedergeben läßt, eben so wenig die Sache selbst bey uns gefunden werden! —

bey Ausmittelung von Schwangerschaften u. dergl. mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden zu seyn pflegt. — Mit einem Worte: der Mittelweg zwischen einer zu regen Theilnahme und einer abstoßenden Kälte wird jeder ärztlichen Ausmittelung bey weiblichen Individuen den sichersten Erfolg gewähren.

§. 88.

Was zweitens die Anordnung des Heilplanes betrifft, so wird auch hier der Arzt theils durch ein gewisses Eingehen in die Individualität seiner Kranken, durch Benutzung ihrer vorherrschenden Neigungen u. s. w. manches zur Vervollständigung seiner Kur beytragen, und seine Kranke dadurch zu genauerer Befolgung der ihr vorgeschriebenen Regeln vermögen können; theils aber ist nicht zu übersehen, wie der Arzt selbst durch seine Persönlichkeit, durch seinen festen Willen oft auf das entschiedenste zur Beseitigung regelwidriger Zustände beytragen könne. Die Einwirkung nämlich einer kräftigen, geistigen Individualität auf eine schwächere schon an und für sich, ist (mögen wir dieß nun magnetische oder andere Kraft nennen) unläugbar und durch vielfache Beobachtungen erwiesen*); und daß von derselben nun gerade bey weiblichen Kranken, wo aufgeregte oder verstimmte Sensibilität oft eine so große Rolle spielt, in vielen Fällen kräftige Hülfe erwartet werden dürfe, liegt am Tage. Wie oft hören wir daher nicht die Klagen reitzbarer weiblicher Kranken fast augenblicklich sich mindern, sobald der geehrte vertrauensvoll empfangene Arzt sich ihnen nähert? — Eben so bestimmt, als das Gefühl des Krankseyns durch die Annäherung einer widerwärtigen Person gesteigert wird.

*) Man gedenke nur des schönen Aufsatzes vom Archiater Brandis im Hufelandischen Archiv f. d. pr. Heilk. 1815. Bd. II. St. 2.

II. Von der Art und Weise, die verschiedenen Zustände des weiblichen Körpers auszumitteln und zu untersuchen.

§. 89.

Wir können hierbey unterscheiden: a) das allgemeine nach regelmäßig geordneten Fragen eingeleitete Vernehmen der zu Untersuchenden, ihrer frühern Geschichte nach sowohl, als nach der Art ihrer gegenwärtigen besonderen Empfindungen; und b) die durch den Sinn des Gesichts oder des Getasts, ja selbst durch Instrumente vorzunehmende Untersuchung der weiblichen Körperbildung sowohl im Allgemeinen, als insbesondre den Geschlechtstheilen, so wie (bey Hinsicht auf Geburt) dem Becken nach.

§. 90.

Was zuvörderst die Ordnung und Folge der zum Behufe solcher Ausmittelungen zu stellenden Fragen betrifft, so werden zwar im Ganzen wie bey männlichen Individuen auch hier Alter, Eigenthümlichkeiten bey der Geburt, Gesundheitsumstände der Eltern, Kinderkrankheiten, äußere Verhältnisse, Temperatur, vorherrschende Neigungen, späterhin erfahrene Krankheiten u. s. w. erörtert werden müssen; es wird ferner der gegenwärtige Zustand nach den einzelnen organischen Systemen zu erwägen seyn, so daß man z. B. von der Funktion der Dauungsorgane beginnt, übergeht sodann zur Funktion des Gefäßsystems, der Absonderungs- und Athmungsorgane, und endlich die Verrichtungen des höhern thierischen Lebens, nach Sensation und Muskularthätigkeit untersucht; allein immer wird nun noch einen sehr wesentlichen Theil dieser Untersuchung die Berücksichtigung der eigentlichen Geschlechtsverhältnisse ausmachen, wobey dann auf nachstehende Punkte vorzügliches Gewicht zu legen seyn würde. —

§. 91.

Zunächst aber gehört hierher die Entwicklung des Geschlechtscharakters im Erscheinen der Menstruation, welche

durch die Zeit, in welcher sie erscheint, durch die Zufälle, mit welchen sie eintritt, durch die Art ihrer Wiederkehr, durch die Quantität und Qualität des abfließenden Blutes, vielen Aufschluß über die ursprüngliche Thätigkeit des Geschlechtssystems, und die mehr oder minder vollkommene Harmonie in den Funktionen des Körpers verheißt. — Nahe verbunden ist hiermit Erforschung der Regungen des Geschlechtstriebes, ob sie spät oder früh erwacht, ob sie in geringem oder hohem Grade, vielleicht zu Ausschweifungen führend, empfunden wurden? — Erörterungen, wobey allerdings nur durch besondere Vorsicht und Schonung der Schamhaftigkeit, und oft mehr durch Benutzung der Aussagen von Eltern, Verwandten, Hebammen u. s. w. als durch mündliches Examen zum Ziel der Erkenntniß des eigentlichen Zustandes zu gelangen ist.

§. 92.

Ferner verdienen bey nicht mehr jungfräulichem Zustande, namentlich bey Verheiratheten theils (unter der erwähnten Vorsicht) die ehelichen Verhältnisse, theils und namentlich die vorausgegangenen oder jetzt Statt habenden Zustände von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillungsperiode die genaueste Berücksichtigung, da vorzüglich von den letztern Zuständen aus oft die Entstehung der verschiedenartigsten krankhaften Zustände gerechnet werden muß. Es sind daher theils die Anzahl und Art vorausgegangener Geburten, theils der Verlauf vorausgegangener Schwangerschaften, das Befinden in denselben, die etwa Statt gehabten physiologischen und pathologischen Eigenthümlichkeiten der Wochenbetten stets und zwar nach den einzelnen diese Perioden charakterisirenden Erscheinungen (von welchen später die Rede seyn wird) möglichst genau zu erforschen; und endlich ist denn auch bey ältern weiblichen Individuen der Eintritt der klimakterischen Jahre (das Außenbleiben der Menstruation) ausführlich zu berücksichtigen, da auch in diesen Zeitraum mancher Krankheitszustand des weiblichen Körpers wurzelt.

§. 93.

Anlangend zweitens die Untersuchung der weiblichen Körperbildung, so ist es diese, welche man, da sie vorzugsweise bey Geburten vorgenommen werden muß (obwohl sie in vielen andern Zuständen des weiblichen Körpers nicht minder nothwendig ist), mit dem Namen der geburtshülflichen Untersuchung (Exploratio obstetricia) bezeichnet, und nach folgenden Grundsatzen unterschieden hat. — Zunächst nämlich theilt man dieselbe, je nachdem sie über die gesammte äußere Körperbildung sich verbreitet, oder vorzugsweise auf die innern Geburtstheile und das Becken beschränkt wird, in die äußere und innere Untersuchung (Exploratio obstetricia externa et interna), welche letztere auch wohl noch insbesondere mit dem Nahmen des Zufühlens (Touchement, Touchiren) belegt zu werden pflegt. Zweitens aber unterscheidet man, je nachdem die Untersuchung durch die Hand des Geburtshelfers oder durch Werkzeuge vorgenommen wird, Untersuchung durch Gesicht und Getast und Instrumentaluntersuchung (Exploratio obstetricia manualis et instrumentalis).

§. 94.

Wie nun schon theils im Allgemeinen ein decentes und schonendes Verfahren dem Frauenzimmerarzte zur Pflicht gemacht wurde (§. 86.), theils ähnliche Regeln rücksichtlich des Krankenexamens (§. 91.) erwähnt worden sind, so müssen nun insbesondre bey dem genauern Erforschen der körperlichen Bildung des Weibes die nachstehenden Grundsätze berücksichtigt werden: — 1) Ist beym Vortrage der Nothwendigkeit der Untersuchung selbst mit Anstand und Vorsicht zu verfahren (ohne wirkliche Nothwendigkeit wird natürlich dieses jedem unverdorbenen weiblichen Geschöpfe höchst unangenehme Verfahren gänzlich übergangen), und es sind demnach die Gründe, welche die Untersuchung erheischen, mit Ruhe und Festigkeit darzulegen. 2) Es wird zweckmäßig seyn, bey der Untersuchung selbst irgend eine vertraute Person, z. B. eine Verwandtin der zu Untersuchenden gegenwärtig zu haben.

3) Bey der Untersuchung selbst wird man alle nicht unumgänglich nothwendigen Entblößungen oder sonstige Beleidungen der auch im gefallenen Weibe zu ehrenden Schamhaftigkeit sorgfältigst vermeiden, und was durch Getast ausgemittelt werden kann, nicht durch das Gesicht erörtern. 4) Man bereite alle zur Untersuchung nöthigen Utensilien, z. B. das Lager, die zum Bestreichen der Hand erforderliche Salbe oder des etwas, Tücher, Waschwasser u. s. w., und sehe darauf, daß die zur Untersuchung selbst am meisten geeignete Lage oder Stellung des Körpers zuvor angenommen werde.

§. 95.

5) Bevor man zur Untersuchung schreitet, lasse man die Harnwege sowohl, als den Darmkanal (letztern mittelst eines Lavements) entleeren. 6) Man trage Sorge, daß die untersuchende Hand weder durch Rauhigkeiten, Ecken der Nägel, Kälte, Nässe, oder durch Ringe u. dgl. den Körper der zu Untersuchenden nachtheilig afficire. 7) Man gewöhne sich die Untersuchung mit beyden Händen gleich fertig unternehmen zu können, und 8) man verfahre bey der Untersuchung selbst in einer gewissen gesetzmäßigen Ordnung (ohngefähr so wie wir sie hier beschreiben), beginne nach vorausgeschicktem Examen mit der äußern und endige mit der innern oder (wenn sie nöthig seyn sollte) mit der Instrumentaluntersuchung; auf welche Weise, wenn jeder Punkt sogleich hinlänglich genau beachtet wird, man der unangenehmen Nothwendigkeit der Wiederholung einzelner Theile der Untersuchung am sichersten entgehen wird.

1. Untersuchung durch Gesicht und Getast.

a) Die äußerliche.

§. 96.

Unter den Bereich dieser Untersuchung gehört nun ganz vorzüglich und zuerst die Berücksichtigung der allgemeinen Körperform, der Gestalt, der Torosität, der Beschaffenheit von Haut und Haar nach, und zwar namentlich in wiefern sie dem oben (§. 16. u. f.) angegebenen weib-

lichen Typus entspreche oder nicht, sodann in wie weit etwa Spuren früher Statt gehabter Krankheiten (z. B. der Rhachitis) daraus sich abnehmen lassen, und endlich um auch daraus mit abzumessen, welche Constitution, welches Temperament im Körper der zu untersuchenden vorherrschend sey. Zunächst an diese allgemeine Untersuchung schließt sich nun unter den Theilen einer speciellen äußern Untersuchung die der Brüste: — Hier nämlich ist durch Besichtigung sowohl als Betastung, theils über Größe, Gestalt, Elastizität oder Schlaffheit des gesammten Brustkörpers, über das regelmäßige oder abnorme Parenchyma desselben, Abwesenheit von Verhärtungen, Anfüllung der Milchadern (welche vielleicht bey gelindem Drucke nach der Warze hin milchigte Flüßigkeit ergießen) u. dgl., theils über Beschaffenheit der die Brüste überkleidenden Haut, ob sie nicht durch Hautkrankheiten entstellt, oder durch Narben früherer Eiterungen bezeichnet sey, und insbesondere endlich über die Farbe und Bildung der Brustwarzen, ob sie klein, tiefliegend, gespalten, sehr oder nicht sehr empfindlich, mit kleinem oder großem, dunkelm oder hellem Hof umgeben seyen, zu entscheiden *).

§. 97.

Fernere Gegenstände dieser Untersuchung sind noch die übrigen äußern Geschlechtstheile, der Unterleib und das Becken. In wiefern jedoch die Entblößung dieser Theile insbesondere weiblicher Schamhaftigkeit entgegen ist, wird man hierbey nur in ungewöhnlichern, namentlich gerichtlichen Fällen, das Gesicht zu Hülfe nehmen, da schon das Getast hierüber in den meisten Fällen genügenden Aufschluß zu geben vermag. — Wird jedoch vielleicht wegen Verdacht von Ansteckung, oder um über Zeichen der Jungfrauschaft zu entscheiden, die genaueste Untersuchung nothwendig, so läßt man der Person eine horizontale Lage (am

*) Man kann hierher auch die Untersuchung der Milch selbst rechnen, und wir werden die Zeichen gutartiger, oder weniger guter Milch bey der Geschichte des Wochenbettes erörtern.

beßten bey etwas erhöhter Kreuzgegend) annehmen, und wird so alsbald über den Zustand der übrigen äußern Genitalien entscheiden können, wobey denn namentlich auf die Stellung derselben (ob mehr vor- oder rückwärts), auf Turgor oder Erschlaffung, Integrität oder Verletzung, Verhärtung, oder sonstige Entstellung derselben zu achten ist.

§. 98.

Bedarf man indeß der Ocularinspektion nicht, so wird man durch folgendes Verfahren den Zustand dieser Theile am sichersten ausmitteln: — Kann nämlich die zu Untersuchende außerhalb des Bettes und in aufrechter Stellung verweilen, so wird man dieselbe, leicht angelehnt, an eine Wand treten lassen, sich selbst läßt man sodann auf das rechte Knie (wenn man mit der rechten Hand untersucht, im Gegentheil auf das linke) nieder, und führt nun die Hand (gewöhnlich die rechte) an dem ihr entsprechenden Schenkel der zu Untersuchenden (also am linken) unter den Kleidern, jedoch ohne diese mehr als bis zum Knie aufzuheben, zur Hüfte herauf, indem man zugleich auf Richtung und Form der Schenkelknochen, etwaige Blutaderknoten, ödematöse Anschwellungen u. s. w. achtet. Hier angekommen fixirt die Hand erst den großen Rollhügel, dann den Hüftbeinkamm, indem mit der zweiten Hand auf der andern Seite, jedoch über der (freylich nicht zu dicken) Bekleidung dasselbe geschieht. So nun die Breite des Beckens nach der Entfernung beyder Hände zu bestimmen, fordert allerdings Uebung, ist aber bis zu einem hohen Grade der Sicherheit sehr wohl möglich. Zugleich dient die Berücksichtigung der Neigung des Hüftbeinkammes, verbunden mit der spätern Beachtung des Schambogens und der Stellung der Genitalien um die Neigung des Beckens zu erforschen.

§. 99.

Ferner gleitet die untersuchende Hand ruhig, ohne zu stark oder zu leicht und reitzend die Haut zu berühren, nach der Rückwand des Beckens, und indem hier Wölbung des Kreuzknochens, Tiefe des äußern Eindrucks in der Gegend

des Vorbergs beachtet wird, fixirt wieder die zweite Hand über der Kleidung den Schambogen, um auf ähnliche Weise, wie früher die Breite, nunmehr auch die Tiefe des Beckens zu messen. Sodann bewegt man die untersuchende Hand vorwärts nach dem Schambogen, dessen Stand und Wölbung zu erforschen, man beachtet zugleich die Leistengegend, wegen etwaiger Brüche oder Drüsengeschwülste und bestimmt genauer das Verhalten der äußern Schamlippen, so wie des Dammes, ihrer Bildung und Richtung nach.

§. 100.

Endlich ist denn vorzüglich die Erforschung des Unterleibes, seiner Ausdehnung oder Erschlaffung, und den durch die Bauchdecken zu fühlenden Theilen nach, ein wichtiges Moment der äußern Untersuchung. Man wird auch dieses durch sorgfältige Betastung der gesammten Unterleibsfläche in verschiedenen Richtungen beendigen, obwohl es, namentlich für die Ausmittelung angehender Schwangerschaften oder kurz vorhergegangener Geburten fast rathsamer ist, der zu Untersuchenden, wenn man bis hierher in der Exploration gediehen ist, eine horizontale Lage mit etwas vorwärts gebeugtem Oberkörper annehmen zu lassen, um so bey erschlafften Bauchmuskeln tiefer eingreifen und den hinter dem Schambogen vielleicht noch verborgenen nicht zu sehr ausgedehnten Uterus entdecken zu können. Außerdem ist hier auf das Verhalten des Nabels und der Linea alba, auf Gefühl von Fluctuation im Uterus oder in der Bauchhöhle, auf Wahrnehmung von Kindestheilen oder Kindesbewegungen Rücksicht zu nehmen, und was insbesondere die letztern betrifft, so räth man, um dieselben mehr aufzuregen, theils das abwechselnde gelinde Heben und Sinkenlassen des Uterus, welches noch wirksamer gemacht werden kann durch das bey gleichzeitig unternommener innerer Untersuchung Statt findende gelinde Andrängen an das untere Segment des Uterus (ein Verfahren, welches auch um den weniger ausgedehnten Fruchthälter der von außen untersuchenden Hand fühlbarer und erkennbarer zu machen, zu empfehlen ist), theils das Auflegen einer etwas kalten Hand auf den bloßen Leib; beyde Verfahren

führen jedoch keineswegs immer zum Zwecke. — Hat man übrigens auf die angegebene Weise die Untersuchung des Unterleibes bey aufrechter Stellung beendigt, so führt man nun die untersuchende Hand nach der andern Hüfte (welches, wo man mit der rechten Hand untersucht, die rechte seyn wird), betastet auch hier Hüftbeinkamm und Rollhügel, und gleitet nun an diesem Schenkel äußerlich eben so herab, wie man an dem andern heraufgegangen war. Würde übrigens an dieser Seite noch eine besonders genaue Betastung nöthig erachtet, so wählt man dazu lieber die andere (d. i. die linke) Hand, so wie es sich denn auch von selbst ergiebt, daß bey Kranken oder Gebärenden diese äußere Untersuchung ganz im Liegen oder Sitzen vorgenommen werden muß, obwohl diese letztere Haltung des Körpers namentlich der Untersuchung des Beckens weit weniger günstig ist als die aufrechte Stellung.

b) Innere Manual-Untersuchung.

§. 101.

In den Bereich derselben fällt hauptsächlich Erforschung a) der Mutterscheide, ihrer Weite, ihrer innern Fläche, ihrer Querfalten, Schleimabsonderung, Temperatur u. s. w.; sodann b) der Scheidenportion des Fruchthälters und des Muttermundes; c) des vorliegenden Theiles vom Ey überhaupt und insbesondere vom Kinde, so wie anderer vielleicht krankhafter hier wahrzunehmender Geschwülste u. s. w., und endlich d) des innern Raumes vom kleinen Becken. — Am zweckmäßigsten wird die innere Untersuchung blos mit einem Finger, dem Zeigefinger, unternommen; selten wird man, um etwas höher herauf zu reichen, den Mittelfinger noch mit hinzu nehmen, und nur im Nothfall der genauesten Bestimmung eines etwa sehr verunstalteten Beckens oder des vorliegenden Kindestheils, gebraucht man die ganze Hand.

§. 102.

Vorbereitungen zur innern Untersuchung sind, außer der §. 94. u. 95. angegebenen, erstens Sorge für eine zweckmäßige Stellung der zu Untersuchenden. Auch hier nämlich

ist wieder der aufrechte Stand, bey welchem die Frau an eine Wand oder einen Tisch sich etwas anlehnt, und der Untersuchende auf das rechte Knie (wenn er mit der rechten Hand untersucht, im Gegentheil auf das linke) sich niederläßt, der genauen Untersuchung am günstigsten; nächst diesem kann man bey Kränklichen oder Gebärenden auch die sitzende Stellung (am besten dann auf einem vorne mit einem Ausschnitt versehenen Sessel, auf einem Geburtsstuhle, Sella exploratoria) oder die horizontale Lage wählen, nur daß im letztern Falle der Untersuchende entweder auf dem Rande des Bettes sich niederlassen oder zur Seite desselben stehen wird. — Zweitens ist für Oehl, Fett oder ungesalzene Butter zu sorgen, indem das Einsalben des untersuchenden Fingers theils um weniger Schmerz zu machen, theils um der Gefahr der Ansteckung sich nicht auszusetzen, unumgänglich nöthig ist*); Und endlich sind einige Tücher zum Abtrocknen und zum Unterbreiten auf den Boden des Zimmers bey Untersuchung in aufrechter Stellung, so wie Geräthschaften zum Waschen vorräthig zu halten.

§. 103.

Die Untersuchung selbst vollzieht man so, daß, nachdem die zu Untersuchende eine passende Stellung angenommen, und Ausleerung von Stuhl und Urin, so wie (im Falle etwaiger Verunreinigung der Geschlechtstheile) Auswaschung derselben mittelst eines Schwammes Statt gehabt hat, man den untersuchenden Zeigefinger hinlänglich mit einer Fettigkeit bestreicht, ihn in die Hand einschlägt, mit Daumen und Mittelfinger bedeckt, und nun selbst eine der Haltung der Frau entsprechende Stellung annimmt. Man führt jetzt die geschlossene Hand an der innern Fläche des Schenkels (wenn man mit der rechten Hand untersucht, am linken Schenkel) herauf, öffnet dieselbe an den Genitalien, um durch Daumen und Mittelfinger die äußern und innern Schamlippen vor-

*) Man benutzt wohl auch bey Untersuchung syphilitischer Personen das Unguentum neapolitanum für diesen Zweck, indeß schützt es wohl schwerlich viel mehr als gewöhnliches Fett.

sichtig, ohne Schmerz zu erregen oder die Schamhaare zu dehnen, auseinander zu legen, und bringt nun den Zeigefinger selbst behutsam in die Schamspalte ein, indem man hierbey theils die Klitoris nicht zu berühren Sorge trägt, theils bey jungfräulichem Zustande das Hymen vermeidet, streckt dann Mittel-, vierten und kleinen Finger nach hinten über den Damm aus, und legt die andere Hand äußerlich über die Kleidung an die Bauchfläche, um nöthigenfalls den Uterus mehr zu fixiren oder gelind aufzuheben, wenn er wegen zu weit vorwärts gerichtetem Grunde die Untersuchung der Vaginalportion erschwert.

§. 104.

Indem nun so der Finger im Becken aufwärts geführt wird, untersucht man nach den §. 101. bemerkten Rücksichten theils die Mutterscheide, den Mutterhals und Muttermund (wobey zum Messen des erstern das insgemein zolllange vorderste Fingerglied als bequemster Maaßstab dient) so wie den zuweilen durch das Scheidengewölbe fühlbaren Körper oder Grund des Fruchthälters genau, und mittelst ruhiger, Schritt vor Schritt gehender Betastung. Hierauf wendet man sich zur Ausmittelung der vielleicht zu entdeckenden Kindestheile oder anderer Theile des Eyes, wobey, was das Wahrnehmen des Kindestheils, namentlich in früherer Zeit der Schwangerschaft betrifft, die Regel gelten kann, daß man denselben immer am leichtesten erreichen werde, wenn der Finger gerade hinter dem Schambogen heraufgeführt und hier etwas still gehalten wird, wobey sich der Kopf oft als bewegliche leichte Kugel, namentlich bey einem äußern Drucke von selbst auf die Fingerspitze auflegt. Endlich aber achtet man genau auf die Durchmesser, wie auf Krümmung, Neigung, Höhe und sonstige Bildung des Beckens, welches durch Hin- und Herbewegen der Fingerspitze (vorausgesetzt, daß das Gefühl mittelst vielfacher Uebungen an trockenen Becken, Leichnamen und lebenden Körpern hinlänglich geschärft sey) sehr wohl, ja am beßten bestimmt werden kann. — Ist nun alles hierher gehörige genügend untersucht, so wird der Finger zurückgeführt, wieder in die Hand eingeschlagen,

und die Hand selbst ruhig wieder unter der Kleidung oder Bettdecke hervorgeführt, um sie alsbald zu reinigen.

§. 105.

Will man übrigens mit zwey oder mehreren Fingern untersuchen, so verfährt man zwar im erstern Falle wieder ohngefähr wie bey der Untersuchung mit einem Finger, im andern Falle hingegen muß man die ganze Hand mit Oehl bestreichen, dieselbe möglichst gestreckt und conisch zusammengelegt mit ihrer Breite im geraden Durchmesser des Beckenausganges gestellt, behutsam, gelind drehend, und in der Führungslinie einbringen. Im Becken dienen dann die eingebrachten ausgesperrten oder aneinanderliegenden fünf Finger zu sehr genauer Schätzung des Beckenraumes, und zwar indem man sich zuvörderst durch Vergleichung an einem Zollstabe genau bekannt macht: theils wie viel der Raum zwischen ausgespanntem Zeige- und Mittelfinger, theils wie viel der Raum zwischen ausgesperrtem Zeigefinger und Daumen an der eigenen Hand beträge, dann aber auch mißt, wie breit drei, vier oder fünf Finger der Hand sind, und nun diese Größen mit dem Gefühle bey der Untersuchung selbst vergleicht. — Noch ist denn auch der Untersuchung durch den Mastdarm als einer Abart der innern Untersuchung zu gedenken, in wiefern dieselbe namentlich bey manchen Krankheiten der innern Genitalien, Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter u. s. w. von Wichtigkeit ist. — Man unternimmt dieselbe, nachdem vorher ein oder einige Lavements gegeben worden sind, ohngefähr wie die innere Untersuchung der Mutterscheide mit einem eingeöhlten Zeigefinger, läßt der zu Untersuchenden eine Seitenlage oder, noch besser, die Lage, auf Knie und Ellbogen gestützt, annehmen, und bringt nun den Finger gelind drehend nach der Richtung des Mastdarmes aufwärts, um so das Verhalten des Uterus, des Beckens u. s. w. zu erforschen.

Bey allen diesen Untersuchungen ist übrigens die vielfachste Uebung allein fähig, einen höhern Grad von Fertigkeit zu gewähren, und den Resultaten der Exploration eine größere Sicherheit zu verschaffen, weßhalb denn allen ange-

henden Frauenärzten, Geburtshelfern und Hebammen dieselbe nicht dringend genug empfohlen werden kann. —

2. Instrumental-Untersuchung.

§. 106.

Sie beschränkt sich vorzüglich auf die genauere Ausmessung des Beckens und theilt sich wieder, je nachdem diese Messung von außen oder im innern Beckenraume selbst veranstaltet wird, in die innere und äußere: — Zwar hat man auch zur nähern, durch den Sinn des Gesichts vorzunehmenden Untersuchung der innern weichen Geburtstheile vor einiger Zeit ein Instrument empfohlen, welches der von Bozzini*) erfundene Lichtleiter ist; allein abgesehen, daß offenbar hier das Getast seiner Natur nach wichtigere Ergebnisse als das Gesicht verspricht, so würde auch dieser ganze Apparat in seiner Anwendung so unschicklich, ja komisch erscheinen, daß wir ihn geradezu, wenigstens was Erforschung dieser Theile betrifft, in das Reich der praktisch völlig unnützen Träumereyen verweisen müssen. — Ueberhaupt ist im Allgemeinen von der Instrumental-Untersuchung weit weniger praktischer Vortheil, und ein weniger sicheres Resultat zu ziehen, als von der Manual-Untersuchung, ja viele der erfundenen Instrumente sind als völlig unbrauchbar zu verwerfen, und wir gedenken daher nur der einigermassen nutzbaren, indem wir zugleich bemerken, daß die Idee des Beckenmessers als eine deutsche Erfindung zu betrachten, und von G. W. Stein dem ältern ausgegangen ist, welcher seinen ersten einfachen Beckenmesser 1772 bekannt machte.

§. 107.

Zu den äußerlich anwendbaren Beckenmessern gehört zuerst: der Dickenmesser Baudeloque's (Compas

*) S. D. Ph. Bozzini: Der Lichtleiter, oder Beschreibung einer einfachen Vorrichtung und ihrer Anwendung zu Erleuchtung innerer Höhlen und Zwischenräume d. lebenden animalen Körpers. Weimar, 1806. Fol.

d'epaisseur), ein Tasterzirkel mit einem zwischen seinen Schenkeln angebrachten verjüngten Zollstabe, mittelst dessen die Zirkelschenkel selbst festgestellt werden können. Man bezweckt dadurch vorzüglich die Bestimmung der Conjugata des Beckeneinganges, indem die mit platten Knöpfen versehenen Schenkel des Zirkels, einer außen auf der Mitte der Schamfuge, der andere hinten an der Spitze des Stachelfortsatzes vom letzten Lendenwirbel aufgesetzt werden, und nach festgestellten Schenkeln nun das Instrument abgenommen, und die Entfernung des Knopfes am verjüngten Maaßstabe gemessen wird, von welcher Weite (bey regelmäßigem Becken insgemein 7 Zoll) sodann 2½ Zoll für die hintere, und ½ Zoll für die vordere Beckenwand (also überhaupt 3 Zoll) abzuziehen ist, um die Conjugata zu finden. Freilich lassen nun hierbey verschiedene Dicke der Beckenwände, innere Knochenauswüchse u. s. w. Gelegenheit zu manchen Irrungen zu *), demohnerachtet stimme ich H. v. Siebold bey, welcher es in der Mehrzahl der Fälle ein nützliches und brauchbares Werkzeug nennt **). — Läßt man das Instrument in nicht zu kleinen Dimensionen verfertigen (etwa so, daß die größte Entfernung beider Knöpfe gegen 15 Zoll beträgt), so kann man es zugleich als Hüftenmesser benutzen, ohne hierzu noch eines besondern Instrumentes zu bedürfen, und bestimmt demnach hierdurch theils den Querdurchmesser des großen Beckens beynahe unmittelbar, theils den Querdurchmesser des Beckeneinganges durch Messung der Breite an den Trochanteren (insgemein 13 Zoll), von welchen man 8 Zoll für Seitenwände und Schenkelhals abzieht. —

Ferner ist hier zu erwähnen der Neigungsmesser (Cliseometer) von G. W. Stein, ein Quadrantenähnliches Werkzeug, dessen Zweck ist, die Neigung der untern Beckenöffnung gegen den Horizont zu messen, dessen Anwendung

*) In meiner Anstalt z. B. gebar vor kurzem eine Person ein wohlausgetragenes starkes Kind natürlich, und der Dickemesser zeigte nur eine Beckentiefe von 6 Zoll, ließ folglich auf eine Conjugata von 3 Zoll schließen.

**) Lehrb. d. theoret. prakt. Entbindungsk. 2. Thl. S. 29.

jedoch mit zuviel Umständlichkeiten verknüpft ist, und dessen praktischer Nutzen so gering ist, daß es höchstens zur Berichtigung der Theorie und Anwendung an Skeletten zu empfehlen ist *). Etwas leichter anwendbar ist dagegen der Neigungsmesser von B. Fr. Osiander, allein da er die Neigung des Beckens blos durch die mehr oder weniger schief gestellte Wand der Schamfuge bestimmt, so wird er bey verbildetem Becken wieder häufig irre leiten **).

§. 108.

Zu den innerlich anwendbaren Beckenmessern gehört als eines der einfachsten Instrumente, der kleine verbesserte Stein'sche Beckenmesser; ein bloßer geknüpfter Zollstab mit beweglichem Zeiger, mittelst welchem man, nachdem er eingeöhlt, möglichst tief gegen das Promontorium in das Becken gebracht, und der Zeiger an der innern Schamfugenfläche fixirt worden, die Diagonalconjugata der Beckenhöhle (s. §. 38.) mißt, und folglich um die eigentliche Conjugata des Einganges zu finden, noch $\frac{1}{2}$ Zoll abziehen muß. — Beynahe noch einfacher und in jedem Augenblicke zu fertigen ist ferner der Stark'sche Beckenmesser, welcher aus einem dünnen, um den Zeigefinger geschlungenen seidenen Faden, und einer auf diesem Faden durch den Daumen beweglichen Korkscheibe besteht. Man bringt Zeigefinger und Daumen aneinanderliegend, die Korkscheibe auf dem Daumennagel gestellt, ein, entfernt nun beyde Finger in der Richtung der Diagonalconjugata möglichst weit, nimmt dann das Werkzeug heraus und mißt die Entfernung der Korkscheibe von der Zeigefingerspitze mittelst eines Zollstabes.

Endlich gedenken wir noch des größern Stein'schen Beckenmessers, welcher aus zwei auswärts gebogenen scherenartig beweglichen, durch eine Stellschraube zu fixirenden Armen besteht. Er wird erwärmt und eingeöhlt, ge-

*) S. dessen Abbildung bey B. N. G. Schreger die Werkzeuge d. Entbindungskunst. 1. Thl. Erlangen 1799. Fol. Tab. III. Fig. 16.

**) S. dessen Handbuch der Entbindungskunst. Bd. 1. S. 16 u. f.

schlossen in die Scheide gebracht, der hintere Arm an den Vorberg, der vordere an die innere Fläche der Schamfuge gesetzt, die Erweiterung beyder Arme durch die Stellschraube bezeichnet und alsdann das Werkzeug geschlossen und wieder herausgeführt. Man mißt hierauf die Weite der bis zur Stellschraube wiederum geöffneten Arme, und findet auch so die Diagonalconjugata der Beckenhöhle *). Die Anwendung dieses Instruments hat jedoch am lebenden Körper große Schwierigkeit, es erregt leicht Schmerzen, wird in seiner Erweiterung sehr durch die weichen Theile gehindert (was schon von den beiden vorigen einfachern Werkzeugen gilt) und giebt ein falsches Resultat, weßhalb es zum praktischen Behuf gar nicht empfohlen werden kann. Dasselbe gilt dann auch von den Beckenmessern Coutouly's, Aitken's, Köppe's, Asdrubali's, Jumelin's und Anderer, weßhalb wir dieselben ganz übergehen. **)

§. 109.

Bevor wir nun die Lehre von der Instrumentaluntersuchung gänzlich verlassen, müssen wir noch, in wiefern nach §. 10. u. 11. nicht blos das Weib, sondern auch die Frucht Gegenstand der Gynäkologie ist, der zur Untersuchung des Kindes erfundenen Werkzeuge gedenken, welche wir unterscheiden in solche, die zur Ausmessung des Kindes noch innerhalb des mütterlichen Körpers, und in solche, die zur Messung und Wägung desselben außerhalb dieses Körpers benutzt werden. — Zu den erstern gehören aber die an den Griffen mehrerer Geburtszangen angebrachten Gradbögen oder Maaßstäbe ***), von Stein †), ihrem Erfinder, Labimeter genannt, welche, indem sie den Grad der Eröffnung der Zangenblätter anzeigen, auch das Maaß von dem zwischen die Zange gefaßten Kopfe angeben. Aitken, Osiander, Busch, haben diese Vorrichtung an ihren Zangen benutzt, doch gewährt sie wenig Genauigkeit wegen der verschiedenen

*) S. d. Abbildung bey Schreger a. a. O. T. II. F. 2.

**) Auch von diesem giebt Schreger a. a. O. nähere Beschreibung.

***) Wir werden darauf bey den Geburtszangen zurückkommen.

†) S. W. Stein kurze Beschreibung eines Labimeters. 4. 1782.

Faſſung des Kopfes, und im Allgemeinen wird ſchon jeder Geburtshelfer, der ſeine Zange kennt, die bedeutendere oder geringere Kopfgröße dem Augenmaaße nach beſtimmen können. — Zu dem zweiten Behufe kann allerdings jede größere Wage, jeder Zollſtab und Taſterzirkel benutzt werden, doch hat man auch hierzu beſondere Werkzeuge erfunden, wohin der Cephalometer Stein's (ein Taſterzirkel mit Gradbogen) und deſſen Baromacrometer*), Oſiander's Wage, und die beſonders zweckmäßige Vorrichtung (Paediometer) von Siebold **) gehören.

III. Von den allgemeinen Regeln der Diätetik und Therapie für das weibliche Geſchlecht.

a. Diätetik.

§. 110.

Alle Diätetik oder Hygiaſtik, und ſo auch die für das weibliche Geſchlecht, hat eines Theils den Zweck, den Willen der Natur rückſichtlich der dem Körper unerläßlichen Bedürfniſſe zu deuten, und die Gewährung dieſer Bedürfniſſe zu leiten und zu ordnen, andern Theils den Zweck, alles der körperlichen und geiſtigen Thätigkeit Nachtheilige und Gefährliche zu verhüten. In wiefern nun aber die Entwicklung weiblicher Individualität eine rein menſchliche, und in ſofern der männlichen gleiche iſt, welche demnach im Weſentlichen nur die Begünſtigung durch rechte Anordnung von Nahrung und Luft, Ruhe und Bewegung, Schlaf und Wachen, Licht und Wärme fordert, ſo können auch die Regeln der Hygiaſtik überhaupt, ſehr wohl auf die Leitung des geſunden weiblichen Organismus angewendet werden, und die Modifikationen, welche ſich im ſpeciellen Theile hierüber ergeben werden, können folglich theils blos auf die dem weiblichen Organismus ausſchließend eigenthümlichen Funktionen

*) G. W. Stein kurze Beſchreibung eines Baromacrometers und Cephalometers. 4. 1775.

**) El. d. Siebold De Paediometro Commentarius. 4. Berol. 1818.

(z. B. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) sich beziehen, theils werden sie durch die allgemeinern Eigenthümlichkeiten desselben bestimmt werden. Zu den letztern gehören daher namentlich solche Regeln, welche von der individuellen Stimmung weiblicher Sensibilität, so wie des weiblichen Ernährungsprocesses herbeygeführt werden, und nur hierüber ist jetzt einiges Nähere zu erinnern, dahingegen die Regeln für Behandlung des gesunden weiblichen Körpers im Zustande der Schwangerschaft, Geburt, Wochen- und Stillungsperiode durchaus für den speciellen Theil aufbehalten bleiben müssen.

§. III.

Bey Entwerfung allgemeiner diätetischer Regeln für das weibliche Geschlecht werden wir sonach auf die §. 58. u. f. erörterten Regeln vorzüglich fußen. — Was also 1) Bestimmung der Lebensordnung rücksichtlich der Aufnahme von Nahrungsmitteln betrifft, so fordert der weibliche Körper bey schnellerem Stoffwechsel, rascherer Assimilation und regerer Sensibilität der Verdauungsorgane a) das häufigere Aufnehmen nährender Stoffe. Den Frauen, beynahe wie den Kindern, scheint es daher natürlich, öfterer zu essen und öfterer zu trinken, so daß also die hin und wieder eingeführte Sitte täglich nur eine einzige Mahlzeit zu halten, außer derselben aber, mit Ausnahme einiges Getränkes, fast nichts zu genießen, dem weiblichen Körper offenbar am wenigsten angemessen ist. b) Die Menge aufzunehmender Nahrung betreffend, so steht es mit der vorigen Regel schon in Uebereinstimmung, daß dieselbe geringer seyn müsse, und c) die Art und Wahl der Nahrung anbelangend, so darf man weder eine zu rohe und schwerverdauliche Kost dem Weibe insbesondre zuträglich erklären, noch dürfen namentlich erhitzende, stark reitzende Getränke und Speisen für dieses Geschlecht gebilligt, und alle starken Gewürze, stark gesalzene Speisen, so wie geistige betäubende Dinge müssen hier möglichst vermieden werden, wenn nicht nach und nach hysterische Beschwerden, Krämpfe, Obstruktionen u. s. w. entstehen sollen. Ebendeßhalb pflegen daher leichte Fleischspeisen, Milch, mehlichte Vegetabilien u. s. w. eine dem weiblichen Geschlecht vor-

züglich angemessene Nahrung zu seyn. — Die Ausleerungen des Darmkanals endlich, welche wie schon erinnert an und für sich im Weibe sparsamer zu erfolgen pflegen, müssen eben deßhalb sorgfältig berücksichtigt, durch mäßige Körperbewegung, Vermeidung des den Unterleib beengenden, durch weibliche Arbeiten leider oft veranlaßten zu vielen Sitzens, so wie durch Vermeidung aller den Unterleib nachtheilig pressender Kleidung, in regelmäßiger Ordnung erhalten werden.

§. 112.

2) Die Gefäßthätigkeit angehend, so werden, in wiefern dieselbe im Weibe überhaupt schon verhältnißmäßig aufgeregter ist, alle Einwirkungen, welche in dieser Hinsicht einen nachtheiligen Erethismus veranlassen könnten, vermindert werden müssen. Heftige Gemüthsbewegungen, Stürme der Leidenschaften müssen daher nicht minder, als Uebermaaß erhitzender Bewegungen, z. B. des Tanzes, oder erhitzender Speisen und berauschender Getränke der Gesundheit nachtheilig sich zeigen; eben so wie ferner auch alle Einflüße, welche zur Bildung von lokalen Blutanhäufungen führen, als: sehr beengende Kleidung, Schlafen in dicken Federbetten, Ueberladung mit warmen Getränken, Thee, Kaffee, Schokolade u. s. w. hier zu erwähnen, und für das weibliche Geschlecht als nachtheilig zu bemerken sind. — 3. Die Athmung und Ausscheidung betreffend, so muß bey den kleinern Respirationsorganen und größerer Neigung zu Brustkrankheiten um so sorgfältiger alles, wodurch die Athmungsthätigkeit gestört werden könnte, vermieden werden; hierher rechnen wir denn theils Einathmen sehr erkälteter reiner Luft, oder sonstige plötzliche Abkühlung durch Trunk oder Bad nach vorausgegangener Erhitzung, vorzüglich durch anhaltendes Tanzen (die Todesursache für manche blühende Mädchengestalt), ferner das Tragen von Schnürbrüsten, allzuangestrengtes Singen u. s. w. — Rücksichtlich der im weiblichen Geschlecht überhaupt thätigern Hautaussonderung ist ferner eine sorgfältige Hautkultur sowohl, als in allen kältern Klimaten eine diesen angemessene wärmere Körperbekleidung vorzüglich nothwendig, und man erklärt mit Recht die Entstehung vielfa-

cher Leiden der Frauen aus der Vernachläßigung dieser beyden Punkte.

§. 113.

4) Die Regeln, welche endlich in Bezug auf die höhern animalen Funktionen im Allgemeinen zu geben sind, beziehen sich theils auf die Sinnesthätigkeit, welche eben in wiefern sie feiner und erregbarer ist, überall schöne sittliche Mäßigung zur Pflicht macht; theils auf die Bewegung, welche, in wiefern sie von weniger ausgewirkten Organen geübt wird, allzugewaltsame und heftige Anstrengungen verbietet. Was ferner die Erscheinungen des höhern Nervenlebens und ihre naturgemäße Leitung betrifft, so ist eine gewisse psychische Hygiastik für das weibliche leicht bewegliche Gemüth ganz vorzüglich nothwendig, und man darf wohl hier an den Satz erinnern, welchen J. Paul Fr. Richter über geistige Ausbildung im Allgemeinen aufstellte, daß nämlich der Mensch nach der Seite hin, wo er von der Natur am wenigsten begünstigt sey, sich vorzüglich zu bilden streben solle, um so das harmonische Gleichgewicht im Innern zu erhalten. — Bey den Frauen nun, wo das Gemüth an und für sich vorwaltet, wird eben dadurch Kultur des Verstandes und der Willenskraft Hauptaugenmerk allgemeiner Bildung seyn müssen; dahingegen eine auf stäte Erregung des Gemüths abzweckende geistige Beschäftigung, Romanenleserey, falsche Mystik u. s. w. dieses Geschlecht so leicht zur widrigsten Empfindeley, ja durch stäte Ueberspannung des Nervensystems zu so vielfältigen selbst körperlichen Krankheiten führen muß. — Vertrauungsvolles Haften an einem Höchsten, unerschütterlich Festen und Ewigen im Innern, stille gleichmäßige wohlgeordnete Thätigkeit im Aeußern, bey klarer einfacher aber wohlgegründeter Entwicklung des Verstandes, dieß mögen die Elemente heißen, in denen die Seelengesundheit, deren Wesen von dem scharfsinnigen Heinroth*) so wahr gezeichnet worden, dem weiblichen Geschlechte erreicht

*) S. in dessen Lehrbuch der Seelenstörungen die Vorbegriffe. Thl. I.

und bewahrt wird, und in welchen die Reinheit und wohlthuende Ruhe der edlen Frau sich bewährt. —

b) Therapie.

§. 114.

Nothwendig zwar müssen die allgemeinen Grundsätze, nach denen wir die Heilung menschlicher Krankheiten einleiten, auch für die Behandlung weiblicher Krankheiten insbesondre gültig seyn, eben so wie die allgemeinen Grundsätze der Hygiastik auch für das weibliche Geschlecht gegolten hatten, demohnerachtet können und müssen für die ärztliche Behandlung, selbst solcher Krankheiten, welche beiden Geschlechtern gemein sind, gewisse besondre Regeln aufgestellt werden, welche abermals auf die im Vorigen erörterte Individualität des Weibes im gesunden und kranken Zustande sich gründen werden. Wir gehen die wesentlichsten derselben hier durch: — Es gehört aber hierher zunächst eine nach der allgemeinen Individualität des Weibes abgemessene Lebensordnung bey Krankheiten. Weibliche Kranke verlangen in der Regel besondere Vorsicht in der Anordnung ihrer äußern Umgebungen; ein recht ruhiges freundliches Krankenzimmer, recht sorgfältige Vermeidung aller gewaltsamern Sinneseindrücke und Gemüthsbewegungen müssen sonach hier vorzüglich wünschenswerth seyn, und in Verbindung mit angemessener Diät (wo auch bey der Reconvaleszenz die erregenden roborirenden Dinge, als Wein u. dgl., bey übrigens gleichen Umständen, in weit weniger starken Dosen als beym männlichen Geschlecht gegeben werden dürfen) werden sie bey einem Körper, wo, fast wie im kindlichen, die Naturkraft überhaupt zur Heilung von Krankheiten mehr vermag, vorzüglich viel zur Wiederherstellung der Gesundheit beytragen.

§. 115.

Ferner was die Darreichung von Arzneymitteln u. s. w. betrifft, so ist zuvörderst überhaupt zu bemerken, daß sehr heftig einwirkende, sogenannte heroische Heilmittel für das weibliche Geschlecht im Ganzen am wenigsten sich eignen,

daß aber auch von andern Arzneymitteln, der größern weiblichen Receptivität gemäß, bey übrigens gleichen Umständen, weiblichen Kranken immer etwas schwächere Gaben als männlichen gereicht werden müssen. — Die Heilmethoden selbst anbelangend, so ist darüber im Allgemeinen wohl nur soviel zu erinnern, daß, da zufolge der vorherrschenden Thätigkeit reproduktiver und insbesondre der Verdauungs-Organe, auch hier vorzüglich die Quelle unzähliger Krankheiten verborgen liegt, die Aufmerksamkeit und Wirksamkeit des Arztes insbesondre nach dieser Seite gerichtet seyn müsse *). — Außerdem nöthigt uns indeß die vorwaltende Reitzbarkeit des weiblichen Körpers, die Neigung zu Schmerzen, Krämpfen u. s. w. hier häufiger als im männlichen Körper von Mitteln Gebrauch zu machen, welche, obwohl wieder zunächst das vegetative Leben ansprechend, vorzüglich die angeregte Sensibilität herabzustimmen vermögen; wohin insbesondre laue Bäder, Narcotica u. s. w. gehören; wobey jedoch sehr zu hüten ist, daß diese, insgemein nur als palliativ wirkende Mittel angezeigten Dinge, nicht als Hauptmittel angesehen werden, indem gerade bey weiblichen Krankheiten vorzüglich das gehäufte Anwenden sogenannter antispasmodischer und Nerven-Mittel öfters gar sehr zum Nachtheil gereicht. — Daß übrigens auch bey diesem Geschlecht die eigentlich psychische Einwirkung des Arztes durch Erweckung eines festen Vertrauens und durch entschiedenes Benehmen sehr viel ausrichte, unterliegt keinem Zweifel, und ist schon §. 88. erwähnt worden.

§. 116.

Endlich aber bleibt es bey Behandlung weiblicher Krankheiten immer von ausgezeichneter Wichtigkeit, die merkwür-

*) Ueberhaupt bedenkt man wohl zu wenig, daß eigentlich die Krankheiten des Körpers insgesammt der bildenden (vegetativen) Seite desselben angehören, daß die eigentliche Arzneykunde eben so nur die Bildung (den stätigen Stoffwechsel), ja zunächst vorzüglich nur den Darmkanal in Anspruch nehmen könne, und daß die Verirrungen der Nervenpathologie und des Brownianismus hauptsächlich darin begründet waren, daß sie stäts das Erkranken von Thätigkeiten vor Augen hatten, ohne die zunächstliegenden und der Medicin wichtigern abnormen Bildungsrichtungen zu beachten.

digen, so tief in das weibliche Leben eingreifenden eigenthümlichen Funktionen der Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Wochen- und Stillungsperiode genau zu beachten, woraus sich denn die Anzeige ergiebt, nicht nur Unordnungen, welche in diesen Funktionen Statt gehabt haben, zu beseitigen, sondern auch dann, wenn gerade eine dieser Perioden vorhanden ist, und andere krankhafte Zustände ärztliches Eingreifen nöthig machen, darauf Rücksicht zu nehmen, daß der normale Gang derselben dadurch keine Störung erleide. In letzterer Hinsicht geschieht es daher, daß z. B. zur Zeit der eintretenden Menstruation der Gebrauch von Arzneymitteln gewöhnlich, und zwar mit Recht zurückgesetzt wird, und in eben dieser Hinsicht erfordert die Behandlung der Krankheiten von Schwangern und Wöchnerinnen, seyen es auch gar keine diesem Geschlecht ausschließend eigenthümliche Krankheiten (also z. B. Fieber, Rheumatismen, Diarrhöen u. s. w.) besondere Vorsicht, damit nicht vielleicht ein im Allgemeinen vollkommen zweckmäßiges Mittel, in diesem Falle durch Unterbrechung einer solchen wichtigen Funktion nachtheilig werde.

§. 117.

In wiefern wir nun über allgemeine Pathologie, Hygiastik und Therapie des weiblichen Geschlechts keine besondern Werke besitzen, so halte ich es hier noch für den schicklichsten Ort, der beachtungswerthesten Hand- und Lehrbücher theils über den gesammten Kreis, theils über einzelne Hauptfächer der Gynäkologie zu gedenken. Zuerst nennen wir die Schriften, welche zusammengenommen ziemlich die ganze Gynäkologie begreifen. Dahin gehören:

a) Fried. Benj. Osiander Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten von Krankheiten der Frauenzimmer und Kinder. Tübingen 1787.

Dieser Schrift folgte später von demselben eine andere: Ueber die Entwicklungskrankheiten in den Blüthenjahren des weiblichen Geschlechts. 1. Th. Göttingen 1817. 2. Th. Tübingen 1818.

b) Desselben Grundriß der Entbindungskunst in 2 Theilen. 1) Schwangerschafts- und Geburtslehre, 2) Entbindungs- und Werkzeugslehre enthaltend.) Göttingen 1802. 8.

Neuerlich ist an dessen Stelle getreten das vorzüglich durch literarischen Reichthum interessante Lehrbuch der Entbindungskunst von demselben. Tübingen 1818. 1r Thl.

a) J. C. G. Jörg Systematisches Handbuch der Geburtshülfe. Leipz. 1807. u. desselben

b) Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes nebst einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus. Leipz. 1809. 8.

a) El. v. Siebold Lehrbuch der theoret. prakt. Entbindungskunde. 2 Bde. 3te Aufl. Nürnb. 1812. und dessen

b) Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten. Frankf. a. M. 1811. 2 Bde.

(Ebenfalls eine ausführliche Physiologie und Psychologie des weibl. Geschlechts enthaltend.)

Uebersichten der Frauenkrankheiten allein geben:

J. Astruc theoret. prakt. Abhandlung von den Frauenzimmerkrankheiten. A. d. Franz. von Otto. Dresden 1768. 6 Bde. (eigentlich gehört auch hierzu noch eine obwohl sehr kurze Anleitung zur Geburtshülfe unter dem Titel: L'art des accouchemens reduit à ses principes. Paris 1766.

Chambon de Montaux medicin. prakt. Abhandlungen von den Krankheiten verheiratheter und unverheiratheter Frauenzimmer. A. d. Franz. v. Spohr. Nürnb. 1787. 8. u. desselben Arzt f. Schwangere. A. d. Franz. 1792.

Chr. Ludw. Mursinna Abhandlung von den Krankheiten der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Säuglinge.

Alex. Hamilton's Unterricht in der Behandlung der Frauenzimmer und neugeborener Kinderkrankheiten.

Joh. Ant. Schmidtmiller Handbuch d. medicinischen Geburtshülfe (1. Th. die Krankheiten der Schwangern und Gebärenden, 2. Th. die der Wöchnerinnen und neugeborenen Kinder enthaltend.)

L. J. C. Mende die Krankheiten des Weibes nosologisch und therapeutisch bearbeitet. Leipz. 1810. 2 Thle.

Kürzer und unvollständiger als die vorhergehenden sind:

Jos. A. Millmeyer der Arzt f. Frauenzimmer. Lpz. 1800.

Mellin der Frauenzimmerarzt. Kempten. 1807.

Mehr mit Hinsicht auf Hygiastik und zum Theil mehr populär bearbeitet sind folgende:

Ad. Nolde Gallerien der ältern und neuern Gesundheitslehrer für das schöne Geschlecht. Rostock 1794.

G. Fr. Hoffmann d. j. wie können Frauenzimmer frohe Mütter gesunder Kinder werden, und selbst dabey gesund und schön bleiben. 3 Bde. Frankf. 1791.

Zum Theil gehören auch hierher die früher (§. 76.) angeführten Schriften von Roussel, Moreau, Klees u. s. w.

Uebrigens werden auch in mehrern Lehrbüchern der Geburtshülfe wenigstens die Krankheiten der Schwangern, der Wöchnerinnen und Neugeborenen mit abgehandelt. Dahin gehören:

Theoretisch-praktische Abhandlung über die Geburtshülfe und Krankheiten der Schwangern, Kindbetterinnen und neugeborenen Kinder. A. d. Franz. mit Anmerk. von J. Chr. Stark. 3 Theile. Erfurt 1800.

J. J. Plenk Anfangsgründe der Geburtshülfe. 5te Aufl. Wien 1792.

Lud. Fr. v. Froriep theoret. prakt. Handbuch d. Geburtshülfe. 6te Aufl. Weimar 1818.

(Die Krankheiten d. Wöchnerinnen u. Kinder mitumfassend.)

Was nun übrigens die wichtigern Lehrbücher der Entbindungskunde selbst, so wie die besondern Schriften über Kinderkrankheiten u. s. w. betrifft, so werden diese späterhin im zweyten Theile der speciellen Gynäkologie namhaft gemacht werden.

II.

Specielle Gynäkologie.

Erster Theil.

Vom Leben des Weibes an und für sich, im gesunden und kranken Zustande.

Erster physiologisch-diätetischer Abschnitt.

I. Von der normalen Entwicklung, Reife und Ertödtung des Geschlechtscharakters.

§. 118.

Indem wir bereits früher theils von der Entwicklung der Geschlechtstheile (§. 25. u. f.), theils von den einzelnen Lebensperioden des weiblichen Geschlechts im Allgemeinen (§. 66. u. f.) gehandelt haben, bleibt uns für diesen speciellen physiologischen Theil hauptsächlich noch die genauere Beachtung der dem Weibe im nicht schwangern Zustande charakteristischen Funktion der Menstruation (Menstruatio, Fluxus mensium, Catamenia), ihrer Evolution, Dauer und Revolution, ihren Quellen, ihrer Qualität und Quantität nach übrig; Gegenstände, welche allerdings um so genauere Erwägung fordern, da wir gerade in Hinsicht dieser Function auf die mannigfaltigsten krankhaften Zustände stoßen werden, deren rechte Ansicht doch allein aus der möglichst vollkommnen Kenntniß des Gesunden sich ergeben kann.

§. 119.

Eintritt der Menstruation. Bedingt von der im Weibe überwiegenden reproduktiven Thätigkeit, welche in wiefern sie eben das Geschlecht charakterisirt, auch bey sich minderndem und aufhörendem individuellem Wachsthum namentlich durch die Organe für Fortbildung der Gattung, d. i. durch die Geschlechtsorgane sich anzeigen und entladen muß, erscheint die Menstruation, gleichsam als kritischer Blutfluß, wodurch eine vorausgegangene Congestion nach den Genitalien sich entscheidet. Ihr Eintritt wird daher von mehreren Symptomen theils verkündet, theils begleitet, welche wir als Vorboten, als Bestrebungen zur Menstruation (Molimina ad Menstruationem) bezeichnen. Wir unterscheiden bey diesen Zufällen theils allgemeine, theils lokale Zustände: — Zu den erstern gehören diejenigen Wahrnehmungen, welche auf Ueberfluß der Säftemasse hindeuten; d. i. Schwere der Glieder, Röthe der Haut, Neigung zu Congestionen nach verschiedenen einzelnen Organen, aus denen sich manche schmerzhafte Empfindungen erklären lassen; z. B. der dumpfe oft klopfende Kopfschmerz, Zahnschmerzen, Brustbeschwerden, und insbesondere die hier fast nie fehlenden Kreuzschmerzen, welche von Anhäufung des Blutes in den venösen Geflechten, so das Ende des Rückenmarks umgeben, und in der Nähe der Beckennerven gefunden werden, ganz wie bey Hämorrhoidalbeschwerden, abzuleiten sind. Ferner gehören hierher das freywillige Entstehen von rosenartigen oder auch Geschwüre (vorzüglich Paronychia) veranlaßenden, in den Jahren der sich entwickelnden Pubertät so häufig vorkommenden Entzündungen; die mannigfaltigen Verstimmungen des Gemüths, Ohnmachten, Schlafsucht u. s. w.; Zufälle, welche oft, wenn sie in höherem Grade erscheinen, das Eingreifen ärztlicher Kunst nöthig machen.

§. 120.

Die örtlichen Vorboten und Begleiter der Menstruation betreffend, so hängen sie nun insbesondre von der Reitzung der Gefäße und Nerven des Fruchthälters selbst, so wie

der ihm zunächst liegenden Organe ab, und sind namentlich merkwürdig, in wiefern wir die meisten derselben bey angehender Schwangerschaft wieder finden. Am Uterus nämlich bemerken wir zu dieser Zeit ein Aufschwellen seiner Wandungen, und insbesondre der Vaginalportion, tieferes Herabsinken desselben ins Becken, Umänderung der Querspalte des Muttermundes in eine rundliche Oeffnung. Die Empfindungen, welche diese Formänderung begleiten, sind Druck und Spannung im Becken, erhöhter Begattungstrieb, Drängen auf den Urin mit oft veränderter Qualität desselben, Turgeszenz und erhöhte Wärme in den äußern Genitalien und der Vagina, verbunden mit vermehrter Schleimabsonderung in letzterer. Zugleich nehmen die Brüste auch an dieser Erregung des Uterus Antheil, schwellen an, erregen Stechen, ja kommen wohl, namentlich bey etwas verzögertem Eintritt des Monatsflußes, zur wirklichen Milchabsonderung.

§. 121.

Das Lebensalter nun, wo unter solchen Zeichen die Regeln wirklich erscheinen, zeigt in verschiedenen Ländern und Climaten, nach verschiedener Lebensweise und Constitution, die größte Verschiedenheit. Für unser Clima dürfte als mittlere Zeit wohl ziemlich das funfzehnte Jahr als Norm gelten. Bey mehr verfeinerter luxuriöser Erziehung, zeitiger Anregung des Geschlechtstriebes, und sitzendem Stubenleben stellt sich indeß häufig auch bereits im zwölften oder dreizehnten Jahre die Menstruation ein, führt aber hier, so wie da, wo sie von sehr heißem Clima begünstigt ist, oder auch durch sehr kaltes Clima *) (wegen früher gehemmter Körperentwicklung) hervorgerufen, bereits im achten oder zehnten Jahre erscheint, frühzeitigeres Altern herbey. Der noch zeitigere Eintritt der Regeln kann nur als krankhaft angesehen, und als solcher behandelt werden.

*) Bey den Tartaren, Tonguſen und Oſtiaken, wie bey Negern und Chineſen werden die Mädchen ſehr zeitig mannbar. S. Henke üb. d. Entwicklungen d. menſchl. Organismus. S. 131.

§. 122.

Dauer und Wiederkehr der Menstruation. Nachdem die Menstruation wirklich erschienen, pflegt sie insgemein 4 bis 6 Tage anzuhalten, und zwar so, daß das Blut selbst zuerst in etwas mehr seröser Beschaffenheit erscheint, und gegen das Ende meistens*) abermals sich verdünnend, aufhört. Der Körper, welcher während dieser Zeit doch insgemein etwas angegriffen ist, und dieses durch veränderte Hautfarbe, blauliche Ringe um die Augen, verminderten Appetit, veränderten Geruch der Hautausdünstung zu erkennen giebt, fühlt sich nach Statt gehabter Menstruation erleichtert, befreit, die unangenehme Spannung ist gehoben, und ebendeßhalb der Uterus selbst zur Empfängniß jetzt mehr als vor der Menstruation geeignet. Allein nach Verlauf einiger Wochen erscheint die Anhäufung plastischer Stoffe wieder, nach und nach kehren mehrere der obengenannten Vorboten zurück, obwohl, der Regel nach, die nächsten Male in weit geringerer Heftigkeit als das Erstemal, und die Menstruation ergießt sich von neuem, und zwar der Regel nach je nach Ablauf von 4 Wochen, vom Eintritte der vorhergehenden Periode an gerechnet.

§. 123.

Diese Periodicität nun, welche einer solchen Aussonderung den Namen des Monathsflußes erworben hat, ist ihren Ursachen nach, auf verschiedene Weise erörtert worden. Wollen wir eine ganz einfache und auch wohl zureichende Ansicht hierüber fassen, so wäre es vielleicht folgende: — Jeder organisirte Körper auf Erden nämlich, muß in gewisser Hinsicht gedacht werden als Glied des Erdkörpers, als seinem Leben nach bedingt durch das Leben der Erde. Je höher indeß die Organisation steigt, um so mehr wird sich die Abhängigkeit individuellen Lebens vom irdischen Leben

*) H. Osiander sah es allerdings auch am letzten Tage noch dunkel ausfließen, doch waren die Geschlechtstheile krankhaft. S. dessen Annalen der Entbindungslehranstalt. Thl. I. S. 176.

mindern, ja selbst in einem und demselben Organismus müssen edlere Organe freier, vom irdischen Leben unabhängiger seyn als die niedern. Die Veränderungen im irdischen Leben selbst sind aber regelmäßig periodisch, ja durch ihre Regelmäßigkeit zum Grunde unserer Zeiteintheilung geworden. Diesen Perioden nun folgt unter den Organismen am sichtbarsten das Leben der Pflanze, vorzüglich ihrer Fortpflanzung nach, im Thiere aber regt sich gleichfalls das Reproduktive zumeist nach jenem vom Leben der Erde entlehnten Typus, und insonderheit gilt dieß auch hier zumal von dem Geschlechtlichen, welches schon, in wiefern es auf das Ganze, auf die Erhaltung der Gattung gerichtet, und der individuellen Reproduktion entgegengesetzt ist, mehr dem allgemeinen Leben der Erde verwandt erscheint.

§. 124.

Wie daher die Pflanze zu gewissen Zeiten blüht und Früchte trägt, so geräth das Thier zu gewissen regelmäßig wiederkehrenden Zeiten in Brunst, und erzeugt Junge. — Auch der Mensch ist diesen Einflüßen nur zum Theil entzogen, und so kehrt namentlich beym Weibe die die Erzeugung bedingende Congestion nach dem Geschlechtssystem regelmäßig, obwohl sich durch eine freiwillige Ergießung wieder hebend, zurück. — Warum indeß gerade in 4 Wochen die Rückkehr dieser Congestion und dieses Blutflußes erfolgt — bleibt noch die Frage, und, so oft das Gegentheil behauptet worden ist, glauben wir doch hier das Einwirken der durch den Mondeswechsel im Leben der Erde erzeugten Veränderungen (welche sich vorzüglich durch Wechsel der Witterung und Erscheinung von Ebbe und Fluth des Meeres aussprechen) anerkennen zu müssen, um so mehr, da der Einfluß des Mondes auf ähnliche auch im männlichen Geschlechte vorkommende Ausscheidungen, z. B. des Hämorrhoidalflußes, unläugbar ist. Einwürfe dagegen, z. B. daß der Monathsfluß nicht durchaus zu einer Zeit bey dem weiblichen Geschlecht eintrete (obwohl er allerdings bey den meisten im Neumond erfolgt), und daß er bey manchen Individuen statt vierwöchentlich, stets drei- oder sechswöchentlich wiederkehre, sind leicht zu be-

seitigen, indem man bedenkt, daß, was das erstere betrifft, die Menstruation ja nicht ihrem ersten Eintritt nach (welcher von eigener Körperentwicklung abhängt), sondern mehr ihrer Wiederkehr nach durch den Mondeswechsel bestimmt wird*). Das zweite aber betrifft offenbar Ausnahmen von der Regel, und diese werden durch die weniger naturtreue, ja so oft naturwidrige Lebensweise vieler Individuen hinlänglich erklärt. — Daß übrigens der Mondesstand auf weibliche Geschlechtsfunktion wirkt, scheinen die zum größern Theil auch von mir als bewährt erkannten Bemerkungen Osiander's**) zu bestätigen, nach welcher im Neumonde erzeugte Kinder mehr männlichen, die im Vollmonde erzeugten mehr weiblichen Geschlechts werden. — Wie aber selbst im Menschengeschlecht nicht nur Mondes- sondern auch Sonnenstand auf die Fortpflanzungsthätigkeit einwirke, beweisen die den Frühlingsmonathen, der Empfängnißzeit nach, entsprechenden, an Geburten so reichen Monathe December, Januar und Februar. — Sollte etwa vom Monde mehr die weibliche, von dem von Neuem stärker einwirkenden Sonnenlicht mehr die männliche Zeugungskraft in Anspruch genommen werden? —

§. 125.

Noch ist endlich die Qualität und Quantität des ausfließenden Blutes sowohl, als die Art und Stelle der Gefäße, welche es ergießen, etwas genauer zu erwägen. Früher hielt man nämlich dieses ausfließende Blut für unrein, für entmischt, und von der Art, daß selbst die Nähe der in der Menstruation begriffenen Personen einen nachtheiligen Einfluß auf Vegetations- und Gährungsprozesse äußern könne, allein bestimmte Beobachtungen hierüber sind so wenig anzuführen, daß wir diese Meynung als ein Vor-

*) Ich beobachtete daher, daß, bey recht gesundem Körper, wo die Menstruation während des Stillens ganz wegbleibt, dieselbe genau vier Wochen nach der ganz willkührlich beendigten Stillungsperiode, und ebendaher wohl bey anderem Mondesstande als früherhin wiederkehrte.

**) S. dessen Annalen der Entbindungslehranstalt zu Göttingen. 2. Bd.

urtheil betrachten, deſſen Entſtehung nur aus der Vorausſetzung erklärlich wird, zu Folge welcher, daß der Körper durch dieſen Blutfluß (daher Reinigung*) genannt) ſich von ſchädlichen Stoffen befreie, angenommen wurde. Im Gegentheil finden wir aber an dieſem Monathsblute, welches durch ſeine dunkle Farbe dem Venenblute, und durch ſein Nichtgerinnen**) dem Fötusblute gleicht, weder beſondern Geruch noch ſonſtige ungewöhnliche Beſchaffenheit, und wenn es zuweilen doch etwas dieſer Art zeigt, ſo iſt dieß mehr auf Rechnung des Aufenthalts deſſelben in der Vagina, der veränderten Drüſenabſonderung an den äußern Geſchlechtstheilen und Unreinlichkeit zu ſetzen. — Die Quantität des in jedem Termin abgehenden Blutes iſt ſchwer genau zu beſtimmen und auch äußerſt verſchieden, jedoch kann man ſie im Durchſchnitt wohl auf zwei bis ſechs Unzen rechnen.

§. 126.

Was die eigentliche Quelle des Monathsblutes anbelangt, ſo iſt, theils ob daſſelbe aus den Arterien oder Venen hervorkomme, theils ob es aus der Höhle des Fruchthälters oder dem Kanale des Mutterhalſes ausgeſchieden werde, zweifelhaft. Was das erſtere betrifft, ſo kann die Struktur des Uterus ſchon auf den Gedanken leiten, daß wohl nur die Venen es ſeyn möchten, welche dieſes Blut ergießen. Das ausnehmende Uebergewicht dieſer Venen über die Arterien, die beſondere Erweiterung derſelben zur Zeit der Schwangerſchaft***), das was ſich

*) Es beruhen auf dieſem Begriffe die Sitten der Neger und anderer Völker, die Weiber in dieſem Zeitraume abzuſondern und als unrein zu betrachten. S. Moreau's Naturgeſch. d. Weiber von Leune. 2. Th. S. 150.

**) Nach Lavagna (ſ. Meckels Archiv f. Phyſ. IV. 1. S. 151.) hängt dieſes Nichtgerinnen vom Mangel des Faſerſtoffs ab.

***) Merkwürdig iſt es, daß man in einigen ſeltnen Fällen die Menſtruation, welche doch gewöhnlich zur Zeit der Schwangerſchaft ceſſirt, gerade nur während derſelben fließen ſah (ſ. Stein's Annalen der Geburtshülfe. III. S. 156.), welches zu beweiſen ſcheint, daß eben die in der Schwangerſchaft ſich ſtets erweiternden Uterinvenen hier auch den Grund der Menſtruation abgeben.

über die Quellen des Blutergusses nach Abtrennung der Placenta im Wochenbett später ergeben wird, wo nämlich deutlichst die geöffneten Venenzellen, welche das Blut ergießen, nachzuweisen sind, geben dieser Meynung noch größern Halt. Nehmen wir aber ferner hinzu, wie groß die Aehnlichkeit des Menstrualflusses mit dem doch offenbar von den Venen abzuleitenden Hämorrhoidalflusse ist, die Aehnlichkeit des Menstrualblutes mit dem Venenblute (s. §. 125.), so gewinnt diese Ansicht immer mehr Gewißheit, und es kann wenig dawider beweisen, wenn die normale Art der Bluthewegung in Venen entgegengesetzt wird, da auch bey dieser, wenn die Venen sich beträchtlich erweitern, eine Ausschwitzung *) durch Seitenöffnungen Statt finden könnte, deren Daseyn überhaupt um so weniger geläugnet werden darf, je sicherer neuere (namentlich die von Prof. Meyer angestellten) Versuche die Einsaugung durch die Venen erweisen. Ob übrigens der obere Raum des Fruchthälters oder der Kanal des Mutterhalses die Menstruation ergieße, ist wohl nicht so leicht mit Gewißheit zu entscheiden, denn obgleich der Struktur nach man annehmen darf, daß wohl die Wände der Höhle hierzu am meisten geeignet seyn möchten, so bemerkte doch H. Osiander **) deutlich das Ausschwitzen von Blut aus Gefäßen des Mutterhalses (wodurch zugleich die zuweilen vorkommende Menstruation zur Zeit der Schwangerschaft erklärlich wird). Am wahrscheinlichsten ergießen es im gesunden Zustande beyde Gegenden zugleich.

§. 127.

Wie nun die Menstruation als eigenthümliches Produkt allgemeiner Körperentwicklung in dem angegebenen Zeitraume (§. 121.) erscheint, so auch verliert sie sich bey erlöschender weiblicher Eigenthümlichkeit in den allgemeinen Verhältnissen

*) Daß das Ausfließen des Monathsblutes nur ein Ausschwitzen aus kleinen Mündungen sey, beweiset der von Osiander beobachtete Fall einer Menstruation an einem prolabirten Uterus (s. Annalen d. Entbindungslehranstalt zu Göttingen. 1. Bd. S. 175.).

**) A. a. O.

der organischen Funktionen, und erscheint sonach überhaupt (was für die Behandlung der abnormen Menstruation von größter Wichtigkeit ist) als äußeres Zeichen des gemeinsamen Zustandes in der Bildungsthätigkeit des Organismus. — Das Lebensalter betreffend, wo dieses Verschwinden der Menstruation und mit ihm das Erlöschen der Zeugungsfähigkeit Statt hat, so ist dasselbe, dem verschiedenen Eintritte derselben gemäß, auch in unserm Clima mannigfachen Abänderungen unterworfen, worüber namentlich von Haller in den Elementen der Physiologie viele Beyspiele gesammelt worden sind. Als gemeingültigste Norm darf man bey uns das 45ste Jahr betrachten, obwohl auch Abweichungen vom 43sten bis 48sten Jahr häufig vorkommen, ja Beyspiele, wo Weiber noch in den funfziger Jahren concipirt haben, nicht allzuselten sind*). Uebrigens verschwindet gewöhnlich die Menstruation nicht plötzlich, sondern wird allmählig schwächer, und es empfindet der Körper bey dieser Revolution in der Regel eine Reihe ungewöhnlicher Zustände, welche den allgemeinen Vorboten der Menstruation (§. 119.) oft nicht unähnlich sind, und sich leicht erklären, wenn man bedenkt, daß bey beginnender Decrepidität anfänglich doch immer die thätigere Reproduktion fort wirke, obwohl nicht mehr mit hinreichender Kraft, um das Erscheinen ihres äußern Zeichens (d. i. der Blutergießung) zu bewirken, daß daher eine gewisse Ueberfüllung der Gefäße nicht mangeln könne, und ebendadurch Congestionen nach Kopf und Brust, Stockungen im Pfortadersystem, Hämorrhoidalcongestionen oder Ergießungen, gichtische Beschwerden u. s. w. häufig entstehen müssen. Ja als einer besonders merkwürdigen Erscheinung ist hier noch der zuweilen sogar im hohen Alter wieder erwachenden Congestion nach den Genitalien, und der wiederkehrenden Menstruation zu gedenken, Fälle, welche dem Zahnen im hohen Alter vergleichbar sind, die Aehnlichkeit, welche in so mancher Hinsicht zwischen Decrepidität und Kindheit Statt findet (§. 75.) erhöhen, allein gewöhnlich für den Organis-

*) Oeffentliche Blätter erzählten noch neuerlich den Fall, wo eine Frau in Frankreich ihr letztes Kind im 69sten Jahre gebahr.

mus eben so sehr zum Nachtheil gereichen, als das zu frühe Eintreten der Menstruation in der Kindheit.

II. Von den Regeln der Diätetik während der drei weiblichen Lebensperioden insbesondre.

§. 128.

Je vielfacher die Rücksichten sind, welche bey Bestimmung diätetischer Pflege für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und Stillende genommen werden müssen, um so weniger bleibt uns hier, wo wir das Weib außer diesen Zuständen betrachten, den oben (§. 111.) aufgestellten allgemeinen diätetischen Regeln hinzuzusetzen übrig, und es können sich diese Zusätze allein auf die Leitung weiblicher Entwicklung, der Menstrualfunktion und des Geschlechtsverhältnisses beziehen.

§. 129.

Die individuelle Entwicklung betreffend, so bedenke man vorzüglich, wie der weibliche Körper, als zärtere und doch üppigere Pflanze, rascher der Zeit seiner Blüthe entgegengeht, und wie schon aus dieser Rücksicht jede Lebensweise, welche, indem sie den Körper vielartigen Reitzungen aussetzt, das Reifen folglich noch mehr beschleunigt, verderbliche Folgen herbeyführen müsse. Ist daher irgend etwas ein großes Palladium schöner und naturgemäßer weiblicher Entfaltung, so ist es Sittenreinheit. — Hierauf zunächst sey daher die Sorgfalt der Erzieher gerichtet! Vermieden werde (und zwar, bey der Neugier junger Mädchen nach den Geheimnissen des Geschlechts, doppelt vorsichtig), was psychisch einwirkend die Phantasie befleckt, was physisch Congestionen nach den Gefäßen der Geschlechtsorgane veranlaßt, als wohin erhitzende Getränke, stark gewürzte Speisen, Schlafen in dicken Federbetten und warmen Stuben, so wie sitzende Lebensweise gehören. — Der Geschlechtsgenuß selbst vor erschienener Menstruation ist verderblich. — Ueberhaupt aber wird durch sorgsame Leitung in dieser ganzen ersten Lebensperiode das Erschließen reiner und edler Jungfräulichkeit, und aus ihr die Folge

wahrer und gesunder Weiblichkeit, bey ursprünglich kräftiger Natur, eben so gewiß sich ergeben, als die Vernachläßigung dieser Periode den Grund zu den vielfachsten Krankheiten physischer und psychischer Lebensäußerungen, ja oft ein durchaus widernatürlich gewordenes zerstörtes Leben herbeyführt *).

§. 130.

Die Zeit des Eintritts der Menstruation selbst, fordert noch bestimmtere Auswahl leichter nicht reitzender Nahrungsmittel und Getränke, Vermeidung erhitzender Bewegungen, z. B. des Tanzens, Verhütung von Erkältungen, namentlich der untern Extremitäten, des Unterleibes und der Brüste, von beengenden Kleidungen, Schnürbrüsten u. s. w. — So wie endlich bey starkgenährten Körpern, wo Congestionen, Schwindel und andere Vorboten der Menstruation fühlbarer werden, die Wahl einer beschränkten, mehr vegetabilischen Diät, verdünnender säuerlicher Getränke, und vorzüglich der Gebrauch allgemeiner lauer Bäder empfohlen zu werden verdienen. — Die ersterwähnten Vorsichten müssen dann insbesondre zur Zeit des Menstrualflußes selbst fortgesetzt, und alle Einflüße vermieden werden, welche dem Körper in einer neuen und ungewohnten Funktion irgend störend werden können. — Fragt man übrigens, welcher Zeitraum nach somit erreichter Pubertät der Geschlechtsverbindung und dem neu sich eröffnenden Cyclus von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett am angemessensten sey, so darf man wohl annehmen, daß der Wille der Natur sie nicht eher fordre, bis der Körper auf das Vollkommenste der Menstrualfunction, als wodurch das Geschlechtssystem auf nachfolgende höhere Thätigkeit vorbereitet wird, gewohnt worden ist; und die Erfahrung bestätigt es vollkommen, daß jene die gesündesten Frauen werden, welche zwei bis drei Jahre nach Eintritt der Pubertät sich verheirathen, und daß hingegen eine zu schnell nach jener Periode vollzogene Verbindung oft der Gesundheit

*) Man lese hierüber den interessanten Aufsatz von Schlegel über die physische Erziehung des Menschen in Stark's neuem Archiv. I. Bd. S. 516.

eben so nachtheilig werde, als eine zu lang verschobene oder widernatürlich gänzlich verschmähte oder versagte.

§. 131.

Viel endlich liegt für die Gesundheit der Frau in der Wahl des Gatten selbst. Die Natur fordert eine gewisse Gleichartigkeit (d. i. eine gleiche Entwicklung der Geschlechtsindividualität) unter zwei sich verbindenden Gatten, und bedeutende Ungleichheit unter beyden kann selbst durch Mißverhältniß der geschlechtlichen Organisation den Zweck der Verbindung ganz unerreicht lassen *), weßhalb denn auch eine Berathung ärztlicher Personen bey Schließung ehelicher Verbindung wenigstens als wünschenswerth anempfohlen werden muß. — In dieser Vereinigung selbst wird früher erhaltene Sittenreinheit am sichersten die Mysterien des Geschlechts gegen Entweihung schützen; denn obschon der häufigere Geschlechtsgenuß dem weiblichen Körper im Allgemeinen wohl minder als dem männlichen nachtheilig ist, so entwürdigt er doch im Uebermaaß den Zweck der Verbindung eben so sehr, als er physisch selbst dem Vermögen zu empfangen nachtheilig und der Entstehung organischer Krankheiten der Geburtstheile günstig ist. — Zur Zeit der Menstruation **) sowohl als in der Zeit des Wochenbettes ist der Geschlechtsgenuß widernatürlich und folglich schädlich, zur Zeit der Schwangerschaft und Stillung wenigstens nicht naturgemäß.

§. 132.

Was die Zeit des aufhörenden Monathsflußes, die sogenannten klimakterischen Jahre betrifft, so müssen hier ähnliche Vorsichtsmaaßregeln als bey der Evolution der Menstruation (§. 130.) beobachtet, heftig reitzende Speisen und Getränke vermieden, namentlich aber häufige Aufregungen der Nerven der Geschlechtsorgane verhütet werden, damit

*) S. einige Beyspiele dieser Art in Stark's neuem Archiv für Geburtshülfe. Bd. I. S. 376 u. 387.

**) Bekannt ist, daß man in den Ausschweifungen zwischen Europäern und Indianerinnen zur Zeit der Menstruation selbst die Quelle der Syphilis finden wollte.

dieſe ſo bedeutende Revolution weder unmittelbar Krankheiten anlaſſe (wohin namentlich Blutflüße, Schleimflüße, Indurationen u. ſ. w. gehören), noch für die ſpätern Lebensjahre eine ſchwankende Geſundheit nach ſich ziehe.

Zweiter pathologiſch therapeutiſcher Abſchnitt.

Erſte Abtheilung.

Von den Krankheiten in der erſten Lebensperiode des weiblichen Körpers.

§. 133.

Es iſt ſchon in der allgemeinen Pathologie des weiblichen Körpers bemerkt worden, warum gerade in dieſer erſten Lebensperiode nur wenige dieſem Geſchlecht eigenthümliche Krankheitszuſtände vorkommen können (ſ. §. 81.), und indem wir nun zu einer nähern Betrachtung derſelben uns wenden, finden wir hier allein theils mehrere praktiſch wichtige urſprüngliche Mißbildungen der weiblichen Genitalien *) aufzuführen, theils die vorſchnelle Entwicklung des Geſchlechtscharakters zu berückſichtigen.

I. Von den angeborenen Fehlern weiblicher Genitalien.

1. Von krankhaften Bildungen der äußern Geſchlechtstheile.

§. 134.

Die Brüſte, Organe, welche übrigens bey lebensfähigen weiblichen Individuen nie ganz fehlten, bieten ihrer

*) Vorzüglich diejenigen, wodurch die eigentlich weiblichen Funktionen mehr oder minder geſtört werden, welche zuweilen auch ärztliche Hülfe zulaſſen, werden wir hierher ziehen, von den zwitterhaften Bildungen wird noch bey den Kinderkrankheiten die Rede ſeyn.

Zahl, Form, und namentlich der Bildung ihrer Warzen nach, eine Menge theils weniger, theils mehr einflußreicher Abnormitäten dar. Man fand*) drei, vier, ja fünf Brüste an einem Körper, zwei Warzen an einer Brust, die überzähligen Brüste saßen zuweilen am Rücken, oder unter den Armen, die Form der Brust fand man zuweilen zitzenartig, die Brustwarzen mangelten mitunter gänzlich oder sie entwickelten sich wohl auch nach der Geburt nicht vollkommen. — Untersucht man nämlich die Bildung der Brustwarzen beym neugeborenen Kinde, so findet man sie platt und quergespalten, gleichsam einwärtsgestülpt (auf welche Form sowohl als auf den sich darin vorfindenden Milchsaft man die Meynung, daß sie wohl Einsaugungsorgane des Fötus seyn könnten, gegründet hat). Nach und nach sollen nun die Warzen während der ersten Lebensperiode sich hervorheben und ausbilden, allein theils durch fest anliegende Kleider gehindert, theils in Folge unzulänglicher Bildungskraft verharren sie zuweilen in diesem frühern Zustand und werden dadurch dem Stillungsgeschäft später äußerst hinderlich. Von allen hier erwähnten Abnormitäten wäre denn nur die letztere einer ärztlichen Abhülfe fähig, und es wird daher theils prophylaktisch überhaupt auf die Vermeidung eines nachtheiligen Druckes der Brüste in den Kinderjahren zu sehen seyn, theils, wo eine solche unvollkommene Entwicklung in den der Pubertät bereits sich nähernden Jahren bemerkt würde, dieselbe durch Tragen eines angemessenen Warzendeckels (von denen wir späterhin die zweckmäßigsten Formen betrachten werden) unterstützt werden müssen.

§. 135.

Die Schamlefzen betreffend, so bieten diese ziemlich häufige, jedoch größtentheils völlig unschädliche Abnormitäten oder vielmehr Varietäten dar. So fehlen z. B. die Nymphen zuweilen bey neugeborenen Mädchen, zumal in asiatischen Ländern, wo das Beschneiden dieser hier gewöhnlich

*) S. Otto Handbuch d. patholog. Anatomie. S. 238.

sehr großen Theile Sitte ist *), gleichso wie auch an männlichen Kindern bey beschnittenen Völkern, der Mangel der Vorhaut zuweilen angeboren erscheint. Hinwiederum findet sich zuweilen der Umfang der Schamlippen besonders groß, namentlich sind die kleinern häufig verlängert und umgaben in einem von Haller erwähnten Falle sogar den After. — Nur Fälle der letztern Art wären es auch hier, welche durch ärztliche Kunst beseitigt werden könnten, indem mittelst einer leichten chirurgischen Operation die überflüßigen, mancherley Unbequemlichkeiten veranlassenden Theile entfernt würden.

§. 136.

Die Klitoris ferner zeigt mehrere ähnliche Abnormitäten, ist bald zu groß **), bald zu klein, selten (welches als eine Annäherung an verschiedene Thierbildungen, z. B. der Beutelthiere betrachtet werden darf) in zwei Spitzen auslaufend. Abhülfe wird wieder nur bey zu beträchtlicher Entwicklung durch Abbindung oder Beschneidung Statt finden, und auch dieser Theil wird daher in mehreren südlichen Ländern, wo er insgemein größer als in nördlichen wird, einer gewöhnlich im zehnten Jahre unternommenen Beschneidung unterworfen.

§. 137.

Das Hymen. So wie es in einigen Fällen gänzlich mangelte oder eine ungewöhnliche, bald völlig ringförmige Gestalt, verdickte Substanz, oder mehr nach vorwärts gerichtete Lage zeigte, so verschloß es auch zuweilen die Scheidenmündung vollkommen (Atresia hymenaica) und hinderte dadurch späterhin den Ausfluß des monathlichen Blutes sowohl als die Conception. Im letztern Falle wird die Ein-

*) S. darüber Osianders Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe. II. Bd. S. 66.

**) Daß dieser Theil sehr selten beträchtlich vergrößert ist, und die meisten Fälle, wo man eine solche Vergrößerung beobachtet haben wollte, wohl verunstalteten männlichen Individuen angehörten, ist neuerlich von H. Osiander (Handbuch d. Entbindungsk. 1r Thl. S. 145.) mit Recht bemerkt worden.

schneidung der vorgespannten Membran, und das Einlegen eines in Essig getauchten Bäuschchens, um neue Verwachsung zu verhüten, unerläßlich, ja selbst bey beträchtlicher Verdickung sah man sich zuweilen, obwohl erst im vorgerückten Alter, um Conception, ja um die Geburt möglich zu machen, zu einer ähnlichen Operation genöthigt *). —

2. Von krankhaften Bildungen der innern Geschlechtstheile.

§. 138.

Die Mutterscheide, als Fortsatz des Fruchthälters, nimmt gewöhnlich an den Abnormitäten des letztern sehr bestimmt Antheil. Bey unvollkommener Entwicklung des Geschlechtssystems überhaupt findet sich daher auch die Mutterscheide ausnehmend klein und eng, ohne sich in den spätern Jahren dieser Lebensperiode normal zu entfalten, welches zum Grund bleibender Unfruchtbarkeit wird; oder sie ist ferner der Länge nach, zuweilen auch nur am Eingange (und zwar beydes mitunter bey doppeltem Uterus) durch eine Scheidewand in zwei Gänge getheilt, Verwachsungen, welche übrigens dieselbe Kur wie die Atresie zulassen. Auch findet sich in seltnen Fällen ein freylich unheilbares Zusammenmünden des Scheidenkanals und Mastdarms (bey der sogenannten Kloakenbildung **).

§. 139.

Die Gebärmutter sah man in mehreren Fällen, selbst bey vorhandenen äußern Genitalien gänzlich mangeln, oder in den frühern Lebensjahren sich so wenig entwickeln, daß in den Jahren herannahender Pubertät sie noch in derselben Größe wie beym neugeborenen Kinde gefunden wurde; Miß-

*) Wie H. Osiander in d. Denkwürdigkeiten II. Bd. S. 70. nach Vesal erwähnt, ist es auch bey europäischen Müttern früher gebräuchlich gewesen, das Hymen immer absichtlich als einen unnützen Theil zu zerstören (hierher gehört auch der Phallusdienst der Alten).

**) S. darüber J. F. Meckel's Handbuch der patholog. Anatomie. I. Bd. S. 693.

bildungen, welche nothwendig Unfruchtbarkeit zur Folge haben, und unheilbar seyn müssen. Ferner findet man nicht selten den der Größe nach normal entwickelten Uterus, der Gestalt nach ganz auf dieselbe Weise gebildet, wie er sonst nur in frühern Perioden des Fötuslebens oder in niedern Thieren getroffen wird (§. 27. u. 28.). Man findet daher sowohl die Höhle von oben herab durch eine Scheidewand getheilt (Uterus divisus) *) als den Uterus nach beyden Fallopischen Röhren hin gehörnt (Uterus bicornis) **) oder denselben, zuweilen zugleich mit dem Scheidenkanale vollkommen doppelt (Uterus duplex) ***), Mißbildungen, welche übrigens Empfängniß, Schwangerschaft und Geburt zwar keineswegs unmöglich machen, wie mehrere Fälle beweisen, allein doch den regelmäßigen Verlauf dieser Perioden mehr oder weniger stören, ja sogar in der Mehrzahl ähnlicher Fälle †) den Tod der Schwängern, Gebärenden oder Wöchnerinnen herbeyführten. — Außerdem bemerkte man zuweilen, als nicht minder unheilbare Mißbildung, Einmünden der Gebärmutter in den Mastdarm. Endlich kommen wohl auch fleischige Verwachsung ††) oder häutige Verschließungen des Muttermundes vor, welche gleichwie die Atresia hymenaica das Ausfließen der Menstruation und die Conception hindern, und dann bey bloß häutiger Verschließung durch Einführen und Durchstoßen einer geknöpften Sonde gehoben werden können.

---

*) S. davon ein Beyspiel in Eisenmann Tab. quat. uteri duplicis. 1752. Fol. Tab. I. Fig. 2.

**) S. Walter Betrachtungen über d. Geburtstheile d. weibl. Geschl. Fig. III.

***) S. Böhmer observation. anat. Fasc. II. T. VI. u. Eisenmann l. c. Tab. II.

†) S. Meckel a. a. O. S. 683.

††) Von der letztern Verbildung findet sich ein merkwürdiges Präparat in der Sammlung unserer Akademie, wo über die Ursprünglichkeit der Verwachsung die Totalform des Uterus keinen Zweifel gestattet, demohnerachtet aber Conception Statt gefunden hat, die Frucht jedoch in der Bauchhöhle sich entwickelte, späterhin abstarb und als Lithopaedion nach dem erst im hohen Alter erfolgten Tode dort gefunden wurde.

§. 140.

Die Muttertrompeten mangeln nur bey gänzlich fehlendem Uterus durchaus, häufiger fehlen ihnen die Franzen am Abdominalende. Zuweilen sah man auch nur eine derselben fehlen, oder beide am Abdominalende sich vereinigen. Auch entspringen sie zuweilen auf ungewöhnliche Weise, z. B. eine aus dem Cervix uteri. — Auch diese natürlich nur bey der Section zu entdeckenden Abnormitäten können Unfruchtbarkeit veranlassen.

§. 141.

Die Eyerstöcke endlich fehlen ebenfalls entweder gänzlich, selbst bey vorhandenem Uterus, oder es betrifft dieser Mangel nur die eine Seite. Mitunter entwickeln sie sich denn auch sehr unvollkommen, bleiben klein, und veranlassen dann, eben so wie durch ihren gänzlichen Mangel, Unfruchtbarkeit.

II. Von der krankhaft zu zeitig entwickelten Pubertät.

§. 142.

So wie mehrere der bisher betrachteten Bildungsfehler des Uterus als unvollkommene Entwicklungen des Geschlechtssystems anzusehen waren, so finden wir dagegen in andern Fällen auch eine zu dem übrigen System in Mißverhältniß stehende beschleunigte und oft dem gesammten Organismus verderblich werdende Ausbildung desselben. Eigentlich charakteristisch ist diesem Zustande die früher als gewöhnlich eintretende Menstruation, welche sich indeß häufig mit gleichzeitig bemerkbarer Entwicklung der Geschlechtsorgane, mit Anschwellung der Brüste, Vergrößerung der Schamlefzen und Mutterscheide, so wie mit Entwicklung von Haar auf dem Schamberge verknüpft, ja wobey der Uterus selbst weit früher als gewöhnlich conceptionsfähig wird *). In wiefern nun aber die Ent-

*) S. ein Beyspiel dieser Art von einer erst im Alter verstorbenen, jedoch schon im zweiten Jahre menstruirten und als achtjähriges

wicklung des Geschlechtssystems und Erscheinung der Menstruation, wie früher gezeigt wurde, nur Produkt und Blüthe allgemeiner Organisation seyn soll, so liegt am Tage, wie eine solche theilweise Entwicklung nothwendig entweder hemmend in die allgemeine Entwicklung eingreifen, oder selbst zerstörend auf den Körper wirken könne.

§. 143.

Das Lebensalter betreffend, in welchem die Erscheinung einer krankhaft beschleunigten Menstruation, und der ihr entsprechenden Ausbildung der Geschlechtstheile beobachtet wurde, ist sehr verschieden. Mitunter, obwohl selten, trat schon im ersten oder zweiten Lebensjahre*) ein regelmäßig wiederkehrender Blutfluß aus den Geburtstheilen ein, und wenig später erschien dann die Entwicklung der Brüste und Schamhaare. Häufig sind die Fälle in den nächstfolgenden Jahren. So sah v. Siebold**) dieselbe im sechsten, Andere sahen sie im siebenten, achten oder neunten Jahre erscheinen.

§. 144.

Die Ursachen einer solchen zu frühen Geschlechtsentwicklung können entweder in ursprünglicher Bildungsrichtung, oder in krankhaften Zuständen anderer Systeme und Organe, oder in der Lebensweise begründet seyn. Was das erstere betrifft, so erscheint hier der Organismus überhaupt auf einer niedrigern Stufe, ohngefähr vergleichbar den vielen Thiergattungen, bey denen auch die Fortpflanzungsthätigkeit weit zeitiger als im Menschen sich entwickelt, dieser Zustand ist dann mehr in der Anlage des Ganzen begründet, er wird eben deßhalb weniger leicht dem Ganzen verderblich, und man kennt Beyspiele, wo unter diesen Umständen Personen,

---

Mädchen gemißbrauchten und geschwängerten Person, im Archiv Schweizerischer Aerzte. 1r Bd. 2s Hft.

*) So in dem oben erwähnten und in dem von Lobstein beschriebenen Falle s. Lucina von Siebold. I. Bd. 1s St. S. 102. u. IV. Bd. 1s St. S. 163.

**) Lehrbuch der Frauenzimmerkrankheiten. Thl. I. S. 171.

wenn auch nicht völlig die gewöhnliche Körpergröße, doch ein beträchtliches Alter erreichten (eben so wie manche Thiere auch nach der entwickelten Geschlechtsfunktion immer fortwachsen, z. B. die Fische). Die Erkenntniß dieser Ursache ergiebt sich theils aus der Abwesenheit der andern, z. B. der fehlerhaften Lebensweise, theils aus den weit geringern oder ganz fehlenden sonstigen Krankheitssymptomen. — Die zweite Ursache anbelangend, welche wir in andern die zu zeitige Pubertätsentwicklung als secundären Zustand herbeyführenden Krankheiten vorfanden, so gehören unter dieselbe ganz vorzüglich die Scrofelkrankheit und die in Folge von Entzündung u. s. w. entstandenen Verbildungen der Unterleibsorgane, als bey welchen in Folge von Störung der Blutbewegung im Pfortadersystem Congestionen nach den Hämorrhoidal- oder Uteringefäßen so häufig bemerkt werden. — Die Erkenntniß dieser Ursache geht hervor aus den Zeichen jener Krankheiten. Kinder mit aufgetriebenem Leibe, äußerlich angeschwollenen Drüsen, bleicher Farbe, gedanfenem Gesicht, mit Neigung zu Verstopfung, unnatürlichem Appetit, mit Würmern behaftet (deren Reitz auf den Darmkanal oft consensuell zu Erregung des Geschlechtssystems viel beytragen kann) sind es vorzüglich, bey denen die unzeitige Pubertätsentwicklung als secundäre Krankheit vorkommt. Als dritte Ursache endlich führten wir die Lebensweise auf, und es sind vorzüglich physisch ein zu häufiger Genuß erhitzender, stark gewürzter oder geistiger Speisen und Getränke bey sitzendem Stubenleben, Schlafen in zu warmen Betten, so wie Reitzungen der Geschlechtsorgane durch Onanie, psychisch ein schlüpfriger Umgang und zeitige Romanenlektüre. Begünstigt wird übrigens die Einwirkung dieser Ursachen durch eine reitzbare schwächliche Constitution, und erkannt wird dieselbe theils durch die Abwesenheit der unter den vorher erörterten Ursachen aufgeführten Zeichen, theils durch Untersuchung der äußern Lebensverhältnisse selbst, bey Berücksichtigung der dispontirenden Constitution. Zu bemerken ist indeß, daß sehr wohl mehrere der bisher erwähnten Ursachen zugleich einwirken können und wirklich einwirken, z. B. scrofulöse Constitution und zeitige geschlechtliche Ausschweifungen.

§. 145.

Verlauf und Prognose ist bey diesen Krankheitszuständen eben nach den verschiedenen ursächlichen Verhältnissen verschieden. Bey einer in Folge ursprünglicher Bildungsrichtung früher erscheinenden Menstruation, kann unter günstigen Umständen, wie schon erwähnt, die Gesundheit wohl eben so ungestört bleiben, als bey Nationen, denen diese frühe Pubertätsentwicklung natürlich ist; öfterer indeß wird wenigstens Hemmung des völligen Wachsthums, und schwächliche Gesundheit die Folge desselben seyn, wobey denn die Prognose um so günstiger gestellt werden darf, je weniger zeitig die Menstruation erscheint, je schwächer dieselbe sich zeigt, je kräftiger die ursprüngliche Körperconstitution ist, und je mehr die äußern Lebensverhältnisse allgemeine körperliche Gesundheit begünstigen. Weit nachtheiliger hingegen muß ein Blutfluß dieser Art werden, durch die zweite der erwähnten Ursachen erregt, theils weil schon jene Unterleibskrankheiten Gefahr drohen, theils weil ein oft wiederholter Blutfluß, für dessen Erscheinung die allgemeine Körperbildung nicht sattsame Nöthigung enthält, die individuelle Reproduktion vollends untergraben muß. Wirklich sah man denn auch in Fällen dieser Art die Kinder mit jeder wiederkehrenden Periode mehr abzehren und ermatten, ja endlich sterben; und es wird die Prognose hierbey theils zwar wieder nach den oben erwähnten Momenten, theils aber insbesondre nach dem Grade der Heftigkeit oder Heilbarkeit der primären Krankheit sich richten. Am allerzerstörendsten jedoch wirkt namentlich die dritte Ursache, indem hier recht eigentlich die Geschlechtsfunktion, als die individueller Reproduktion entgegengesetzte, gewaltsam hervorgerufen wird, welches, verbunden mit einer oft schon an sich schwächlichen und reitzbaren Constitution, den Körper in kurzer Zeit völlig zerrüttet, so daß hierbey, nur wo das Lebensalter etwas weiter vorgerückt war, wo die Constitution ursprünglich besser ist, und die genaueste Anordnung der Lebensweise vom Arzte vorgeschrieben und durchgesetzt werden kann, auch der Krankheitszustand selbst noch nicht allzulange angehalten hat, günstigere Hoffnungen gefaßt werden dürfen.

§. 146.

Ein Heilverfahren kann bey zu früher Menstruation nur wo sie in Folge anderer Krankheitszustände oder durch fehlerhafte Lebensweise bedingt ist, Statt finden, indem, wo sie als Folge ursprünglich veränderter Bildungsrichtung erscheint, sich höchstens durch Auswahl leicht verdaulicher nahrhafter Diät, durch Landluft, Bäder und nöthigenfalls durch den Apparat stärkender Arzneymittel, die allgemeine Reproduktion unterstützen, aber die eigentliche abnorm zeitig eintretende Pubertätsentwicklung durch keine Art angewendeter Mittel sich hemmen, oder die Organisation sich gänzlich zurückbilden läßt.

§. 147.

Die Anordnung des Heilplans übrigens für die beyden andern Fälle ergiebt sich schon beynahe von selbst. Zuerst die scrofulösen Leiden, die mannigfaltigen Obstruktionen u. s. w. angehend, so können und müssen sie vorzüglich durch angeregte erhöhte Thätigkeit des Darmkanals gehoben werden. Der längere Zeit fortgesetzte Gebrauch gelind abführender Mittel, namentlich der Mittelsalze, des Rheum, des Tamarinden-Aufgußes, der seifenhaften Extracte, die Seife selbst in Pillenform, auch wohl mit Antimonialpräparaten verbunden, wirkt hier ausgezeichnet, indem diese Methode bey vermehrter Secretion der innern Darmwände, sehr viel zur Zertheilung angeschwollener Drüsen, und Herstellung regelmäßiger Säftebewegung in den Unterleibsgefäßen beytragen wird, ja, wenn sie durch Einreibungen des flüchtigen Linements in den Unterleib, sorgfältige Hautkultur, Gebrauch von Seifen- oder auch wohl von salinischen Bädern, durch freie Luft, hinlängliche Bewegung, und eine geregelte leicht verdauliche Diät unterstützt wird, vorzüglich geeignet ist, die völlige Gesundheit wieder herzustellen, und so auch das Symptom jenes Krankheitszustandes, die zu früh erschienene Menstruation zu beseitigen; eben so wie wir auf ähnliche Behandlung andere, in Leiden einzelner Unterleibsorgane begründete Blutergießungen der Unterleibsgefäße (z. B. Hämorrhoidalflüße, Blutbrechen, Morbus niger) verschwinden sehen. Complicationen mit Wurm-

beschwerden machen übrigens Anwendung anthelmintischer Mittel nöthig, und überhaupt können die besondern Modifikationen dieses Kurplans nur von der Individualität der Kranken bestimmt werden.

§. 148.

Besondere Bemerkung verdient es daher in diesen Fällen, daß man nicht etwa das Eintreten des Menstrualflußes selbst, d. i. hier das Symptom allgemeiner Krankheit zu hoch stelle, und in Absicht der durch die Blutung erzeugten Schwäche durch sogenannte stärkende Mittel entgegen zu arbeiten, den Zustand noch mehr verschlimmere; gewiß es könnte nicht leicht thörichter verfahren werden, als in solchen und ähnlichen Fällen den Blutfluß unmittelbar, etwa durch kalte Umschläge und Bäder, stärkere Dosen für den Uterus kontrahirend wirkender Mittel, z. B. der Zimmttinktur u. s. w. plötzlich hemmen, und so dem Organismus diese oft für den Augenblick als Krisis nothwendige Ausleerung entziehen zu wollen! — Und was sollen in ähnlicher krankhafter Spannung der Unterleibsorgane die eigentlich tonischen Mittel ausrichten? Müssen sie nicht durch ihre stimulirende Wirkung die Anschwellungen der Lymphgefäße u. s. w. vermehren? Man gebe z. B. einem scrofuldsen Kinde eine Zeit lang bloße China, und man wird nicht nur keine Besserung, man wird wie bey einem vorschnell unterdrückten Wechselfieber Auftreibungen der Leber, der Milz, des Pankreas u. s. w. entstehen sehen. — Nur für die Zustände daher, wo, nachdem durch die im vorigen Paragraph erwähnte Methode jene Krankheiten des Lymph- und Pfortadersystems beseitigt sind, der Unterleib frey und weich, die Zunge rein, die Ausleerungen natürlich geworden sind, und demohnerachtet Schwäche und unvollkommene Verdauung andauern, passen die leichtern bittern Extracte, und späterhin selbst die Abkochungen der China, verbunden mit dem Gebrauch mineralischer, namentlich eisenhaltiger Bäder, und der sparsame Genuß eines guten weißen Weins.

§. 149.

Der Blutfluß selbst fordert hier sonach eigentlich nur während der Periode seiner Erscheinung besondere Rücksicht; eines Theils nämlich wird es nothwendig, hier die Mittel, welche denselben irgend verstärken, oder auch gänzlich und plötzlich hemmen könnten, z. B. die Abführmittel, Bäder, Friktionen u. s. w. auszusetzen, andern Theils ist aber auch dafür Sorge zu tragen, ihn in möglichst geringem Grade zu erhalten, weßhalb man in dieser Periode besondere Ruhe beobachten läßt, und die einfachste Diät, so wie den Gebrauch kühlender Getränke anordnet. Sehr selten wird man übrigens hier die Blutergießung selbst zu copiös und in sofern augenblicklich gefahrdrohend finden, indeß würden wir für einen solchen Fall vorzüglich den Gebrauch aromatischer Fomentationen (aus Hb. Serpilli, Absinthii, Melissae mit Wein vermischt) auf den Unterleib, Auftröpfeln von Naphtha auf die regio hypogastria, und innerlich die Phosphorsäure zu 8 bis 15 Tropfen in schleimigem Getränk empfehlen.

§. 150.

Was nun ferner die Behandlung unzeitiger Pubertätsentwicklung in Folge gewaltsamer, mehr vom Nervensystem ausgehender Erregung betrifft, so muß nothwendig für die Anordnung strengerer Aufsicht, Verhütung unpaßender Lectüre, schlechten Umganges, der Masturbation, Versagung aller erhitzender Getränke, des Weins, der Chocolade, des Kaffees und grünen Thees, so wie stark gewürzter Speisen, erstes Augenmerk des Arztes seyn; allein nicht minder wichtig bleibt es dann ferner, theils die gesteigerte allgemeine und örtliche Sensibilität herab zu stimmen, theils die gesunkene Reproduktion zu heben. — Was das erstere betrifft, so können dazu außer der schon erwähnten Entziehung schädlicher Reitze, der häufige Gebrauch lauer Bäder mit Chamillen, Valeriana und ähnlichen Aufgüßen vermischt, ferner vorzüglich der (außer der Periode der Menstruation) täglich mehrere Male veranstalteten kalten Waschungen der Geburtstheile, innerlich aber die Anordnung kühlender Emulsionen und ähnlicher

Getränke, ja bey einzelnen heftigern Aufregungen die Anwendung des Dowerschen Pulvers, kleiner Dosen des Extr. Hyoscyami, des Liq. Cornu Cervi, als nützlich empfohlen werden. Was hingegen das Fördern der Reproduktion anbelangt, so ist in dieser Hinsicht zuerst auf den Stand der Verdauungswerkzeuge, von welchen ja alle individuelle Reproduktion ausgeht, Rücksicht zu nehmen. Gastrische Unreinigkeiten sind daher zuvörderst zu beseitigen, und es ist nicht etwa anzunehmen, daß allgemeine Schwäche dadurch vermehrt würde, wenn dieß auf zweckmäßige Art geschieht. Steht aber in dieser Hinsicht der Assimilation nichts mehr im Wege, so ist vorzüglich durch zweckmäßige Diät aus Bouillon, Gries, Sago, leichten Fleischarten, und eben so durch die Anwendung rein bitterer Mittel des Extr. Taraxaci, Centaur. m., Trifolii, Gentianae, und der China, so wie späterhin selbst des Eisens (anfänglich als Tr. martis cydoniata, Tr. tonico-nervina u. s. w., späterhin aber in Substanz), verbunden mit dem Gebrauch eisenhaltiger Bäder, der Landluft, hinlänglicher Körperbewegung und Gemüthsaufheiterung, sowohl der körperlichen allgemeinen Ermattung entgegenzuarbeiten, als auch der dem Körper unangemessene Blutfluß (während dessen Erscheinen selbst übrigens wieder die §. 149. gegebenen Regeln beobachtet werden müssen) und ein etwa diesem Blutfluß nachfolgender Schleimausfluß aus den Geburtstheilen zu beseitigen.

Zweite Abtheilung.

Von den Krankheiten in der Periode der Geschlechtsreife.

§. 151.

Mit dem vollen Hervortreten des weiblichen Geschlechtscharakters ist auch die Möglichkeit sehr verschiedenartiger, überhaupt aber der meisten besondern, diesem Geschlecht eigenthümlichen Krankheitserscheinungen gegeben. — Wir theilen die hierher gehörigen abnormen Zustände in solche, welche sich in Störungen der allgemeinen weiblichen Eigenthümlich-

keit aussprechen, und als Unregelmäßigkeiten der Menstruation, Bleichsucht, Hysterie, Nymphomanie, Unfruchtbarkeit erscheinen, und in andere, welche in den Geschlechtsorganen selbst ihren Sitz haben, und als Krankheiten des Fruchthälters, der Mutterscheide, der Eyerstöcke und Muttertrompeten, so wie der Brüste sich darstellen.

I. Allgemeine Krankheitszustände.

1. Unregelmäßigkeiten der Menstrualfunktion.

§. 152.

Bevor wir zu diesen einzelnen Unregelmäßigkeiten und ihrer Behandlung uns wenden, scheint die gewöhnliche Art ihrer Eintheilung noch einige nähere Erörterung zu verlangen. Man pflegt nämlich hier das äußerliche Zeichen des allgemeinen krankhaften Zustandes, d. i. den Blutfluß selbst, seiner Periodicität, Quantität und Qualität nach, ziemlich allgemein zum Maaßstabe zu nehmen, um darnach zu starke und zu schwache, zu häufige und zu seltene oder verzögerte Menstruation als besondere Krankheiten zu unterscheiden, nicht bedenkend, daß man hier fast um nichts besser verfährt, als wenn man Fieber nach den dabey erscheinenden stärkern oder schwächern Schweiß- Harn- oder Stuhlausleerungen eintheilen wollte. Es geht aber aus solcher Eintheilung offenbar der Nachtheil für die Behandlung dieser Zustände hervor, daß dieselbe leicht ebenfalls ganz symptomatisch eingeleitet wird, daß man leicht glaubt, es sey hinlänglich, bey zu schwacher oder verzögerter Menstruation den Blutfluß auf irgend eine Weise zu erregen oder zu verstärken, oder im entgegengesetzten Falle ihn zu hemmen, welches denn, sobald es wirklich ausgeführt wird, oft zum größten Nachtheil der Kranken gereichen muß. Wir halten es demnach hierbey für das Wichtigste die Gesammtrichtung des Organismus auf die geschlechtliche Thätigkeit zum Maaß für Beurtheilung und Eintheilung dieser Zustände zu nehmen, und unterscheiden daher 1) (im Gegensatz der zu zeitigen Menstruation) mangelnde oder verzögerte Entwicklung, 2) unvoll-

kommenen Zustand der Pubertät und Menstrualfunktion (welches beydes hervorgehen kann theils aus mangelhafter Reproduktion im Allgemeinen und andern Krankheiten, theils aus mangelhafter Bildung und Erregung des Geschlechtssystems insbesondere; 3) (im Gegensatz zu den beiden vorigen und verwandt der zu zeitigen Pubertätsentwicklung) übermäßiges Hervortreten der Menstrualfunktion (theils durch zu reichliche allgemeine Stoffbildung, theils durch andere Krankheiten, theils durch zu großes Ueberwiegen des Geschlechtssystems begründet); 4) plötzliche Hemmungen der Menstrualfunktion.

A. Mangelnde oder verzögerte Entwicklung der Menstrualfunktion.

§. 153.

Wie oben (§. 121.) bemerkt wurde, ist der Eintritt der Pubertät an kein bestimmtes Lebensalter festgebunden, sondern nach Clima, Nationalität, Lebensweise und Constitution verschieden, und es kann folglich die Verzögerung dieses Eintritts, dafern sie krankhaft genannt werden soll, nicht an den Jahren abgemessen, sondern nach dem Grade allgemeiner Körperausbildung bestimmt werden. Erscheint nämlich das gemeinsame Wachsthum ziemlich beendigt, kündigt sich das Bestreben der Natur zur Ausscheidung des im Körper überflüßig erzeugten Bildungsstoffes durch das Geschlechtssystem, inmittelst mehrerer der oben (§. 119.) erwähnten Vorboten an, erscheint aber der Blutfluß demohnerachtet nicht, stellen sich vielmehr Störungen allgemeinen Wohlbefindens ein, so haben wir den Zustand, welcher als verzögerte Entwicklung der Menstrualfunktion bezeichnet wird. Gänzlichen Mangel dieser Funktion finden wir entweder als Idiosyncrasie bey Personen, deren Pubertät allerdings sich entwickelt, obwohl durch eine sonderbare Naturverirrung ohne ihr äußerliches Zeichen (die Menstruation), wohin denn die Fälle gehören, wo zeugungsfähige Frauen entweder gar nicht oder höchstens nur während der Schwangerschaft menstruirten, oder zweitens bey Personen mit ganz unausgebil-

deten oder verbildeten Geschlechtstheilen, wo sonach eine wahre Pubertät eben so wenig als das Zeichen derselben eintreten kann, aber auch, eben weil hier ein ursprünglicher Bildungsfehler ist, und alles sich mehr aus dem Ganzen, aus einem Grunde ergiebt, Störungen der Harmonie körperlicher Thätigkeiten, d. i. der Gesundheit, eben so wenig bemerkt zu werden pflegen, als bey der in Folge ursprünglicher Bildungsrichtung zu früh hervortretenden Pubertät (§. 144.).

§. 154.

Was die blos verzögerte Entwicklung der Menstrualfunktion betrifft, so sind die Zeichen, welche sie begleiten, theils nach den Ursachen der Verzögerung, theils nach der Constitution der Kranken äußerst verschieden, und wir wenden uns deßhalb sogleich zu den Ursachen, um an deren Betrachtung die Lehre von den äußern Zeichen zu reihen. Das wirkliche Erscheinen der Menstruation kann aber verhindert werden 1) durch organische Ursachen, z. B. Atresie der Scheide oder des Muttermundes (§. 137. 138. 139.). In diesen Fällen treten zur gewöhnlichen, der übrigen körperlichen Entwicklung entsprechenden Zeit, die allgemeinen und örtlichen Vorboten der Menstruation ein, ja die Ausscheidung erfolgt späterhin wirklich, allein das Blut wird in der Höhle der Vagina und Gebärmutter zurückgehalten, dehnt diese aus, und häuft sich, indem unter periodisch wiederkehrenden Vorboten stets neue Ergießungen erfolgen, nach und nach bedeutend (oft*) zu mehreren Pfunden) in den Geschlechtstheilen an. Es entsteht dann Auftreibung des Leibes, unordentliche Verdauung, Kreuzschmerz u. s. w., Zufälle, welche oft den Verdacht von Schwangerschaft erregen können. Die geburtshülfliche Untersuchung wird übrigens hier den Zustand alsbald bestimmt erkennen lehren.

*) Von Oberteufer wird z. B. in Stark's neuem Archiv für Geburtshülfe. 2r Bd. 4s St. S. 637 ein Fall erzählt, wo 6 Pfund Blut nach Durchschneidung des Hymens ausflossen.

§. 155.

2) Gehört zu diesen Ursachen Störung der Reproduktion entweder in Folge anderer Krankheiten, oder in Folge der Lebensweise. — Was das erstere betrifft, so ist sehr wohl abzusehen, wie das Eintreten irgend einer Krankheit, z. B. eines Fiebers, in wiefern dadurch eine pathologische Revolution veranlaßt wird, die physiologische Revolution bey Entwicklung der Menstrualfunktion hemmen müsse, und eben so klar ist es, daß allgemeine chronische Krankheiten, ja selbst der nach acuten oder chronischen Krankheiten zurückbleibende Schwächezustand dieser Entwicklung hinderlich seyn müsse. Allein in allen diesen Fällen wird die Verzögerung der Menstruation an und für sich selten als Krankheit empfunden, indem der Organismus, wo selbst die individuelle Reproduktion unvollkommen ist, nicht das Bedürfniß der Reproduktion der Gattung empfinden kann, und nicht jenen Ueberfluß, welcher die Bedingung der Menstruation ist, erzeugt. Nur wo daher Mißverhältnisse in der Reproduktion der einzelnen organischen Systeme Statt finden, wo bey allgemeiner schon kräftiger gewordener Ernährung die Ernährung der Geschlechtsorgane und namentlich des Uterus selbst noch unvollkommen bleibt, welches am häufigsten bey scrofulösen Individuen, bey Auftreibungen einzelner Unterleibsorgane (etwa nach intermittirenden Fiebern) oder krankhafter Erregung anderer Gebilde, z. B. äußerlichen Geschwüren, Wurm- oder Hautkrankheiten u. s. w. vorkommt, erscheinen die Molimina ad Menstruationem, werden heftiger, geben zu Entstehung von Geisteskrankheiten, zu den sonderbarsten Umstimmungen des Nervenlebens (welche durch Idiosynkrasien, Krämpfe, Epilepsie, Veitstanz, Somnambulismus sich äußern), zu Congestionen nach andern Gebilden, Blutflüßen, Schleimflüßen, Auftreibungen und Verbildungen einzelner Organe Veranlassung, und indem oft so die allgemeine Reproduktion in ihrer ursprünglich auf erhöhtes Geschlechtsleben gerichteten Thätigkeit gehindert wird, sinkt auch sie selbst, die Verdauung wird schwach, Obstruktionen oder Diarrhöen finden sich ein, die Blutbereitung wird unvollkommen, es entwickelt sich Bleichsucht, in Folge der

[illegible]

[illegible]

[illegible]

oben (§. 155.) genannten Verstimmungen des Nervensystems und Cachexien sich entwickeln können.

§. 158.

4) Endlich findet sich auch, obwohl seltner, die Eintretung der Menstrualfunktion durch überwiegende Thätigkeit des arteriellen Systems gehindert. Ohngefähr eben so nämlich wie in entzündeten Sekretionsorganen, nachdem die Entzündung eine gewisse Höhe erreicht hat, die absondernde Thätigkeit sich zu verlieren pflegt, so finden sich auch, namentlich auf dem Lande, bey recht kräftigen, starker Muskelanstrengung und reine Luft (beides die Arteriellität erhaltende Momente) gewöhnten Körpern (wo überhaupt die Geschlechtsentwicklung immer etwas später erfolgt), daß trotz der in ihrem Körper reichlich erzeugten plastischen Stoffen und manchen eintretenden Vorboten der Menstruation doch dieselbe nicht wirklich erscheint, und wohl aus keinem andern Grunde, als weil im Gefäßsystem des Uterus die Arterien ein zu großes Uebergewicht über die Venen erlangt haben. Bey solchen Individuen treten dann insbesondre diejenigen Molimina welche rein dem Gefäßsystem angehören, in krankhafter Höhe, und zwar vorzüglich periodisch hervor, die Klagen über Schwindel, Kopfschmerz, sind zu Entzündungs- und fieberhaften Krankheiten, apoplektischen und asphyktischen Zufällen disponirt, ja erleiden diese Krankheiten oft wirklich.

§. 159.

Den Verlauf des Uebels und die Prognose bey diesen Verzögerungen betreffend, so ergiebt sich, was hierüber zu bemerken wäre, beynahe aus dem Vorhergehenden von selbst. Bey der ersterwähnten organischen Ursache (§. 154.) nämlich würde allerdings bey längerer Fortdauer der innern Ergießung ohne mögliche Entleerung nach außen, die gewaltsame Vergrößerung der innern Geburtstheile, der Druck des angehäuften Blutes*) auf die benachbarten Organe zu

*) Merkwürdig ist es, daß dieses stockende Blut doch nicht verdirbt und fault, sondern, wie mehrere Fälle beweisen, als dickliche,

Schwäche des Lymphgefäßsystems gesellen sich Wasseranhäufungen hiezu und auf diese Weise kann dieser Zustand selbst lebensgefährlich werden.

§. 156.

Ein ähnlicher Zustand entwickelt sich denn auch zuweilen ohne eine andere vorausgegangene Krankheit blos in Folge fehlerhafter Lebensweise. Personen welche durch anhaltendes Sitzen Störungen in der Bluthewegung der Unterleibsgefäße veranlassen, welche in feuchter unreiner Luft, unter Gram und Sorge, bey schlechten Nahrungsmitteln leben, verfallen leicht, wenn die Zeit heranmaht, wo die Entwicklung der Pubertät von der Natur gefordert, obwohl nicht erlangt wird, namentlich in die genannten Cacherien; dahingegen Personen, welche in früherer Zeit durch Ausschweifungen die Geschlechtsorgane geschwächt und dadurch die Fähigkeit derselben zur Menstrualfunktion und Zeugung großen Theils zerstört haben, in dieser Periode vorzüglich mit den gleichfalls genannten Nervenübeln zu kämpfen haben.

§. 157.

3). Finden wir als Ursache der verzögerten Menstruation häufig die Abweichung in der Gesammtform des weiblichen Körpers vom ächten Geschlechtstypus, die Hinneigung zur männlichen Körperform, bey übrigens regelmäßiger Gestalt der Geschlechtstheile selbst. Solche Individuen (Mannjungfern, Viragines) zeichnen sich aus durch die beträchtlichere Körpergröße, breitere und längere Brust, längeres Gesicht, männlichere Züge, stärkere Haarentwicklung auf der Oberlippe, hervorgehobenere Knochenbildung, plattern Unterleib, und schmälere Hüften, und es ist in ihnen überhaupt die Entwicklung der Menstrualfunktion erst einem etwas spätern Lebensalter natürlich; allein selbst wenn nun im 18ten oder 20sten Jahre einige Vorboten dieser Periode erscheinen, so ist demohnerachtet zuweilen die Reproduktion nicht (wie sie im weiblichen Körper doch eigentlich soll) kräftig genug, um diese Entwicklung zu bewerkstelligen, weßhalb denn oft die Molimina eine krankhafte Höhe erreichen, und

die oben (§. 155.) genannten Verstimmungen des Nervensystems und Cacherien sich entwickeln können.

§. 158.

4) Endlich findet sich auch, obwohl seltner, die Erscheinung der Menstrualfunktion durch überwiegende Thätigkeit des arteriellen Systems gehindert. Ohngefähr eben so nämlich wie in entzündeten Sekretionsorganen, sobald die Entzündung eine gewisse Höhe erreicht hat, die ausscheidende Thätigkeit sich zu verlieren pflegt, so finden wir auch, namentlich auf dem Lande, bey recht kräftigen, an Muskelanstrengung und reine Luft (beides die Arteriellität erhöhende Momente) gewöhnten Körpern (wo überhaupt die Pubertätsentwicklung immer etwas später erfolgt), daß trotz den in ihrem Körper reichlich erzeugten plastischen Stoffen und manchen eintretenden Vorboten der Menstruation doch dieselbe nicht wirklich erscheint, und wohl aus keinem andern Grunde, als weil im Gefäßsystem des Uterus die Arterien ein zu großes Uebergewicht über die Venen erlangt haben. Bey solchen Individuen treten dann insbesondre diejenigen Molimina welche rein dem Gefäßsystem angehören, in krankhafter Höhe, und zwar vorzüglich periodisch hervor, sie klagen über Schwindel, Kopfschmerz, sind zu Entzündungs- und fieberhaften Krankheiten, apoplektischen und asphyktischen Anfällen disponirt, ja erleiden diese Krankheiten oft wirklich.

§. 159.

Den Verlauf des Uebels und die Prognose bey diesen Verzögerungen betreffend, so ergiebt sich, was hierüber zu bemerken wäre, beynahe aus dem Vorhergehenden von selbst. Bey der ersterwähnten organischen Ursache (§. 154.) nämlich würde allerdings bey längerer Fortdauer der innern Ergießung ohne mögliche Entleerung nach außen, die gewaltsame Vergrößerung der innern Geburtstheile, der Druck des angehäuften Blutes*) auf die benachbarten Organe zu

*) Merkwürdig ist es, daß dieses stockende Blut doch nicht verdirbt und fault, sondern, wie mehrere Fälle beweisen, als dickliche,

vielfachen Unterleibs- und allgemeinen Leiden führen müssen, und indem die Heilkraft der Natur hierbey fast unvermögend erscheint, würde die Prognose sehr ungünstig gestellt werden müssen, ließe nicht das Uebel eine leichte und sichere Heilung zu. Angehend 2) den Verlauf des Krankheitszustandes bey der durch gesunkene Reproduktion verzögerten Menstrualfunktion, so ist derselbe schon §. 155. u. 156. erörtert worden und wir fügen hinsichtlich der Prognose nur bey, daß dieselbe abzuwägen sey theils nach dem Grade, der Dauer, so wie der leichtern oder schwerern Heilbarkeit der die Störungen herbeyführenden Krankheiten (wobey denn in der Regel acute Krankheiten eine bessere Prognose als chronische zulassen), theils nach der eigenthümlichen Constitution der Kranken, theils nach den äußern Verhältnissen, in wiefern sie überhaupt der Heilung günstig sind oder nicht, und in wiefern sie, wenn in ihnen der Grund der Verzögerung selbst liegt, gehoben werden können.

§. 160.

Die krankhaften Zufälle ferner, welche von der 3ten Ursache herbeygeführt werden, sind gewöhnlich besonders langwierig, ihr Verlauf jedoch nach stärkerm oder schwächerm Körperbau, günstigern oder ungünstigern äußern Verhältnissen verschieden; nie kann jedoch hier die Prognose sehr vortheilhaft gestellt werden, indem die Haupturſache, d. i. der unweibliche allgemeine Habitus, nicht zu beseitigen ist, vielmehr gewöhnlich, auch nachdem die Menstruation endlich erschienen ist, einen unregelmäßigen und unvollkommenen Gang derselben (wovon noch unten) zu veranlassen pflegt. — Endlich die 4te Ursache betreffend, so sind zwar die Zufälle, welche hier eintreten, oft sehr stürmisch, allein theils ist dabey die Natur selbst weit mehr als bey andern hülfreich, theils gelingt es der Kunst hier weit leichter und sicherer Abhülfe zu schaffen, und die Prognose wird daher im Ganzen vortheilhafter gestellt werden können.

---

schwärzliche, sonst aber unverdorbene Blutmasse bey der Operation ausfließt. Lavagna hält auch von dieser Erscheinung den Mangel des Faserstoffes für die Ursache. S. Meckels Archiv. IV. S. 352.

§. 161.

Wir kommen nun zur Heilung dieser Uebel, welche wieder nach den verschiedenen ursachlichen Momenten auf verschiedene Weise eingeleitet werden muß. Die Heilung der durch organische Ursachen verzögerten Ergießung der Menstruation ist schon oben (§. 137.) erwähnt worden, und daher hier nur noch beyzufügen, daß wenn das Durchschneiden der verschlossenen Partie zu einer Zeit vorgenommen wird, wo schon bedeutende Blutergießungen dahinter sich gesammelt hatten, es nothwendig wird, mehrmalige Injektionen aus einem Absud von Hb. Serpilli, Absinthii, Flor. Chamomill., allenfalls mit etwas Wein oder Tr. Myrrhae vermischt, in die innern Geburtstheile zu machen, theils um die vollständige Reinigung der Theile zu bewirken, theils um die Zusammenziehung derselben zu befördern. Die Heilung der Zufälle betreffend, welche von Störungen in der Reproduktion ausgehend die Verzögerung der Menstruation veranlassen, so müssen wir zuvörderst erwähnen, daß kaum irgend ein Verfahren schädlicher hierbey seyn könne, als direkt das Hervortreten jener monathlichen Blutergießungen durch Anwendung reitzender, das Geschlechtssystem insbesondere in Anspruch nehmender Mittel zu fördern, wie es demohnerachtet von unwissenden Empirikern durch Darreichung der Aloë, der Gummata ferulacea, der Sabina u. s. w. nicht selten zu geschehen pflegt. Daß hierbey nämlich theils der Digestionsapparat noch mehr zerrüttet, und sowohl hierdurch als durch den etwaigen Blutfluß die Schwäche noch mehr vermehrt werden, theils aber in Folge der reitzenden Eigenschaft jener Mittel auch Anschwellungen der Drüsen des Unterleibes, chronische Entzündungen, namentlich der innern Geschlechtsorgane, und in Folge dieser, Nymphomanie, Wassersucht der Ovarien u. s. w. veranlaßt werden müsse, liegt am Tage.

§. 162.

Allein auch das Verfahren, welches blos durch die gemeinhin stärkend genannten Mittel solchen Zuständen zu begegnen hofft, und Kranke dieser Art mit Extrakten, Chinae

Fußbäder mit Asche, Salz oder Senf geschärft, wollene Bekleidung der untern Extremitäten, reitzende Friktionen (etwa von Spiritus serpilli, formicarum u. s. w. mit T. Cantharid. vermischt) an die Fußsohlen, aromatische Halbbäder, fleißige Bewegung, auch wohl öfteres Reiten und Fahren.

§. 165.

Ist allein unzweckmäßige Lebensweise die Ursache der gehinderten Entwicklung der Menstrualfunktion, so muß man zunächst die äußern Verhältnisse zu verbessern suchen, für gesündere Luft und Nahrung Sorge tragen, die Aufheiterung des Gemüths auf alle Weise begünstigen, und übrigens den Zustand von Unthätigkeit der Reproduktion im Allgemeinen sowohl als Besondern auf dieselbe Weise, wie in den beiden vorhergehenden Paragraphen gelehrt wurde, behandeln.

§. 166.

Die dritte Ursache, den männlichen Habitus betreffend, so ist hier das Vermögen der Kunst allerdings am meisten beschränkt, wir können und müssen auch hier nur erinnern, daß man nicht etwa die Entwicklung einer nur aus dem Ganzen hervorgehenden Funktion durch gewaltsames Hervorheben des Systems der Uteringefäße, d. i. durch unzeitig gegebene Emmenagoga u. s. w. beschleunigen wolle, sondern diese Entwicklung, welche einzig Werk der Natur seyn muß, auch dieser ganz zu überlassen, und sich allein auf vorsichtige Unterstützung derselben, so wie auf Beseitigung einzelner sich darbietender Krankheitszustände zu beschränken, als Regel annehme. Was aber Unterstützung der Reproduktion betrifft, so werden wieder namentlich die Verdauungswerkzeuge zu berücksichtigen, durch eine zweckmäßige Anwendung tonischer Mittel die assimilativen Kräfte zu heben, überhaupt aber der Gebrauch von Bädern, hinlänglicher Bewegung und freier Luft von Nutzen seyn, wobey übrigens durch wollene Binden um den Leib, wärmere Bekleidung der Unterglieder, gelind zur Erhöhung der Thätigkeit in den Bekengefäßen mitgewirkt werden kann; auch wird bey mehr torpidem Habitus, der Genuß eines guten alten Weins, mehr

erschütternde Bewegungen (als Reiten, Fahren), geistige Friktionen der Regio hypogastrica, elektrische Bäder u. s. w. sehr mit Nutzen Anwendung finden. Endlich scheint nach den bisherigen Beobachtungen, so wie nach physiologischen Gründen, der thierische Magnetismus als ein vorzügliches, die Reproduktion unterstützendes Mittel hier nicht übergangen werden zu dürfen.

§. 167.

Die Behandlung einzelner hierbey obwaltender Beschwerden muß ganz nach der Art der Zufälle selbst eingerichtet werden, und vorzüglich bleibt dabey der Stand des Gefäßsystems zu berücksichtigen, indem bey kräftigen vollsaftigen Körpern die häufigen Congestionen, Fieberbewegungen u. s. w. vorzüglich durch sehr beschränkte Diät, verdünnendes, säuerliches Getränk, gelinde Abführungen, mehr vegetabilische Diät, Fußbäder u. s. w. beseitigt werden müssen, ja selbst mitunter allgemeine oder örtliche Blutentziehungen erfordert werden, dahingegen die bey schwächlichen reitzbaren Subjekten häufiger erscheinenden Krämpfe, Gliederschmerzen, Schlaflosigkeit u. s. w. mehr ein vorzüglich außer den stärkern Anfällen streng fortgesetztes, auf Minderung zu reger Sensibilität abzweckendes Heilverfahren verlangen, und daher durch laue Bäder, zweckmäßige einfache Lebensweise, Landluft, rein bittere Mittel, Emulsionen, kleine Dosen narkotischer Mittel am sichersten bekämpft werden. Wir erinnern hierbey nur, daß die heftigern Anfälle bey solchen sensibeln Constitutionen oft wesentlich theils vom Gefäß-, theils vom Verdauungssysteme erregt und unterhalten werden, daß man daher in diesen Fällen nie unterlassen darf, hierhin die gehörige Aufmerksamkeit zu wenden, um durch zweckmäßige Anwendung einer gelind antiphlogistischen oder gastrischen Heilmethode schnellere und vollkommnere Hülfe als durch Ueberhäufung mit den gemeinhin sogenannten krampfwidrigen Mitteln (T. Castorei, Valerianae, Moschi, Liq. C. C., Opium u. s. w.) zu gewähren.

§. 168.

Die vierte Ursache der verzögerten Menstrualfunktion endlich; d. i. die überwiegende arterielle Thätigkeit, macht ein mehr antiphlogistisches Heilverfahren nothwendig, heftigere hier erscheinende Molimina fordern allgemeine oder örtliche Blutentziehungen, Abführungen durch Mittelsalze, verdünnende Getränke, laue Bäder, eine wenig nährende, mehr vegetabilische Diät und Verhütung aller zu sehr anstrengenden Körperbewegungen, so wie im Gegentheil des zu vielen Sitzens.

§. 169.

Wir hätten nun noch den völligen Mangel der Menstrualfunktion rücksichtlich seiner Behandlung zu erwähnen, allein schon aus den oben (§. 153.) erwähnten Ursachen dieses Zustandes ergiebt sich, daß eine besondere ärztliche Behandlung hier nur selten möglich sey. Erscheint nämlich der Mangel der Menstruation bey übrigens wahrhaft entwickelter Pubertät und regelmäßigem Zustande der Geschlechtstheile (von welchen man sich freilich überzeugt haben muß, damit nicht etwa blos mechanische Hinderungen des Ausflußes (s. §. 154.) mit eigentlichem Mangel der Funktion verwechselt werden) als bloße eigenthümliche Varietät und als Idiosynkrasie, so pflegt dieß auch, eben weil es diesem Körper natürlich ist, keine krankhaften Zufälle zu veranlassen, und es müssen demnach solche Individuen nur im Allgemeinen erinnert werden, eine zu stark nährende Diät und sitzende Lebensweise zu meiden, damit nicht bey dem Mangel einer solchen Ausleerung Congestionen, Stockungen u. s. w. um so leichter sich erzeugen. Ist hingegen bedeutende Verbildung oder gänzlicher Mangel wichtiger innerer Geschlechtsorgane die Ursache jener mangelnden Funktion, so werden auch hier nur in den Fällen allgemeine Krankheitszustände befürchtet werden müssen, theils wo bey einem sehr wohlgenährten Körper Ueberfüllung der Gefäße durch sitzende Lebensweise u. s. w. begünstigt wird, theils wo erst späterhin diese organischen Störungen erfolgt sind, wo z. B. durch Exstirpation der Ovarien oder des Uterus Eintritt oder Fort-

dauer der Menstruation unmöglich geworden ist; auch hier muß dann Diät, Lebensweise und selbst ärztliche Behandlung auf ähnliche Weise geordnet werden, wie es bey Gelegenheit der durch männlichen Habitus verzögerten Menstrualfunktion, sobald plethorischer Zustand sich zeigt, erwähnt wurde (§. 167.).

B. Unvollkommne Menstrualfunktion.

§. 170.

Ein Zustand, welcher viel Verwandtes mit der zuvor betrachteten verzögerten Entwicklung der Menstrualfunktion hat, ihr öfters nachfolgt, und auf sehr verschiedene Weise sich äußerlich zu erkennen giebt. Wir definiren denselben im Allgemeinen so, daß alle Verhältnisse dieser Funktion darunter begriffen werden, bey welchen sie, obwohl wirklich in Thätigkeit getreten, doch sowohl ihrer Periodicität, Quantität und Qualität, als ihrer sie begleitenden Vorboten und Quellen nach, zum Nachtheile des allgemeinen Befindens, unter das Maaß zurückgesetzt erscheint, welches wir oben (§. 119. u. f.) als die allgemeine Norm festgesetzt hatten. — Je nachdem nun übrigens diese Unvollkommenheit in einer oder der andern Hinsicht sich offenbart, kann man sodann Veranlassung nehmen, mehrere Unterarten zu unterscheiden, wohin denn rücksichtlich der Periodicität die zu seltene oder unordentliche, rücksichtlich der Quantität die zu geringe, rücksichtlich der Qualität die mißfarbige, rücksichtlich der begleitenden Moliminum die schmerzhafte, und rücksichtlich der Quellen die aus andern Organen fließende Menstruation gehören; Trennungen, welche jedoch als symptomatisch weniger Gewicht haben und im Einzelnen selbst für die Behandlung nur wenige Modifikationen erfordern, sobald das Wesentliche der unvollkommenen Menstrualfunktion, seinen ursächlichen Verhältnissen, seinen Aeußerungen und seiner Heilung nach zur deutlichen Anschauung gebracht ist, wovon wir daher zunächst im Allgemeinen handeln.

§. 171.

Das Wesen (die sogenannte nächste Ursache) eines solchen Zustandes kann aber nothwendig nur als eine im Mißverhältnisse zu allgemeiner Lebensthätigkeit verringert oder gestört erscheinende Lebensthätigkeit des Geschlechtssystems und des Uterus insbesondre betrachtet werden, und wir schließen durch diese ursachliche Bestimmung zugleich alle jene Zustände als nicht krankhaft aus, in welchen, obwohl die Thätigkeit des Uterinsystems geringer ist, als es der Regel nach seyn sollte, doch dieses in Uebereinstimmung mit dem Allgemeinbefinden steht und deßhalb nicht als Krankheit empfunden wird. Es gilt nämlich in dieser Hinsicht wieder ohngefähr dasselbe, was bereits über den Eintritt der Menstruation gesagt wurde, nämlich daß das Maaß der Menstruation, gleich jenem, nach der verschiedenen Constitution, Lebensweise u. s. w. ohne Nachtheil der Gesundheit sehr verschieden seyn könne, und es ist einleuchtend, daß bey einem im Ganzen schwächern Körperbaue, bey Reconvalescenten u. s. w. die Menstruation selbst geringer seyn müsse, daß sie auch wohl seltener eintreten könne u. s. w., obwohl dabey ein allgemeines Wohlbefinden füglich Statt findet; Fälle, wobey denn jedes gewaltsame Anregen einer stärkern oder häufigern Menstruation nothwendig zum größten Nachtheil jener Individuen gereichen würde. Eben dasselbe gilt, wenn die Störung der Menstruation Folge der Schwangerschaft ist, deren Symptome anfänglich oft Vieles mit den Zufällen unvollkommner, und zwar krankhafter Menstruation gemein haben, weßhalb stets bey Untersuchung einzelner Fälle hieran zu denken, und dieser Zustand nicht zu übersehen ist.

§. 172.

Indem wir also jenes Mißverhältniß zwischen allgemeiner und Geschlechtsthätigkeit allein ins Auge fassen, bleiben uns nur die weitern, sowohl im Körper, als in äußern Einwirkungen liegenden Bedingungen (prädisponirende und Gelegenheitsursachen) zu berücksichtigen übrig, wobey zugleich die Art der durch eine oder die andere Ursache am

häufigsten erzeugten Unregelmäßigkeit in der Menstruation erwähnt werden muß. Zuvörderst gehören aber hierher die Abnormitäten in der Bildung der Geschlechtsorgane, welche entweder ursprüngliche oder später entstandene seyn können. So findet sich namentlich bey mehr männlichem Habitus des gesammten Körperbaues oft eine geringe Ausbildung des Uterus, welche sich bey der innern Untersuchung durch besondere Dünnheit der Vaginalportion und Kleinheit des Gebärmutterkörpers *), und äußerlich gewöhnlich durch sehr schwach entwickelte Brüste zu erkennen giebt, und es wird dadurch theils eine zu seltene, theils eine zu schwache Ausscheidung monathlichen Blutes zu Wege gebracht, welches dann, wo die allgemeine Ernährung gut ist, und vornehmlich etwa durch sitzende Lebensweise, nährende Speisen u. s. w. unterstützt wird, Veranlassung zu Congestionen, Entzündungen, Brustkrankheiten, Nervenleiden, ja selbst zu stellvertretenden Blutungen giebt. Aehnliche Unordnungen werden bey unvollkommener Entwicklung anderer innerer Geschlechtstheile erfolgen können.

§. 173.

Außer den ursprünglichen sind nun zweytens die später entstandenen Störungen in Form und Struktur der Geburtstheile zu erwähnen; es gehören hierher Zerstörungen, Abscesse, Verhärtungen, namentlich Scirrhus, Steatomata und Sarcomata, Wasseranhäufungen u. s. w., sowohl des Uterus, als der Ovarien, Zustände, für welche die Kennzeichen späterhin bey Betrachtung der örtlichen Krankheiten angegeben werden. Es ist hierbey zu bemerken, daß in der Zeit, wo solche Verbildungen sich entwickeln, oft das sparsamere Er-

*) Die Dicke des Uterus ist überhaupt bey verschiedenen Körpern sehr verschieden, und es zeigt sich dieses oft bey Schwangerschaft und Wochenbett vorzüglich deutlich. Ich bewahre in der Sammlung der Gebäranstalt den Uterus einer Wöchnerin von mehr männlichem Körperbau, welcher nur die Hälfte der Dicke eines gewöhnlichen Uterus zeigt.

scheinen der Menstruation, sowohl der Zeit als der Quantität und Qualität nach, nicht als besondere Krankheit empfunden werde, in wiefern der Verbildungsproceß selbst, als Hauptsache, jene Abweichungen nothwendig involvirt, allein daß, wenn die veränderte Struktur als Produkt der Krankheit feststeht, der normale Zustand im allgemeinen Befinden zurückkehren kann, so daß nun die kräftigere Reproduktion im Ganzen oft das Mißverhältniß zu den degenerirten, zur Menstrualfunktion wenig mehr geeigneten Geschlechtsorganen auf ähnliche Weise wie bey ursprünglichen Mißbildungen (s. vorigen Paragraph) durch vielfache Beschwerden hervortreten lassen wird.

§. 174.

Andere Ursachen der verringerten Menstruation sind das Sinken der reproduktiven Thätigkeit, welches indeß nur dann die schwächere Menstrualfunktion als Krankheitszustand erscheinen läßt, wenn sie unverhältnißmäßig zum Ganzen im Geschlechtssystem vermindert ist. So finden wir z. B. in den meisten chronischen und acuten Krankheiten, in der Reconvalescenz, in überhaupt schwächlichen Individuen bey unzulänglicher Nahrung und Pflege des Körpers u. s. w. die Menstruation sparsam, wäßerig, kurz zu schwach; allein dieses an und für sich ist nicht Krankheit, indem ja offenbar, wenn die Menstruation unter diesen Umständen stark wäre, der Körper darunter leiden müßte; ist hingegen das Leben des Geschlechtssystems allein geschwächt, so muß daraus allerdings wieder ein Mißverhältniß, wie bey den erwähnten organischen Verbildungen, hervorgehen. Solche örtlich die Lebensthätigkeit dieser Gebilde herabsetzende Momente aber sind theils krankhaft gesteigerte Thätigkeit anderer Organe, wodurch namentlich die aus abnormen Quellen fließende Menstruation erzeugt wird, theils Schleim- oder Blutflüße aus denselben, sehr häufige Wochenbetten und zu lang fortgesetztes Stillungsgeschäft, ausschweifende Lebensart (Schwächezustände, welche namentlich durch Erschlaffung oder abnorme Anschwellung, verringerte Temperatur der Genitalien, schwächere oder widernatürlich heftige Geschlechtsneigung charakterisirt werden), theils und vorzüglich aber die entweder in

Folge übler Lebensweise oder in Folge anderer Krankheiten entstehenden Unordnungen im System der Lymphgefäße und der Pfortader, indem nicht selten bey Drüsenanschwellungen und gestörtem Kreislauf in den Unterleibsgefäßen das periodische Anströmen der Säftemasse nach den Uteringefäßen Hinderung findet, wodurch denn unter Mitwirkung einer verstimmten Sensibilität Congestionen nach andern Organen, vicariirende Blutungen, Nervenleiden u. s. w. erzeugt werden. Man sieht dabey übrigens leicht, daß wieder die mit Beschwerden, oder zu selten, oder zu schwach und mißfarbig erscheinende Menstruation hier nur das Symptom jenes erstern Krankheitszustandes ist, und als solches auch bey der Behandlung betrachtet werden muß, so wie die Zeichen dieser ursächlichen Verhältnisse denn auch keine andern als die Zeichen jener, namentlich in den Unterleibseingeweiden Sitz fassenden Krankheiten seyn können, wohin denn der äußere scrofulöse Habitus, Digestionsbeschwerden, Obstruktionen, Auftreibungen einzelner Eingeweide u. s. w. gehören.

§. 175.

Endlich kann denn auch die unvollkommene Menstrualfunktion eben so wie Verzögerung derselben (s. §. 158.) durch Ueberwiegen arterieller Thätigkeit veranlaßt werden, und gerade sehr robuste Körper, in welchen die Muskularthätigkeit und Oxydation auf einer Stufe steht, welche dieselben der Individualität des männlichen Körpers näher bringt, werden oft dadurch an normaler Ausübung der Menstrualfunktion gehindert, und empfinden diesen mit der eigenthümlichen Natur des weiblichen Körpers so wenig übereinstimmenden Zustand durch mannigfaltige Beschwerden, Schmerzen, Wallungen, Blutungen, Neigung zu Entzündungszuständen und Fiebern.

§. 176.

Bevor wir nun die Betrachtung der Ursachen unvollkommner Menstrualfunktion ganz verlassen, ist noch von der Bestimmung der einzelnen Formen derselben einiges beyzufügen, und die Frage zu beantworten, warum nun in einem

Falle die seltene, in andern Fällen die schwache, in andern die schmerzhafte, in andern die mißfarbige, und in noch andern die durchaus unordentliche Menstruation oder die aus andern Quellen fließende sich zeige? — Es scheint aber, wenn man diese verschiedenen Fälle unter einander vergleicht, allerdings, daß, ob das Eine oder das Andere Statt finde, vorzüglich theils durch das Verhältniß zwischen Nerven- und Gefäßsystem, theils durch den Stand der Gefäßthätigkeit im Uterus insbesondre, theils durch das Verhältniß anderer Organe zu den Geschlechtsorganen bestimmt werde.

§. 177.

Zuvörderst das Verhältniß zwischen Nerven- und Gefäßsystem betreffend, so ist klar, daß ein höherer Grad von Torpidität, namentlich der den Sexualorganen bestimmten Nerven, unter Einwirkung einer oder der andern der früher erwähnten Ursachen, das seltnere Erscheinen der Menstruation vorzüglich veranlassen werde, indem bey geringerer Empfindlichkeit sehr leicht die organische Reaktion für den Reitz der sich vermehrenden Säftemasse weiter hinausgeschoben wird, daher denn bey phlegmatischen Constitutionen und namentlich unter Einwirkung gewisser ursprünglicher abnormer Bildungsrichtungen, so wie auch bey scrofulösem Habitus, Störung der Unterleibsfunktionen u. s. w. auch diese Abnormität am häufigsten erscheint. Die spärliche oder mißfarbige Menstruation hingegen wird theils einer im Allgemeinen zu geringen oder unvollkommnen Blutbereitung, theils einer örtlich gesunkenen oder durch krankhafte Verbildung abnorm gewordenen Thätigkeit der Uteringefäße angehören, und wir finden sie daher theils bey allgemeinen acuten oder chronischen Krankheiten, theils bey Geschwüren, Verhärtungen, Wassersuchten der Geschlechtsorgane vorzüglich vor.

§. 178.

Ferner die schmerzhafte Menstruation betreffend, so kann man bey derselben theils eine krampfhafte, theils eine entzündliche Form unterscheiden, von welchen die erste vorzüglich durch ein an und für sich verstimmtes und überspanntes

Nervensystem, die andere hauptsächlich durch das erwähnte Uebergewicht arterieller Thätigkeit, beide indeß namentlich durch gestörte Bildung und Lage der Geschlechtsorgane, und vorzüglich durch irgend ein zu großes Mißverhältniß zwischen ihnen und dem Allgemeinen veranlaßt werden. Ueberhaupt sind die besondern Zufälle der schmerzhaften Menstruation eigentlich nur als höher gesteigerte Molimina ad Menstruationem zu betrachten, und es ist daher zuweilen diese Krankheitserscheinung auch nur auf einen gewissen Zeitraum, z. B. auf die Pubertätsentwicklung selbst eingeschränkt, mitunter aber auch bey jeder Periode wiederkehrend *). Das erstere ist dann oft mehr die Folge des Ungewohnten, und gleicht sich späterhin nicht selten ohne alle ärztliche Hülfe von selbst aus. — Ferner die überhaupt unordentliche und regellose Menstruation betreffend, so deutet dieses gänzliche Verlieren eines gesetzmäßigen Typus in dieser Funktion immer auf bedeutende Störungen in den allgemeinen Systemen, erscheint daher als Symptom der Scrofelkrankheit, krampfhafter Krankheiten, z. B. der Epilepsie, des Veitstanzes u. s. w., so wie bey angehenden organischen Verbildungen der Unterleibseingeweide oder der Geschlechtsorgane selbst **), und kann nur beseitigt werden, sobald der allgemeine Krankheitszustand gehoben ist.

§. 179.

Endlich die Menstruation aus ungewöhnlichen Quellen anbelangend, so sind zuvörderst die Organe selbst, welche hier für den Uterus vicariirende Thätigkeit ausüben, sehr

*) Diese Form ist denn wohl in ursprünglicher Verstimmung des Sexualnervensystems begründet, mir sind daher auch Fälle, wo dieses Uebel erblich war, bekannt, und alle Heilungsversuche fruchtlos blieben.

**) Zu Verstimmungen dieser Art kann oft der Grund schon früh gelegt werden; so ist mir ein Fall bekannt, wo ein übrigens gesundes und starkes Mädchen stets der Zeit nach unordentlich menstruirte, nachdem sie im zwölften Jahre aus dem zweiten Gestock eines Hauses herabgestürzt war, und die Kreuzgegend sich besonders verletzt hatte.

verschieden; einer der häufigsten Fälle ist das Ergießen von Blut aus dem untern Ende des Darmkanals*) durch die Hämorrhoidalgefäße, ferner aus der mittlern Gegend desselben beym Blutbrechen, und aus der obersten beym Bluten des Zahnfleisches. Außerdem vertreten zuweilen die Thätigkeit der Uteringefäße: die Harnwerkzeuge, die Respirationsorgane (und zwar durch Bluthusten oder Nasenbluten sowohl, als durch veränderte Hautthätigkeit, entweder im Allgemeinen, wie bey blutigen Schweißen, oder an einzelnen Stellen, wie bey periodisch blutenden Wunden oder Geschwüren), endlich auch wohl andere Geschlechtsorgane, und zwar namentlich die Brüste**). Seltner ist, daß blos vermehrte Se- oder Excretionen für die Menstrualthätigkeit des Uterus erscheinen, und Speichelflüße, Durchfälle, stärkere Harn- oder Schweißabsonderungen statt eines wahren Blutflußes eintreten, noch seltner indeß, daß bey einer solchen periodischen Thätigkeit anderer Organe zugleich die eigentliche Menstruation erscheint, welche letztere Fälle dann mehr zu der in der folgenden Rubrik abzuhandelnden übermäßigen Menstruation gerechnet werden müssen. — Die Gründe betreffend, welche nun in irgend einem gegebenen Falle gerade eine oder die andere Art dieser vicariirenden Blutergießungen herbeyführen, so können sie verschieden seyn; im Allgemeinen aber ist zu bemerken, daß vorzüglich die §. 172. u. 173. angegebenen organischen Verbildungen, und überhaupt alles, was direkt oder indirekt die ausscheidende Thätigkeit der Uteringefäße hindert, diese Form unvollkommner Menstrualfunktion herbeyführen; also namentlich die im Folgenden abzuhandelnde Unterdrückung der Menstruation durch äußere gewaltsam einwirkende Momente, zweitens aber die abnorm aufgeregte Thätigkeit anderer Organe entweder mittelst ursprünglicher Constitution (weßhalb z. B. bey phthisischem Habitus vicariirende Lungenblutflüße, bey erblicher Hämorrhoidalanlage vicariirende

*) Wir werden hier wieder an die physiologische Verwandtschaft zwischen Geschlechtswegen und Darmkanal erinnert.

**) Einen Fall dieser Art, dessen Heilung gelang, s. in Hufeland's Journal f. d. pr. Heilk. 1816. Novbr.

Hämorrhoiden häufiger vorkommen) oder in Folge örtlicher Reitze. Endlich wird auch die vicariirende Menstruation durch das §. 174 erwähnte Mißverhältniß reproduktiver örtlicher Thätigkeit des Geschlechtssystems zu einer stärkern allgemeinen Reproduktion, namentlich dann begründet, wenn eine der hier zuletzt genannten Ursachen noch damit sich verbindet.

§. 180.

Gehen wir nun über zu dem bey unvollkommner Menstrualfunktion gewöhnlichen Krankheitsverlauf, und der daraus sich ergebenden Prognose, so müssen wir wieder den §. 171 — 175. erwähnten ursächlichen Momenten folgen. Hier finden wir nun, daß namentlich die ursprünglichen organischen Fehler eine recht regelmäßige und vollkommne Ausbildung der Menstruation oft für alle Zeit hindern, dadurch besondere Langwierigkeit und Unheilbarkeit der Symptome veranlassen, und in sofern eine üble Prognose bedingen, welche nur dann verbessert werden kann, wenn die Störungen der Menstruation an und für sich nicht zu bedeutend sind, die ursprüngliche allgemeine Constitution kräftig ist, und die äußern Verhältnisse dem Wohle der Kranken angemessen geleitet werden können. Im Gegentheil die unvollkommne Menstruation aus später entstehenden organischen Fehlern betreffend (denn bey schon entstandenen und nun sich nicht weiter bildenden gilt wieder das Obige), so sind hier diese Krankheiten, wie schon erwähnt Hauptsache, und Verlauf, so wie Prognose, richtet sich nach der ihnen eigenthümlichen Natur, von welcher späterhin die Rede seyn wird, und welche leider nicht immer die beßten Aussichten für das Heil der Kranken gewährt. Bey der dritten Ursache, nämlich der zu schwachen localen Gefäßthätigkeit gegen die allgemeine, wird ebenfalls der Krankheitsverlauf sich schwerer und hartnäckiger zeigen, je mehr die Geschlechtsorgane in ihrer Thätigkeit gesunken, und je reichlicher demohneracht die Chylusbereitung von Statten geht, und es ist darnach leicht abzunehmen, daß z. B. in Fällen, wo die Schwächung des Geschlechtssystems nur vorübergehend, durch starke Blutungen etwa veranlaßt wurde, das

Gesammtbefinden aber durch seinen kräftigern Stand jenen örtlichen Mangel bald zu heben verspricht, der Krankheitsverlauf kürzer und die Prognose günstiger seyn müsse, als wo bey einer durch scrofulöse Disposition, ungeordnete Diät, geschlechtliche Ausschweifungen untergrabenen Constitution der normale periodische Blutandrang gegen das Sexualsystem Hindernisse findet, und nun, sich gegen andere Organe wendend, die bedeutendsten Beschwerden, sowohl durch Congestionen als durch Nervenzufälle herbeygeführt hat. Am leichtesten endlich vorübergehend, und, wenn auch zuweilen mit augenblicklich heftigen Symptomen begleitet, doch bald durch zweckmäßige Hülfe zur Ordnung rückführbar, pflegt die unvollkommne Menstruation wegen überwiegender Arterienthätigkeit zu seyn.

§. 181.

Was die einzelnen Formen der unvollkommnen Menstrualfunktion betrifft, so kann über sie allein eine besondere Bestimmung des Krankheitsverlaufs und der Prognose nicht Statt finden, in wiefern sie nur als äußere Zeichen der oben erwähnten ursächlichen Zustände angesehen werden dürfen, und man also z. B. nicht sagen kann, daß die spärliche Menstruation an und für sich leichter oder schwerer heilbar sey als die seltene, oder die mißfarbige, oder die schmerzhafte; wogegen es sich jedoch von selbst ergiebt, daß bey allen diesen Zuständen die Heilung um so eher zu erwarten steht, je weniger eingewurzelt und verjährt, oder wohl gar durch erbliche Anlagen begründet, dieselben erscheinen.

§. 182.

Wir kommen nun zu den Mitteln, welche die Kunst darbietet, um die Heilung des Krankheitszustandes, welcher durch unvollkommne Menstruation sich äußert, zu bewerkstelligen, und müssen hier wieder zwei Erinnerungen vorausschicken, erstens daß man, bevor man an eine solche Heilung denke, stets erwäge, ob die in einem gegebenen Falle bemerkte zu sparsame oder sonst unvollkommene Menstruation hier auch wirklich krankhaft genannt werden dürfe, oder nicht

vielmehr in diesem Maaße gerade für das Wohlbefinden des Körpers nöthig sey, wohin z. B. die verminderte Menstruation bey angehender Schwangerschaft, bey acuten oder chronischen Krankheitszuständen anderer Organe, während der Reconvalescenz u. s. w. gehört; zweitens, daß man nicht etwa glaube, dem Willen der Natur Genüge gethan zu haben, wenn man überhaupt die Blutergießung zu Stande bringe, als in welchem Falle sonst eine künstliche Blutentziehung ja schon hinreichen würde, die Krankheit zu heben, und die Menstruation zu ersetzen. Offenbar muß es nämlich bey diesem Heilungsgeschäft Hauptaugenmerk des Arztes seyn, die Genesis des Krankheitszustandes von dem die unvollkomne Menstruation das äußere Zeichen abgiebt, sich klar vor Augen zu legen, und dann die Momente, deren Produkt das Uebel ist, zu beseitigen.

§. 183.

Wenden wir uns daher zuerst zur Behandlung einer wegen ursprünglichen Bildungsfehlern der Geschlechtstheile unvollkommnen Menstrualfunktion, so kann allerdings hier die Kunst am wenigsten ausreichen, um die Wurzel der Krankheit zu zerstören, es wird vielmehr Hauptzweck bleiben müssen, die Folgen dieses Mißverhältnißes zu verhüten oder zu heben, welches am sichersten auf ähnliche Weise geschehen wird, wie es oben (§. 167 u. 169.) für die verrögerte oder mangelnde Menstruation angegeben worden war, und wobey denn in der zweckmäßig eingerichteten Diät und Lebensordnung bey weitem wieder das wichtigste Moment zur Linderung dargeboten ist. Was ferner die Behandlung der unvollkömmenen Menstrualfunktion wegen später entstandener Verbildung der Geschlechtstheile betrifft, so ist zu unterscheiden, ob der Verbildungsproceß noch im Gange, oder ob derselbe abgeschlossen und die Verbildung als fertiges Produkt zurückgeblieben ist. Im erstern Falle ist eher die Rückbildung zu normaler Form, oder doch Verminderung des Uebels zu hoffen, und man behandelt daher dasselbe ganz abgesehen von der abnormen Menstruation nach den Regeln, die wir im Folgenden für jene Bildungskrank-

heiten durchgehen werden. Im andern Falle, wo die Desorganisation beendigt ist, eben daher aber auch ärztlicher Hülfe wenig Zugang mehr darbietet (z. B. bey Steatomen, Verknöcherungen, Verhärtungen, Verwachsungen), bleibt es wieder, wie bey den ursprünglichen Verbildungen, Hauptaufgabe, den Stand allgemeiner Reproduktion mit der Gefäßthätigkeit des Geschlechtssystems in Uebereinstimmung zu bringen, eine zu reichliche Chyluserzeugung zu beschränken, und eingetretene (gewöhnlich nur erst durch fehlerhafte Lebensweise herbeygeführte) Beschwerden, z. B. Congestionen, Krämpfe, schmerzhafte Zustände u. s. w. durch die §. 167. und 169. erwähnten Mittel und Vorschriften zu heben.

§. 184.

Ferner ist die Behandlung der unvollkommnen Menstruation wegen unzulänglicher Erregung reproduktiver Thätigkeit des Geschlechtssystems zu erwägen. Wieder aber wird die Wirksamkeit des Arztes gegen die Erzeuger der Krankheit, die veranlassenden und vorbereitenden Ursachen zunächst gerichtet seyn müssen. Zeigt sich daher in andern Organen eine überwiegende Erregung, wie dieß bey habituellen wohl selbst zu Blutergießungen führenden Congestionen nach Kopf, Brust, Hämorrhoidalgefäßen u. s. w., oder bey Wunden, Geschwüren oder Hautkrankheiten der Fall ist, so wird wieder von diesen Krankheiten die Ursache zu bedenken und zu beseitigen seyn. Die erwähnten Congestionen nämlich können theils ihren Grund haben in den Zuständen der Unterleibsorgane (der Quelle so außerst verschiedenartiger Leiden) und sind dann die Folgen unregelmäßiger Diät, vorhandener Obstruktion, Drüsenanschwellungen oder anderer Auftreibungen, wo sodann eine gelind ausleerende Heilmethode, verbunden mit strenger, einfacher Diät, um so mehr leistet, da eine solche Aufregung der Unterleibsorgane zugleich wohlthätig das Geschlechtssystem mit in Anspruch nimmt. Sind jene Wallungen hingegen mehr Folgen sehr reichlicher Bluterzeugung und der allgemeinen Körperbildung (wie etwa bey starkem kurzem Körperbau Congestionen nach dem Kopfe mit Schwindel und Nasenbluten, bey phthisischem Habitus Beschwerung

der Respirationsorgane und Bluthusten gern vorzukommen pflegen), so ist durch Beschränkung aller auf die leidenden Theile wirkenden Reitze und durch antagonistische Erregung andrer Gebilde am meisten auszurichten. Man ordnet in diesen Fällen ein kühles Regimen an, läßt die Kranken nicht in dicken Federbetten schlafen, läßt eine mehr vegetabilische Diät führen, säuerliche Getränke, bey Brustkrankheiten Molken u. dgl. genießen, reicht von Zeit zu Zeit blande Abführmittel, wendet nöthigenfalls selbst allgemeine Blutentziehungen durch einen Aderlaß am Fuße an, oder bestimmt wenigstens zur Zeit der herannahenden Menstruation Fußbäder oder Blutigel an das Perinaeum.

§. 185.

Bey andern krankhaften Zuständen, als Wunden, Geschwüren, Hautkrankheiten, muß, um die Menstruation zu ordnen, die Heilung dieser Zustände vorausgehen, und zwar unter den Vorsichtsmaaßregeln, welche die etwa bereits längere Dauer derselben nöthig macht, weßhalb dann z. B. bey Heilung scrofulöser langwieriger Geschwüre das Tragen eines Fontanells während einiger Zeit nützlich seyn wird u. s. w. — Zugleich aber wird bey sich hebender allgemeiner Reproduktion auf gelinde Erregung des Geschlechtssystems Rücksicht genommen werden müssen, weßhalb auch hier Fußbäder, wollene Bekleidung der Unterschenkel, trockne Friktionen derselben, bey Vollblütigen Blutigel an das Perinäum, bey Phlegmatischen spirituöse Einreibungen in der regio hypogastrica, Elektricität, das Tragen aromatischer Kräutergürtel, von Zeit zu Zeit das Darreichen einer Abführung aus Senna, Rheum und ähnlichen Mitteln gute Wirkung thun. — Ueberhaupt sind bey allen Arten einer auf diese Weise gestörten Harmonie körperlicher Thätigkeit, Mittel, welche durch ihre an sich indifferente Natur Herstellung des Gleichgewichts befördern, äußerst nützlich, und dahin rechnen wir ganz besonders die Wirkung des lauen Bades, welches, verbunden mit Sorgfalt für Erhaltung und Herbeyführung einer ruhigen und heitern Gemüthsstimmung, die Heilung so wesentlich unterstützt.

§. 186.

Weiter fanden wir die unvollkommene Menstrualfunktion (§. 174.) bedingt durch örtliche Schwäche des Sexualsystems in Folge von Erschöpfung oder Ueberreitzung. Bey Behandlung dieser Zustände ist nun aber zuerst immer das Verhältniß allgemeiner Bildungsthätigkeit zu berücksichtigen, welche stets, wo sie zugleich bedeutend gelitten hat, zuerst die Aufmerksamkeit des Arztes fordert, da, wie schon mehrmals erinnert worden, die Menstrualfunktion nur das Ergebniß allgemeiner Lebensthätigkeit seyn kann. Man hat daher auch hier mit Berücksichtigung des Organs, in welchem die Wurzel der Gesammternährung sich findet, d. i. des Darmkanals, den Anfang zu machen, und wenn unter zweckmäßiger Behandlung die Assimilation wieder regelmäßiger von Statten geht, die die Muskelfaser stärkenden Mittel, als China, Eisen, Wein, Bäder, Bewegung und freye Luft ohngefähr eben so wie oben (§. 162.) gelehrt wurde, anzuwenden.

§. 187.

Was hingegen die örtliche Schwäche betrifft, so ist zu unterscheiden, ob sie mit erhöhter Empfindlichkeit oder mit Apathie sich verbunden zeigt. Im erstern Falle ist zunächst auf Beschränkung aller das Geschlechtssystem erregender Reitze Rücksicht zu nehmen, der Gebrauch des Thees, der Chokolade, gewürzter Speisen zu untersagen, bey Frauen die äußerste Mäßigkeit im Geschlechtsgenuße zur Pflicht zu machen, und eben so sehr alle Erregung der Phantasie durch weichliche Romanenleserey zu untersagen, vielmehr auf Zerstreuung und Aufheiterung des Gemüths mittelst geregelter Beschäftigung Rücksicht zu nehmen. Wird dieses hinlänglich befolgt, das allgemeine Befinden durch die passende Anwendung des erwähnten stärkenden Heilplans mehr und mehr zur Norm zurückgeführt, so werden gewöhnlich auch die Unregelmäßigkeiten der Menstrualfunktion sich verlieren, und wir erwähnen nur noch, daß bey einem hohen Grade von Atonie auch Halbbäder oder Waschungen aus einem Absud von Serpillum, Absinthium, Tragen eines Gürtels mit dem Pulver

der Eichenrinde gefüllt, und öfters mit rothem Wein befeuchtet, und besonders der Gebrauch eisenhaltiger Mineralbäder mit vorzüglichem Nutzen angewendet werden können.

§. 188.

Ist hingegen (was vorzüglich auch zu häufigen Wochenbetten, Leucorrhöe, syphilitischen Zuständen und phlegmatischen Constitutionen, vorzukommen pflegt) die Schwäche der Geschlechtstheile mit bedeutend verminderter Sensibilität verbunden, die Reproduktion im Allgemeinen aber kräftig genug, um die Bedingung zu einer reichlichern und zur rechten Zeit eintretenden Menstruation zu enthalten, so ist vorzüglich die Reihe jener Mittel in Anwendung zu ziehen, deren Wirkung das Nerven- und Gefäßsystem der Geschlechtsorgane besonders in Anspruch nimmt, und welche im §. 164. bereits ausführlich angegeben wurden.

§. 189.

Endlich mußte denn auch die zu sehr hervorgehobene Thätigkeit des arteriellen Systems unter die Ursachen der unvollkommenen Menstrualfunction aufgenommen werden, und wir haben rücksichtlich der Behandlung dieser Zustände nur wieder die Regeln in Erinnerung zu bringen, welche bey ähnlichem Zustande §. 168. gegeben worden sind, und welche in Anordung eines antiphlogistischen Regimens, beschränkter Diät, der Abführungen und der Blutentziehungen vorzüglich bestanden.

§. 190.

Indem wir nun bisher vorzüglich die eigentlichen Ursachen der abnormen Zustände der Menstruation ins Auge faßten, wurden zugleich auch die eigentlichen Grundzüge hier einzuleitender ärztlicher Behandlung entworfen, und die einzelnen Modifikationen in der äußern Erscheinung dieser Krankheitszustände, z. B. das zu seltne, zu spärliche, das mißfarbige Fließen der Menstruation, kann ebenfalls nur geringe Modificationen der Behandlung veranlassen. Es ist nämlich, ob die eine oder die andere Form der unvollkommenen Men-

ſchreitet. Als verſchiedene Formen, unter welchen dieſer Krankheitszuſtand erſcheint, ſind theils die der Quantität nach zu ſtarke, theils die der Zeit nach zu häufige Menſtruation aufzuführen; beydes kann ſich indeß auch vereinigen oder abwechſelnd ſich zeigen, ja ſelbſt (bey der unordentlichen Menſtruation) mit der unvollkommnen Menſtruation abwechſeln. Weſentlich bleibt auch hier das Berückſichtigen der urſachlichen Momente, welche ein ſolches Mißverhältniß zwiſchen geſchlechtlicher Thätigkeit und insbeſondre dem Leben der Uterin-Gefäße und allgemeiner Bildungsthätigkeit hervorrufen; denn auch hier iſt klar, daß nur durch dieſes Mißverhältniß der Zuſtand zur Krankheit wird, indem, wenn die Menſtruation im Einklange mit ſehr reichlicher allgemeiner Bluterzeugung ſtärker oder häufiger erſcheint, dieß allerdings mit vollkommnem Wohlbefinden verbunden ſeyn kann, und folglich keiner ärztlichen Behandlung unterliegen wird.

§. 194.

Innere vorbereitende Urſachen dieſer Abnormität ſind aber 1) ſanguiniſches Temperament, kurzer gedrängter Körperbau mit ſtark entwickeltem Sexualſyſtem, durch die breiten Hüften und ſehr vollen Brüſte, ſo wie durch ſtärkere Geſchlechtsneigung charakteriſirt; oder auch im Gegentheile eine ſchwächliche aber beſonders reitzbare Conſtitution; kurz, ein urſprüngliches, in der organiſchen Bildung ſelbſt bedingtes Ueberwiegen der Geſchlechtsthätigkeit, welches, wenn es mehr im Gefäßſyſtem ſich ausſpricht, namentlich von der zu ſtarken, wenn es mehr im Geſchlechtsſyſtem ſich kund giebt, mehr von der häufiger erſcheinenden Menſtruation begleitet wird. 2) Hoher Grad von Atonie der Geſchlechtsorgane, wo bey unvollkommner Contraktilität der Uteringefäße reichlichere Blutergießungen, als der Stand allgemeiner Bildungsthätigkeit fordert, erfolgen, ein Zuſtand, welcher theils durch zu häufige Wochenbetten, frühere Hämorrhagien, Ausſchweifungen und Krankheiten der Genitalien (z. B. Leucorrhöe und Syphilis) herbeygeführt werden kann. 3) Organiſche Verbildungen der Genitalien durch Abſceſſe, Verhärtungen und Carcinoma. 4) Krankheiten benachbarter Organe, wodurch

der regelmäßige Blutlauf in den Unterleibsorganen gestört wird, wohin scrofulöse Zustände, Krankheiten des Pfortadersystems, Obstruktionen und Auftreibungen einzelner Eingeweide gerechnet werden müssen.

§. 195.

Aeußere veranlassende Ursachen sind 1) eine zu reichlich nährende Diät von vielen Fleischspeisen, starken Bieren, vorzüglich bey sitzender Lebensweise, wobey ohne die Ernährung der organischen Gebilde kräftig zu fördern, nur die Masse des Blutes vermehrt wird, sich dann vorzüglich in den Venen (den eigentlichen Reservoirs der Blutmasse) anhäuft, und daher nun, so wie mancherley andere Blutflüße auch die zu reichliche Menstruation erzeugt. 2) Aeußere Einflüße, welche durch Erregung der Nerven der Sexualorgane den stärkern Blutandrang nach denselben veranlassen, wohin a) psychische Reitze gehören, als häufiger Umgang mit dem andern Geschlecht, Romanenleserey und schlüpfrige Phantasien; b) eigentliche Geschlechtsreitze, durch vielfache Ausschweifungen; c) Reitzungen der Geschlechtsorgane durch erhitzende Bewegungen, z. B. Tanzen, oder erhitzende, gewürzte oder spirituöse Speisen und Getränke; d) Mißbrauch erhitzender diätetischer und arzneylicher Mittel, innerlich oder äußerlich (als Injektionen, sehr warme reitzende Bäder, Dampfbäder, Kohlentöpfe u. s. w.) angewendet; e) endlich die Stimmung der Atmosphäre, nämlich sehr heiße Temperatur, trockne Kälte, Frühlings- und Herbstzeit. 3) Gehören hierher äußere, den regelmäßigen Blutlauf der Unterleibsorgane beschränkende Einwirkungen, namentlich zu fest anliegende Kleider, Einschnüren des Leibes u. s. w.

§. 196.

Es ist ferner von dem Gange, welchen dieser krankhafte Zustand nimmt, von den für das allgemeine Befinden zu befürchtenden Folgen und der hieraus sich ergebenden Prognose zu sprechen, wobey denn leicht zu erkennen seyn wird, daß alles dieses nach der verschiedenen Entstehung und Begründung des Uebels verschieden seyn müsse. Man findet

nämlich, daß, wo eine starke reproduktive Thätigkeit, welche in den Geschlechtsorganen vorherrscht, verbunden mit zu reichlicher Diät und weniger Körperbewegung, das Uebermaaß in der Menstrualfunktion veranlaßt, die Wirkungen derselben zuvörderst eher wohlthätig als nachtheilig erscheinen, allein daß bey sehr häufiger Wiederkehr so starker Ausscheidungen die Uteringefäße sich erweitern, erschlaffen, und, indem diese habituell gewordenen Ausleerungen auch ohne allgemeine reichlichere Bluterzeugung fortdauern (dann als sogenannte passive Blutungen), zuletzt allgemeine und örtliche Krankheiten, als Wassersucht, Gelbsucht, Auszehrung, Unfruchtbarkeit, Vorfälle und weißen Fluß herbeyführen, weßhalb denn hier also die Prognose vorzüglich auf die Dauer des Uebels Rücksicht zu nehmen hat. — Noch leichter und schneller entstehen die erwähnten Zufälle jedoch, wenn die übermäßige Menstruation mehr durch Vorwalten der Sensibilität der Geschlechtsorgane, und durch äußere die Reitzbarkeit krankhaft erhöhende Einflüße (§. 195. 2.) erzeugt worden war, als unter welchen Umständen Schwäche des Muskularsystems, Sinken der assimilativen Funktion, Ueberhandnehmen der Reitzbarkeit entsteht und so zu Nervenzufällen, Gemüthskrankheiten u. s. w. der Weg gebahnt ist.

§. 197.

Ist ferner die allzureichliche Menstruation Folge einer durch zu häufige Wochenbetten u. s. w. verursachten Atonie der Uteringefäße, so werden die im vorigen Paragraph erwähnten Beschwerden nur um so rascher sich einstellen, ja dem Leben endlich gefährlich werden können; und es gilt dasselbe auch dann, wenn dieser Blutverlust durch organische Verbildungen (§. 194. 3.) erzeugt wird, wo, obgleich hier der Blutfluß eigentlich nur Symptom einer andern Krankheit ist, doch das Sinken allgemeiner Reproduktion, welches an und für sich schon diese Krankheiten begleitet, dadurch nur noch mehr beschleunigt wird. Was endlich die Fälle betrifft, wo diese Abnormität der Menstrualfunktion durch Krankheiten anderer und vorzüglich der Unterleibsorgane bedingt wird, so richtet sich hier Verlauf und Prognose wieder ganz nach die-

sen ursachlichen Krankheitszuständen, und es ist nur zu erwägen, daß eine längere Dauer dieses Blutverlustes theils die Geschlechtsorgane selbst zu andern Krankheiten disponirt, theils die Zerrüttung des Allgemeinbefindens immer mehr beschleunigen müsse.

§. 198.

Indem wir nun ferner die rechte Art der Behandlung übermäßiger Menstrualfunktion erwägen, ist wieder zunächst darauf aufmerksam zu machen, daß man nicht übersehe, wie gewöhnlich auch dieser Zustand blos Produkt oder Symptom einer allgemeinen Verstimmung sey, und wie wenig daher auch hier bloßes Zurückhalten des Blutes Absicht eines ächten Heilverfahrens seyn könne. Alle Mittel folglich, welche durch Contraktion der Uteringefäße oft plötzlich eine bedeutende Blutergießung zu hemmen vermögen, werden auf die Fälle eingeschränkt bleiben, wo die Menstruation in wahre Hämorrhagie übergeht, und werden daher auch erst bey dieser Krankheit näher durchgegangen werden *). — Um so mehr ist dagegen auf Lebensordnung und Diät Rücksicht zu nehmen, diese so mächtigen Mittel in der Hand des auch außer dem Receptbuche noch Heil suchenden Arztes **), und wir finden daher schon von Astruc (wie denn überhaupt die französischen Aerzte dieses Feld der Heilkunde stets auf lobenswerthe Art berücksichtigten) und neuerlich von Siebold die diätetischen Regeln in der Behandlung dieses krankhaften Zustandes obenan gestellt, welches ja wohl eigentlich überall geschehen sollte, indem diese allgemeinsten Einflüße ja die Bedingungen des Lebens enthalten.

§. 199.

Allgemein kann es daher hier zur Regel gemacht werden: 1) heftige, anstrengende Bewegungen des Körpers und

*) Wie nachtheilig z. B. die Kälte hier wirken kann, beweisen mehrere Beispiele von Personen, die, um eine starke Menstruation zu beseitigen, kalte Waschungen oder Bäder anwandten, und darauf in Metritis, Nymphomanie und ähnliche Zustände verfielen.

**) M. s. hierüber ein Wort zu seiner Zeit von Rust in dessen Magazin f. d. ges. Heilkunde. IV. Bd. 2s Hft.

des Gemüths zu vermeiden; 2) erhitzender, spirituöser oder gewürzter Getränke und Speisen sich zu enthalten; 3) keine engen einzwängenden Kleidungsstücke zu tragen; 4) sich dagegen an kühles Verhalten, leichte mehr vegetabilische Diät zu gewöhnen; 5) besonders große Mäßigkeit hinsichtlich der Geschlechtsbefriedigung zu beobachten, und 6) vor, in und nach der Menstruationsperiode mehr die horizontale Lage anzunehmen. — Ueberhaupt also die §. 195. genannten veranlassenden Ursachen zu vermeiden.

§. 200.

Die medicinische Behandlung hingegen wird namentlich die Beseitigung der innern Verstimmungen, welche diese zu starke Ausscheidung bedingen, zu bewirken suchen, und in sofern bey verschiedenen Fällen verschieden seyn; ist daher überhaupt eine reichliche Stofferzeugung vorhanden und mit vorherrschender produktiver Thätigkeit der Uteringefäße verbunden, so wird zwar hier die stärkere Blutausscheidung für den Augenblick selbst heilsam werden und nicht zu stören seyn, allein um fernern Nachtheilen vorzubauen, ist sodann nöthig, außer einem streng antiphlogistischen Regimen, von gelinden Abführmitteln (aus Mittelsalzen, Pulpa Tamarindorum u. s. w.) Gebrauch zu machen, ja es können vorzüglich Anfangs der Behandlung selbst allgemeine Blutentleerungen mit dem günstigsten Erfolge angewendet werden; es muß ferner, außer der Periode, durch geregelte angemessene Bewegung für Unterhaltung einer gelinden Transspiration und Verarbeitung der assimilirten Stoffe gesorgt, beym Herannahen der Periode aber der Gebrauch des Nitrums und der vegetabilischen Säuren empfohlen werden.

§. 201.

Ist es hingegen mehr allgemeine und örtlich aufgeregte Sensibilität, welche die profuse Menstruation hervorrief, so müssen die weitern, häufig in der Lebensart allein liegenden Ursachen, von welchen dieses abhängt, aufgesucht und möglichst beseitigt werden, als eigentliche Heilmittel aber dienen dann innerlich die rein bittern Mittel, Extrakte, China, Eisen,

welche namentlich außer den Perioden, und bey stätiger Rücksicht auf die regelmäßige Funktion des Darmkanals angewendet werden müssen; ferner zur Zeit des Eintritts der Periode das verdünnte Acidum vitrioli mit Himbeersaft zum Getränk, auch wohl unterstützt durch die Wirkung stärkerer antispasmodischer Mittel, z. B. des Dowerschen Pulvers. Aeußerlich wirken in den Zwischenräumen der Perioden kühle, mit Hb. absinthii u. s. w. versetzte, oder eisenhaltige Bäder, kaltes Waschen der Geburtstheile, Tragen von Gürteln mit bittern Rinden- oder Kräuterpulvern gefüllt, der Genuß einer reinen und mehr kühlen Luft, unter zweckmäßiger, die Erhitzung der Phantasie ableitender Beschäftigung, vorzüglich wohlthätig. In der Periode ist vollkommne Ruhe Pflicht. Zugleich ist übrigens Sorgfalt für Unterstützung der Reproduktion nicht zu übergehen, theils weil außerdem leicht die Schwäche und Reitzbarkeit bey dem übermäßigen Säfteverlust auf einen gefährlichen Grad steigt, theils weil eine kräftiger werdende Reproduktion schon an und für sich die zu große Reitzbarkeit mindert. Man ordnet daher (außerdem, daß schon die obgedachten Tonica die Reproduktion unterstützen) eine leicht verdauliche Diät von Bouillon, Sago, Gries, Eyern an, läßt in den Zwischenzeiten der Periode einen kräftigen alten Rheinwein in angemessenen Dosen gebrauchen und empfiehlt Aufheiterung, Landluft u. s. w.

§. 202.

Ist hingegen wahre Atonie der Uteringefäße Krankheitsursache, so müssen die im vorigen Paragraph angezeigten Mittel mit Ausnahme der Antispasmodicorum, und nach den Umständen in verstärkter Gabe und mit mehr flüchtig reitzenden Stoffen vermischt gegeben werden, wobey übrigens stets wieder der Zustand allgemeiner Ernährung die erste Rücksicht verdient, indem wir leicht bemerken können, daß diese Zustände am gewöhnlichsten bey ältlichen phlegmatischen Körpern, deren Verdauung schlecht von Statten geht, welche zu Obstruktionen und Wassersuchten geneigt sind, vorkommen, und sich, wo sie ganz rein durch örtliche Ursachen in einem übrigens kräftigen Körper veranlaßt wurden, gemeinhin auch

sehr bald, ja ohne alle ärztliche Hülfe, verlieren. — Außer den Perioden werden also, nach Berücksichtigung des Zustandes im Darmkanal, die Auflösungen der Extrakte in aromatischen Wässern, die Decokte der China mit geistigen Tinkturen, oder die weinigten Infusa derselben, wie auch die Eisenpräparate verordnet, geistige Einreibungen in die regio hypogastrica und ossis sacri angewendet, eisenhaltige oder aromatische Bäder gebraucht; zur Zeit der Periode hingegen die mehr contrahirenden Mittel, als z. B. Acidum Halleri, Acidum phosphori (zu 15 — 20 Tropfen in einem schleimigen Vehikel) ja selbst bey stärkern Blutergießungen die T. Cinnamomi in Gebrauch gezogen; im Allgemeinen endlich wird die Bildungsthätigkeit durch eine kräftige nahrhafte Diät unterstützt.

§. 203.

Endlich ist denn aber auch die profuse Menstruation reines Symptom anderer Krankheiten, und zwar theils des Uterus, theils benachbarter Organe, und dann kann es an und für sich einer weitern ärztlichen Behandlung nicht unterworfen seyn, außer daß während der Periode die obigen Regeln (§. 199.) beobachtet werden müssen, und daß bey zu heftigem Blutabgange zuweilen von innerlich oder äußerlich anwendbaren, die Contraktion der Gefäße bewirkenden Mitteln (s. davon bey der Metrorrhagie) Gebrauch zu machen ist. — Vorzüglich sind es die mancherley Unterleibskrankheiten, welche nur zu häufig als Quelle dieser und ähnlicher Störungen der Menstruation zu betrachten sind, und eben weil man hier so oft das Symptom für das Wesentliche nimmt, und, indem man durch Ueberhäufung mit sogenannten Stärkungsmitteln den Blutfluß hemmt, die Obstruktionen, Auftreibungen u. s. w. nur noch vermehrt, müssen wir wiederholt auf das Unzweckmäßige solcher Behandlung aufmerksam machen.

§. 204.

Den Unterschied übrigens zwischen sehr starker und sehr häufiger Menstruation kann in der Regel die Behandlung nur in sofern berücksichtigen, als er insbesondre auf das größere

oder geringere Vorherrschen des Nervensystems gegründet, und daher im Allgemeinen bey der erstern Form mehr die das Gefäßsystem, bey der zweiten Form mehr die die Sensibilität in Anspruch nehmende Heilmethode angezeigt ist.

D. Hemmung oder Unterdrückung der Menstrualfunktion (Menses suppressi s. obstructi).

§. 205.

Wenn die organische Thätigkeit, deren Produkt die Menstruation ist, durch irgend eine Umstimmung des allgemeinen Lebens, und zwar zu einer Zeit, wo sie im Normalzustande fortwährend wirksam seyn sollte, sich zu äußern aufhört, so begründet dieß den Zustand der sogenannten Unterdrückung der Menstruation, von welcher also das Aufhören der Menstruation in der Schwangerschaft, so wie beym Erlöschen der Zeugungsfunktion allerdings und genau unterschieden werden muß, um so mehr da man, wenn man bey diesen Zuständen die Wiederherstellung der Menstruation zu bewirken versuchen wollte, dieß zum großen Nachtheil des Körpers geschehen würde. Allein noch außerdem kann die Menstruation zuweilen verschwinden, und dieß, obwohl es in Folge eines Krankheitszustandes geschieht, doch an und für sich mit dem Allgemeinbefinden so sehr in Uebereinstimmung seyn, daß ebenfalls ein Heilverfahren, welches unmittelbar auf Herstellung dieser Funktion gerichtet wäre, nachtheilig werden müßte; und es ist dieses namentlich dann der Fall, wenn die allgemeine bildende Thätigkeit nicht in dem Grade energisch ist, um den auf das Geschlechtssystem gerichteten Ueberfluß zu erzeugen, welches denn z. B. in acuten und chronischen Krankheiten, bey anderweitigem Säfteverlust durch Eiterungen, anhaltendes Schwitzen (etwa bey Personen, welche in starker Sommerhitze arbeiten) bey sehr dürftiger Kost und Lebensweise, in der Reconvalescenz u. s. w. bemerkt wird. Immer also wird dieses Hemmen der Menstrualfunktion um so krankhafter seyn, je mehr der Körper im Allgemeinen für das Ausüben dieser Funktion geeignet war, und je plötzlicher dieses Mißverhält-

niß der Geschlechtsfunktion zum Allgemeinbefinden herbeygeführt wurde.

§. 206.

Die Ursachen nun betreffend, durch welche diese Störung herbeygeführt werden kann, so gehören dahin theils als geneigt machende: ein hoher Grad allgemeiner und örtlicher Reitzbarkeit, Neigung zu Congestionen nach andern Organen, so wie Verstimmung des Lymphsystems und der Verdauungswerkzeuge; theils als veranlassende Ursachen, alles, was einen krampfhaften Zustand der Uteringefäße oder des Muttermundes, ja Entzündungszustand desselben zu veranlassen vermag, wohin denn wieder theils allgemeine, theils örtliche Einwirkungen gerechnet werden müssen, z. B. heftige Gemüthsbewegungen, Schreck, Aerger, andere gewaltsame Erschütterungen des Nervensystems, z. B. durch Elektricität *) ferner erhitzende Arzneymittel, Speisen oder Getränke **) vorzüglich aber Erkältungen, namentlich der untern Extremitäten oder der Geschlechtstheile selbst, durch kalte Bäder oder kaltes Waschen, reitzende Injektionen, Geschlechtsreitz u. s. w. — Endlich kann aber die Menstrualfunktion auch gehemmt werden durch andere Krankheiten des Geschlechtssystems, als Entzündung, Skirrhus, Steatomata, Polypen u. s. w.

§. 207.

Der Krankheitsverlauf oder die Folgen der plötzlichen Hemmung der Menstrualfunktion, und die sofort sich ergebende Prognose, sind wiederum nach den verschie-

*) So ist mir ein Fall bekannt, wo bey einer acht und zwanzigjährigen Frau, indem sie, um bey einem kranken Kinde die Elektricität anwenden zu lassen, dieses auf dem Schooße hielt, und sich folglich so dem elektrischen Strome mit aussetzte, in dieser Behandlung aber, obwohl gesund, zwei Monathe hindurch, und auch während der Regeln verblieb, plötzlich die Menstruation verschwand, nie wiederkehrte, dagegen aber Gicht zur Folge hatte.

**) Jos. Frank erzählt einen Fall, wo durch Wein und Beyschlaf die eben fließende Menstruation verschwand und Metritis veranlaßt wurde (s. dessen Acta instituti clinici Vilnens. Lipa. 1808.).

denen Entstehungsarten dieses Krankheitszustandes sehr verschieden. Daß nämlich, wo die Menstruation in Folge allgemein geschwächter Ernährung sich verliert (§. 205.) dieses Verlieren an und für sich betrachtet, eher vortheilhaft als nachtheilig seyn müsse, ergiebt sich leicht von selbst, und das Urtheil des Arztes wird also blos jene allgemeinen Zustände nach ihrer besondern Natur zu erwägen haben. Dasselbe gilt auch bey anderweitigen Krankheiten der Geschlechtsorgane, als Scirrhus uteri u. s. w. Ueberhaupt verschwinden hierbey die Regeln nicht leicht so plötzlich, sondern verlieren sich nach und nach. Wo hingegen aus dem Zusammentreffen der erwähnten innern und äußern Ursachen diese Funktion allein gestört wird, brechen theils örtliche, theils allgemeine Krankheitszustände bald hervor, deren Charakter, jenachdem mehr das Gefäßsystem oder das Nervensystem überwiegt, entweder in der Form von Entzündung und Fieber, oder in der Form der Krämpfe erscheinen wird. Im erstern Falle, und vorzüglich nach stark und schnell wirkenden äußern Ursachen entstehen daher stechende Schmerzen im Uterus, es entwickelt sich Metritis, es erscheinen heftige Congestionen nach andern Organen, Fieber verschiedener Art, und bey anhaltender Unterdrückung können sich vicarirende Blutflüße, Wassersuchten, Verbildungen der Geschlechtsorgane, Gemüthskrankheiten, Auszehrungen, Bleichsucht u. s. w. entwickeln; oder im Gegentheil bilden sich krampfhafte Verschließungen des Muttermundes, wobey das Blut zwar noch ausgeschieden, aber nicht ausgeleert werden kann, dann oft in der Gebärmutterhöhle sich coagulirt, in oft halb und halb organische Bildung annimmt*); oder es tritt eine krampfhafte Verschließung der ausscheidenden Gefäßmündungen selbst ein, das Blut treibt (vorzüglich bey schlaffem Habitus und Neigung zu Venenerweiterungen) die Venen des Fruchthälters auf, und

*) Bey einer Dame, wo wegen längere Zeit unterdrückter Menstruation bereits Schwangerschaft vermuthet worden war, ging endlich eine Masse solchen geronnenen Blutes ab, welche wegen ihrer ganz fleischartigen Bildung von der Hebamme anfänglich für den Arm eines Kindes gehalten wurde.

heftige Kreuzschmerzen, Druck auf benachbarte Organe u. s. w sind die Folge davon; oder endlich es treten auch sogleich heftige krampfhafte Schmerzen der Unterleibseingeweide, Brustkrämpfe, ja Zuckungen und wirkliche epileptische Anfälle oder Lähmungen ein. Die Heftigkeit aller dieser Zufälle und die Dauer der Unterdrückung richtet sich vorzüglich nach der mehr oder minder reichlichen Bluterzeugung, nach dem Grade der Reizbarkeit und der Heftigkeit der einwirkenden Ursachen, daher man denn bey kräftigen, wenig erregbaren Naturen oft diese krankhaften Zustände sich ganz allein und bald wieder ausgleichen sieht, dahingegen unter andern Verhältnissen allerdings oft nur schwierig und langsam der Normalzustand zurückgeführt werden kann.

§. 208.

Bey der nunmehr zu erwägenden Behandlung ist aber wieder zuvörderst zu erinnern, daß man auch hier nicht etwa blos das zurückgehaltene Blut, sondern die Störung einer aus allgemeiner organischer Thätigkeit sich ergebenden wichtigen Funktion berücksichtige, indem das erstere leicht zu einer sehr oberflächlichen Behandlung verleiten würde, und z. B. eine künstliche Blutentziehung allein, keineswegs die Blutsecretion des Uterus ersetzt, ja man oft sogar mit erhitzenden blutreibenden Mitteln in diesen Zuständen Mißbrauch treiben sieht, als welches doch bey Entzündungen u. s. w. den größten Nachtheil herbeyführen muß. Eine vernünftige Behandlung wird demnach auch hier zunächst das Allgemeinbefinden ins Auge fassen, überzeugt, daß, wenn dieses geregelt ist, auch die örtliche Thätigkeit zur Norm zurückkehren müsse, und unter einfacher Hinleitung bald zurückkehren werde. — Es ergiebt sich hieraus, daß, wenn blos starke Ausleerungen oder geschwächte Bluterzeugung die Unterdrückung veranlaßte, gar keine unmittelbar auf Wiederherstellung der Menstruation gerichtete Behandlung weiter Statt finden könne, sondern blos die Unterstützungsmittel der Reproduktion überhaupt, durch Verbesserung der äußern Lebensverhältnisse u. s. w. angezeigt seyen, und daß, bey allgemeinen oder örtlichen Krankheiten, in sofern sie Ursache, nicht Folge dieser Abnormität sind, diese

ebenfalls ganz abgesehen von der Verhaltung der Menstruation behandelt werden müssen.

§. 209.

Was dagegen die heftigern Zufälle betrifft, welche nach plötzlicher Hemmung der Menstruation eintreten können, so fordern auch diese zunächst blos die ihrer Eigenthümlichkeit angemessene Behandlungsweise; Entzündungen, fieberhafte Krankheiten, heftige Congestionen, machen daher Blutentziehungen, Nitrum, abführende Mittel, kühlende Diät und Regimen nothwendig, jedoch so, daß man zugleich mit auf die Art der äußern einwirkenden Schädlichkeiten Rücksicht nimmt, und also nach heftigen Erkältungen und bey rheumatischer Natur der Zufälle, ein diaphoretisches Verhalten, ähnliche Arzneymittel, Friktionen und warme trockene Fomentationen der leidenden Theile zu Hülfe nimmt. Hinwiederum nöthigen heftige Nervenzufälle, welche sich gewöhnlich mit Erethismus des Gefäßsystems verbinden, zu lauen Bädern, Lavements von Chamillen und Valeriana, beruhigenden warmen nassen Fomentationen und Cataplasmaten, innerlich aber zur Anwendung der Emulsionen, der Valeriana, des Dowerschen Pulvers, des Liq. C. C., und rücksichtlich der Aufreitzung des Gefäßsystems, der mineralischen Säuern, womit denn übrigens auch das diätetische Verhalten durch möglichste Beschränkung aller äußern Reitze in Uebereinstimmung zu bringen ist.

§. 210.

Nachdem aber auf diese Weise die allgemeinen Stürme gemäßigt worden, hat man zu beobachten, in wie weit der Körper geneigt sey, die Wiederherstellung der gehemmten Funktion durch eigene Kraft zu übernehmen. Oft nämlich ist unter jener allgemeinen Behandlung bereits die Menstruationsperiode vorübergegangen, alle Beschwerden verlieren sich jetzt, und dann ist es hinreichend, zur Zeit der Wiederkehr dieser Periode die Erregung des Uterinsystems durch Fußbäder, warme Bekleidung der untern Extremitäten, mäßige Körperbewegung und einige Tassen Melissenthee zu unterstützen. Oder aber, es bleibt auch nach beruhigten allgemeinen Zufällen Auftrei-

bung des Uterus, schmerzhafte Spannung in der Gegend desselben zurück, es zeigen sich andauernde Erregungen der Blutmasse gegen andere Organe, Neigung zu stellvertretenden Blutungen u. s. w.; dann untersuche man näher, ob vielleicht krampfhafte Verschließung des Muttermundes vorhanden sey, welches theils die Disposition, theils die geburtshülfliche Untersuchung erkennen lehrt, in welchem Falle dann Injectionen von Valeriana, Hyoscyamus und ähnlichen Aufgüßen, Chamomillen-Halbbäder, Cataplasmata auf die regio hypogastrica, Einreibungen des flüchtigen Liniments mit Tr. opii vermischt, innerlich die Tr. Valerian. Lent., Tr. Castorei, das Laudan. liq. in angemessenen Gaben und Formen Nutzen bringen. Oder aber es zeigt sich bey schlaffer Faser und phlegmatischem Habitus, die Auftreibung des Uterus abhängig von Stockungen des Blutes in den Venengeflechten desselben, womit sich häufig die Auftreibung der Hämorrhoidalgefäße verbindet, und dann sind namentlich wiederholte blande Abführungen, Blutigel an das Perinäum, Fußbäder mit Senf oder Salz geschärft, flüchtig reitzende Einreibungen in die regio hypogastrica und ossis sacri angezeigt; seltner, und und nur bey besonderer Torpidität, werden denn auch die eigentlich sogenannten Emmenagoga, die Aloe, das Gum. Ammoniacum, das Decoct. sabinae angewendet werden müssen. — Ein dem obigen ähnliches Verfahren wird Statt finden, wenn bey vorläufig zwar beseitigten Beschwerden, doch in der nächsten Periode die Menstruation nicht wieder eintritt, vielmehr andere krankhafte Zustände sich ausbilden, in welcher Hinsicht wir dann auch theils auf die Behandlung der verzögerten Menstruation (§. 160—68.), theils auf die Behandlung der aus ungewöhnlichen Quellen fließenden (§. 187. 195.) verweisen können.

a. Besondere durch Unregelmäßigkeiten der Pubertätsentwicklung begründete Krankheitszustände.

§. 211.

Wie wir im Vorigen bemerkt haben, liegen in den mannigfaltigen Störungen der Menstrualfunktion die Bedingungen zu den verschiedenartigsten Krankheitsformen oder Aeußerungen

des Krankseyns, die meisten derselben sind indeß so eng an jene ursachlichen Abnormitäten geknüpft, daß wir sie als bloße Symptome derselben betrachten durften; andere hingegen bilden so merkwürdige in sich gleichsam zu einem Ganzen geschlossene Gruppen krankhafter Zufälle, daß sie eine ihnen insbesondre gewidmete Betrachtung fordern können. — Es gilt dieses vorzüglich von gewissen Zuständen, deren Entstehung namentlich vorbereitet wird durch allgemeine Veränderung des weiblichen Organismus, Veränderungen, welche eben sowohl den Grund der Menstrualfunktion selbst und ihrer Abnormitäten enthalten, und daher vorzüglich der Entwicklungsperiode der Pubertät angehören. So wie nämlich das Erscheinen der Menstruation, gleich der Ausbildung der Körperform und der Entfaltung der weiblichen Gemüthseigenthümlichkeit, Ergebnisse einer und derselben innerlich schaffenden Kraft darstellen, so können Hemmungen dieser innern Bildungsthätigkeit auch zugleich durch unvollkommne Menstruation und Unvollkommenheiten anderer Funktionen sich aussprechen, ohne daß gerade das eine als der Grund des andern, sondern das Allgemeine als der Grund dieser verschiedenen Besondern anzusehen, sonach aber auch das besondere Aufstellen anderer Entwicklungskrankheiten neben den Abnormitäten der Menstruation gerechtfertigt ist. — Warum nun aber gerade Störungen der innern Entwicklungsthätigkeit in gewissen Perioden des Lebens häufiger als in andern bemerkt werden, ergiebt sich leicht, wenn wir bedenken, daß, obwohl diese Thätigkeit nie ruht, und der Körper nur in wiefern er im Bilden begriffen ist, existirt, sie doch Zeiträume erkennen läßt, wo durch Hervortreten oder Zurücktreten einzelner Organe und Funktionen das innere Verhältniß der Organisation in kurzem umgewandelt wird. Eben darum müssen nun aber auch (da das Produkt immer verändert wird, es mag nun blos der innere oder der äußere Faktor verändert worden seyn) alle äußern Einflüße auf den veränderten Organismus anders wirken, ihm gleichsam fremdartig geworden seyn, woher denn z. B. die Erregbarkeit der Jugend überhaupt erklärlich wird, indem hier, da die innern Zustände schnell wechseln, und alles Aeußere neu und stark eingreift, auch Krankheiten, durch zu heftige Einwirkung von irgend einer Seite, so häufig und in so verschiedenen Formen entstehen.

§. 212.

Im vorigen Abschnitte betrachteten wir aber zunächst, wie in demjenigen Systeme, auf dessen Entwicklung die Thätigkeit des jugendlichen weiblichen Körpers vorzüglich gerichtet ist, nämlich im Geschlechtssysteme und der ihm eigenthümlichen Menstrualfunktion mehrfache Störungen eintreten können, jetzt haben wir nun von einigen krankhaften Verstimmungen in den allgemeinen Thätigkeiten zu sprechen, welche, obwohl sie theils minder häufig als jene sind, theils (wie schon oben an mehrern Orten bemerkt worden ist) sich mit jenen Verstimmungen der Menstrualfunktion verbinden können, doch nicht minder merkwürdig sind, ja zum Theil die sonderbarsten Erscheinungen darbieten. Wir unterscheiden aber diese Zufälle, je nachdem sie sich in der einen oder der andern Sphäre des Organismus darstellen, in die der Bildungsthätigkeit anheim fallenden, wohin die durch unvollkommne Blutbereitung merkwürdige Bleichsucht gehört, und in die der animalen Sphäre zugehörigen, wohin die Verstimmungen und Exaltationen der Sinnesthätigkeit (krankhafte Empfindungen) die Regelwidrigkeiten der Bewegungsthätigkeit (Lähmungen und Krämpfe) so wie die Verstimmungen und ungewöhnlichen Zustände des innern Nervenlebens (Somnambulismus, Verzückung, Gemüthskrankheiten u. s. w.) zu rechnen sind.

I.

Verstimmung der Reproduktion während der Pubertätsentwicklung.

Bleichsucht (Chlorosis).

§. 213.

Beobachten wir den menschlichen Körper in seinen frühesten Lebenszuständen, so bemerken wir an demselben, namentlich während seines Lebens im Uterus eine reißend schnelle Entwicklung, ein Wachsthum, welches (wie z. B. in den ersten Monathen der Schwangerschaft) den Leib des Embryo in wenigen Tagen um das Doppelte vergrößert. Späterhin

nach der Geburt ſehen wir dieſes Wachsthum mehr und mehr ſich verlieren, ja endlich ſtillſtehen, und zwar gehindert durch das Hervortreten von Funktionen, welche anſtatt, wie im frühern Leben faſt Alles, die Reproduktion zu unterſtützen, ihr vielmehr entgegenwirken, wohin denn namentlich theils das mehr entwickelte animale Leben, theils die ausgebildetere Reſpiration und ſtärkere Abſonderung, theils die Entwicklung des Geſchlechtsſyſtems gehört *). Dem Gange der Natur nach ſoll nun die treibende Kraft des Wachsthums in eben dem Maaße allmählig vermindert werden, als die aſſimilative Thätigkeit ſich verringert, allein bey irgend einer Verſtimmung des Organismus, namentlich wo durch unzweckmäßige Diät und ſonſtige Lebensweiſe die Thätigkeit des lymphatiſchen Syſtems gelitten hat, tritt denn auch leicht ein Mißverhältniß zwiſchen Ernährung und Wachsthum ein, wo bald das eine, bald das andere ein krankhaftes Uebergewicht erhalten kann. Am meiſten aber der Natur zuwider und daher auch am ſeltenſten vorkommend iſt das Uebergewicht der Ernährung über das Wachsthum, woraus die in einzelnen Fällen ſchon bey Kindern **), häufiger aber ſpäterhin ſich bildenden ungeheuren Fettanhäufungen abzuleiten ſind; weit öfterer hingegen, als dem Weſen dieſer Periode näher liegend, bemerken wir das Uebergewicht des Wachsthums über die Ernährung, und daher denn das Abmagern, die Störungen des Gemeingefühls, die Verſtimmungen des Gemüths, welche ſo häufig bey raſchem Wachsthum in den der Pubertät nahen Jahren bemerkt werden, ja ſogar wie auch H. Oſiander ***) anführt, zum Theil bey Thieren, z. B. Pferden, Affen u. ſ. w. vorkommen.

---

*) S. darüber ein Mehreres in meinem Aufſatze über das Verhältniß der Reproduktion in Meckel's Archiv f. Phyſiol. II. B. 2s Hft.

**) Salzburger med. chir. Zeitung. 1810. II. Bd. S. 63 wird das Beyſpiel eines Kindes angeführt, welches zu Straßburg gezeigt wurde, noch nicht 5 Jahre alt war und 208 Pfund wog, bey einem Körperumfange von 48 Zoll.

***) S. deſſen Schrift über die Entwicklungskrankheiten des weibl. Geſchlechts. 1r Bd. S. 4.

§. 214.

Was nun aber zunächst das weibliche Geschlecht betrifft, so finden wir bey den meisten weniger kräftigen Individuen in der Periode, wo das Wachsthum des Körpers ziemlich beendigt ist, daß auch ohne eigentliche Störung des Wohlbefindens, doch eine blaßere Hautfarbe, Müdigkeit, eine mehr melancholische Stimmung, mangelnder Appetit u. s. w. diese wichtige Epoche bezeichnen, und merkwürdig ist zugleich die Neigung zu Krankheiten, welche, obwohl sie dem weiblichen Geschlecht keineswegs ausschließend eigenthümlich sind, doch insbesondre auf abnormes Hervortreten der der Reproduktion entgegenwirkenden Funktionen sich beziehen, wohin denn vorzüglich die Brustkrankheiten und namentlich die so vielen Jungfrauen verderblichen Lungenschwindsuchten *) gehören. Allein auch ohne solche organische Zerstörungen erreichen zuweilen die erwähnten in Folge körperlicher Entwicklung eintretenden Beschwerden eine krankhafte Höhe (ohngefähr eben so wie die Molimina Menstruationis zuweilen krankhaft werden) und begründen so oft eine Reihe von Erscheinungen, welche wir unter dem Namen der Bleichsucht, Jungfernkrankheit, des blassen Fiebers (Icterus albus) zusammenfassen.

§. 215.

Man bemerkt aber an Personen, welche an dieser Krankheit leiden: weiße, kreidenhafte, oft auch ins graue oder grünlichte fallende (daher Chlorosis, von χλωρός, grün) Gesichtsfarbe, mit bläulichten Rändern um die Augen und blassen bläulichten Lippen, meist eine trockene, gedunsene oder wirklich ödematöse Haut, verminderte Temperatur, belegte Zunge, gestörten Appetit, zuweilen auch wohl mit eigenen Gelüsten zu ungenießbaren Dingen, wie Erde u. s. w. verbunden. — Ferner schlechte Verdauung, Ueblichkeiten, Säureerzeugung, Magendrücken, Blähungsbeschwerden, Unordnung in den Stuhlausleerungen, blaßen wäßrigen Urin,

*) S. über diese Krankheit junger Mädchen vorzüglich H. Osianders interessante Bemerkungen a. a. O. Thl. 2. S. 124.

gespannten Leib. Rücksichtlich des Gefäßsystems bemerkt man einen kleinen, zuweilen langsamen, zuweilen aber auch fieberhaften und frequenten Puls, seltener Neigung zu Congestionen oder periodischen Blutungen aus ungewöhnlichen Organen *). Die animalen Funktionen betreffend, so zeigt sich allgemeine Mattigkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Schläfrigkeit, und doch oft unruhiger ängstlicher Schlaf, melancholische Gemüthsstimmung durch häufiges Weinen und weniges Sprechen bezeichnet, ja es bilden sich zuweilen fixe Ideen, oder der Zustand geht sogar in Wahnsinn über. Das Geschlechtssystem ist hierbey gemeiniglich ebenfalls in seinen Verrichtungen gehemmt, die Menstruation (als das Produkt allgemeiner Bildungsthätigkeit) erscheint folglich insgemein nicht, oder ist mißfarbig, selten und spärlich; ja die Organe selbst sind oft nur unvollkommen entwickelt, Brüste und Uterus sehr klein, und der Geschlechtstrieb mangelt entweder völlig, oder ist krankhaft aufgereizt und erhöht.

§. 216.

Ueber die Ursachen der Bleichsucht ist man stets sehr verschiedener Meynung gewesen, namentlich indem man die sogenannte nächste Ursache derselben bestimmen wollte **). Nun ist aber unter der nächsten Ursache nichts anders als die Krankheit selbst, ihrem Wesen nach, in wiefern dieses Wesentliche den Grund der äußerlich wahrnehmbaren Symptome enthält, zu begreifen (weßhalb auch jene Benennung, wie neuerlich von mehrern Seiten erinnert wurde ***), un-

*) So ist mir ein Fall bekannt, wo ein bleichsüchtiges Mädchen, bey welchem die Menstruation noch gar nicht erschienen war, mehrere Jahre stets in der Frühlingszeit einen starken Hämorrhoidalblutfluß bekam; eine andere litt in der Herbstzeit an Blutbrechen.

**) So sagt z. B. v. Siebold (Handb. d. Frauenzimmerkrankheiten. Th. 1. S. 281.): „Die Bleichsucht ist eine Krankheit der Reproduktion, und ihre nächste Ursache liegt in der so sehr gesunkenen Thätigkeit ihrer einen Seite der Produktivität." Allein was unterscheidet dann Bleichsucht von jedem andern atrophischen Zustand, von Auszehrung, Marasmus u. s. w.?

***) S. Heinroth Lehrb. d. Seelenstörungen. Thl. 2. S. 193.

passend ist); dieses Wesentliche selbst aber kann so wenig, als etwa das Leben überhaupt, als ein Besonderes für sich Bestehendes, von dem Organismus Trennbares nachgewiesen werden, sondern ist ein Begriff, in welchen die innern und äußern Faktoren des Krankheitsprozesses als Einheit, als Produkt aufgefaßt werden. — Das Wesentliche nun in der Bleichsucht betreffend, so ist es zunächst offenbar in eine Störung der bildenden Thätigkeit zu setzen; denn daß die Störungen der animalen Funktionen hierbey nur secundär sind, ergiebt sich sehr leicht. Allein, noch genauer, die Störung der Bildungsthätigkeit zeigt sich namentlich im eigentlichen Heerde derselben, im Gefäßsystem und im Akt der Blutbereitung. Indem wir aber gestörtes Bildungsleben im Allgemeinen, und unvollkommne Sanguifikation insbesondre als das Wesen des chlorotischen Zustandes betrachten, ist doch noch zu bemerken, daß ein solcher Grund noch nicht allein das Eigenthümliche der Bleichsucht bestimmt (indem gestörtes Bildungsleben und unvollkommne Sanguifikation bey so vielen andern Krankheiten auch des männlichen Geschlechts, z. B. Scorbut, morbus maculosus u. s. w. bemerkbar ist), sondern, daß jene Mißverhältnisse, um in der Form der Chlorose zu erscheinen, zusammentreffen müssen a) mit der Individualität des weiblichen Körpers, welche auf überwiegende Produktivität gegründet ist, b) mit der Zeit der sich entwickelnden oder vor kurzem entwickelten Pubertät.

§. 217.

Die Art nun, wie Bildungsthätigkeit und Sanguifikation in ihren Beziehungen auf die Entfaltung des Geschlechtssystems gestört werden kann, ist zwiefach, nämlich: es leidet entweder die Gefäßthätigkeit ursprünglich, und zeigt sich zur Erregung der Menstrualfunktion, wie zur Unterhaltung individueller Reproduktion, unzulänglich, oder es findet die reproduktive Thätigkeit in ihrer Aeußerung, in ihrem Hinwirken auf das Geschlechtssystem Hindernisse, es bilden sich Stockungen, Venenerweiterungen, in Folge dessen leidet die Assimilation und Blutbereitung, und die Zufälle der Bleichsucht treten ein.

§. 218.

Was nun die entfernten Ursachen des chlorotischen Zustandes betrifft, so sind diese vorzüglich nach dem im vorigen Paragraph beygebrachten Theilungsgrunde in zwei Klassen zu bringen; zu der ersten gehören diejenigen, welche auf die allgemeine produktive Thätigkeit störend einwirken, als: 1) ungesunde Luft, Feuchtigkeit, Kälte, Mangel an Licht; 2) unzweckmäßige, schwer verdauliche, schlecht nährende Kost und erschlaffende Getränke (vorzüglich Uebermaaß in Thee und Kaffee); 3) Unthätigkeit oder übermäßige Anstrengung, Unreinlichkeit, Gram, zu früh erregter Geschlechtstrieb u. s. w., Einflüße, welche insgesammt die Wurzeln der Assimilation, die Unterleibseingeweide und das Lymphsystem angreifen, und besondere, so häufig der Bleichsucht vorausgehende Krankheitszustände, als Status pituitosus, Würmer, Obstruktion, oder Durchfall, ja Lienterie, Scrofeln, Wassersammlungen hervorbringen. 4) Andere Krankheiten und Einflüße, welche die Reproduktion schwächen, als Blutflüße, wohin auch die zu starke Menstruation gehört, Schleimflüße, typhöse oder intermittirende Fieber, welche eine sehr langsame Reconvalescenz zur Folge haben, anhaltende Eiterungen, unzweckmäßig angewendete Blutentziehungen oder Abführmittel. Zur zweiten Klasse hingegen rechnen wir die organischen Fehler, welche die Erscheinung der Regeln hindern oder ganz unmöglich machen, als: Verschließungen des Muttermundes oder der Scheide, unvollkommne Entwicklung des Uterus, oder Ausartung desselben oder der Ovarien (Zustände, welche vorzüglich durch zu zeitigen und unnatürlichen Geschlechtsreitz veranlaßt werden *)); endlich aber auch die Hemmungen der bereits entwickelten Menstrualfunktion durch gewaltsame Einwirkungen, als heftige Gemüthsbewegungen, Erkältungen u. s. w., oder plötzliche Entziehung eines zu Bedürfniß gewordenen Geschlechtsgenußes (daher die Krankheit auch zuweilen bey jungen Wittwen beobachtet wurde).

*) S. darüber Autenrieth Untersuchung ausgearteter Eyerstöcke in Meil's Archiv f. d. Phys. VII. Bd. 2s Hft.

§. 219.

Wir kommen nun zur Betrachtung des Krankheitsverlaufs, woraus sich denn zugleich die Prognose mit ergeben wird. Zunächst aber bemerken wir, daß die Krankheit häufig, und insbesondre wo sie bloße Folge rascher körperlicher Entwicklung ist, einen sehr gutartigen Charakter zeigt, und bald, vorzüglich nachdem die Menstruation wirklich erschienen, und in regelmäßigen Gang gekommen ist, wieder, ohne nachtheilige Folgen verschwindet; Fälle, bey welchen die Bleichsucht als wahre Uebergangsperiode erscheint und ganz den Molimibus der Menstruation verglichen werden kann, ja oft eines derselben mit ausmacht. Langwieriger und in ihren Zufällen beschwerlicher pflegt sie dagegen zu seyn, wenn die §. 218. erwähnten entfernten Ursachen der ersten Klasse auf einen schon von Anfang sehr reitzbaren und schwächlichen Körper in höherem Grade einwirkten, die Organe der Assimilation selbst bereits in ihrer Bildung umgeändert, die Gekrösdrüsen angeschwollen, die Verdauung zerrüttet ist; auch hier freylich wird die Bleichsucht nicht an und für sich gefährlich werden, allein sie macht den Uebergang zu andern Cacherien, es entsteht Haut-, Brust- oder Bauchwassersucht, es bilden sich fauligte oder lentescirende Fieber, es entstehen Eiterungen in den Geburtstheilen, scorbutische Blutungen, Gangrän, und durch diese Zufälle stirbt die Kranke. Etwas weniger ungünstig ist meistens der Verlauf, wenn die Ursachen zweiter Klasse, und also mehr vom Organ aus, die Krankheit erregten; die Zufälle sind hier oft mehr acuter Natur, Schwindel, Congestionen, Blutungen, werden hierbey häufiger beobachtet, diese Beschwerden indeß, wenn sie nur durch eine zweckmäßige Lebensweise geleitet werden, gleichen sich nach und nach wieder aus, vorzüglich wenn bereits die Menstruation früher im Gange gewesen ist. Nur wo die Verbildungen der Geschlechtstheile sehr beträchtlich sind, die Krankheit bereits längere Zeit gedauert hat, scrofulöse Constitution und ungünstige äußere Verhältnisse die Heilung erschweren, wird die Prognose schlimmer, und ähnliche Zufälle, wie die oben erwähnten, stehen zu besorgen. Daß übrigens auch bey beträchtlichen, aber die Operation

gestattenden Mißbildungen, z. B. den Atresien, die Prognose günstig gestellt werden könne, liegt am Tage.

§. 220.

Nach dem verschiedenen Gange, welchen die Krankheit genommen, ist auch, wenn sie durch herbeygeführte anderweitige Leiden mit dem Tode endigt, der Sektionsbefund verschieden. Die häufigsten Erscheinungen sind: die allgemeine Schlaffheit, welche oft, insbesondre an der Substanz des Herzens, bemerkbar ist, die Wasseranhäufungen, die verringerte, wässerige, mehr venöse Blutmasse, die Verhärtungen und Auftreibungen der Drüsen des Lymphsystems und die regelwidrigen Bildungen der Geschlechtstheile, als Verwachsungen des Muttermundes, besondere Kleinheit des Uterus *), Vergrößerungen der Eyerstöcke u. s. w.

§. 221.

Behandlung. Um die rechte Art und Weise ärztlicher Behandlung in den verschiedenen abnormen Zuständen des Lebens aufzufinden, ist es ohne Zweifel eines der wichtigsten und, wie mir scheint, der bisher eben nicht vorzüglich beachteten Mittel, daß man die Natur genau beobachte in dem Gange, welchen sie nimmt, indem sie ohne ärztliche Hülfe die Rückkehr des Normalzustandes bewerkstelligt, indem doch die Heilung der Krankheit stets nur das Werk der Natur allein seyn kann, und alle ärztlichen Mittel blos dazu dienen sollen, die Hindernisse, welche sich ihr hierbey entgegenstellen, zu beseitigen, was indeß blos möglich wird durch die genauere Kenntniß dieses Ganges. — Beachten wir nun die Art, nach welcher vorzüglich der bleichsüchtige Zustand von der Natur beseitigt zu werden pflegt, so bemerken wir, daß eines Theils schon der endliche Stillstand des allgemeinen

*) Ich bewahre in meiner Sammlung die innern Genitalien einer 17jährigen nicht menstruirten Mädchens, welches unter chlorotischen Symptomen an scrofulösen Geschwüren verstorben war, wo der Uterus nur etwas über einen Zoll lang, seine Höhle zwar geräumig, aber die Wände nur einige Linien stark sind.

Wachsthums Gelegenheit giebt, daß sich das Mißverhältniß zwischen bildender und zerstörender organischer Thätigkeit ausgleicht, daß von diesem Zeitpunkte an die Assimilation und Blutbereitung wieder in das angemessene Verhältniß zur allgemeinen Organisation tritt, und endlich das Uebergewicht erhält, welches das Erscheinen der Menstruation begründen kann. Im Gegentheile, wo die Krankheit reines Produkt ungünstiger äußerer Verhältnisse war, sehen wir sie sich verlieren, sobald die Kranke in eine bessere Lage versetzt wird, wo die Blutbereitung durch freye Einwirkung von Licht und gesunder Luft, durch vermehrte Muskularthätigkeit und Genuß kräftigerer Nahrungsmittel befördert wird. Ja endlich selbst bey unheilbaren Verbildungen der Geschlechtstheile und gänzlichem Mangel der Menstrualfunktion wird zuweilen die Gesundheit wieder hergestellt, indem entweder der Körper sich an vicariirende Ausleerungen, z. B. regelmäßigen Hämorrhoidalfluß gewöhnt, oder der Ueberfluß plastischer Stoffe auf die Ausbildung anderer Organe verwandt wird, weßhalb wir denn öfters bey solchen unvollkommnen weiblichen Geschöpfen die Muskelthätigkeit in hohem Grade entwickelt, und überhaupt die Bewegungsorgane in einem Grade ausgebildet finden, welcher mehr einen männlichen, als einen weiblichen Körper zu bezeichnen pflegt. — Dieses alles ist nun bey Anordnung der ärztlichen Behandlung zu erwägen.

§. 222.

Hauptanzeige bleibt es aber im Allgemeinen, theils die Sanguifikation und Bildungsthätigkeit auf ihren normalen Standpunkt zu führen, theils die Richtung der Bildungsthätigkeit auf das Geschlechtssystem und die Menstrualfunktion zu berücksichtigen, und etwaige hier sich entgegenstellende Hindernisse zu beseitigen. — In ersterer Hinsicht nun wird es den Arzt zunächst beschäftigen müssen, die veranlassenden Ursachen der Krankheit auszuforschen und zu entfernen, wobey denn, da die meisten dieser Zufälle von unzweckmäßiger Lebensweise ausgehen, auch eine sorgfältige Anordnung derselben einen der wichtigsten Punkte des Heilplans ausmachen wird. Reine, freie, trockne Luft, mäßiges Warmhalten,

mäßige Körperbewegung, Aufheiterung des Gemüths durch freundlichen Umgang, Reinlichkeit und sorgfältige Hautkultur, befördert durch den fleißigen Gebrauch des lauen Bades, so wie die Vermeidung aller den Geschlechtstrieb erregenden Reitze, werden daher, unterstützt durch leichtverdauliche, nährende, mehr animalische Diät, oft, zumal wo das Uebel nicht eingewurzelt, und nicht Produkt anderer Krankheitszustände ist, das Einzige seyn, was ein den Gang der Natur ehrender Arzt verordnet, da der voreilige Gebrauch der sogenannten stärkenden zusammenziehenden Mittel, namentlich des Eisens, der kalten Bäder u. s. w. hier nur dazu führen kann, daß Nervenschwäche, Verhärtungen der Gekrösdrüsen u. s. w. sich bilden. Man schone demnach hier die Krankheit als einen nothwendigen Entwicklungszustand; auch das von Hippokrates bereits angerathene Mittel der zeitigen Verheirathung kann nur dann zulässig erklärt werden, wenn der Körper bereits seiner völligen Entwicklung wenigstens nahe gekommen, oder dieses der einzige Weg ist, der Sehnsucht einer stets angeregten Phantasie, oder den unnatürlichen Ausschweifungen Gränzen zu setzen. — Nur bey einer besondern Atonie der Muskelfaser, übrigens aber weder bedeutendem gastrischen Zustande noch sonstigen innern Verbildungen, kann jenes diätetische Verfahren durch den Gebrauch eines eisenhaltigen Mineralwassers, (z. B. des Pyrmonter oder Driburger), durch ähnliche Bäder, durch den mäßigen Genuß eines guten alten Weins, und die bittern Mittel (Extrakte, China u. s. w.) unterstützt, und so die Wiederherstellung der Gesundheit beschleunigt werden.

§. 223.

Hartnäckiger, und folglich thätigeres Eingreifen erfordernd, zugleich aber auch besonders häufig, sind indeß diejenigen Arten der Bleichsucht, welche hervorgehen aus bereits entstandenen Krankheiten des Lymphsystems und einzelner Unterleibsorgane. Hier ist es ganz vorzüglich, wo die in Folge vorgefaßter Meynung von vorhandener Schwäche gewöhnlich im Uebermaaß gereichten tonischen Mittel den entschiedensten Nachtheil herbeyführen müssen, so daß wir hierin

gleich anfänglich dringend zu erinnern für unumgänglich nöthig hielten. Die ganze Macht ärztlicher Wirksamkeit sey daher hier zunächst gegen jene der abnormen Sanguifikation und Bildungsthätigkeit zum Grunde liegenden, obwohl hinwiederum auch wechselseitig von diesen unterhaltenen und verstärkten Krankheitszustände gerichtet, und man lasse sich nicht abhalten, zur Beseitigung derselben auch anscheinend schwächende Heilmethoden in Anwendung zu bringen.

§. 224.

Einer der allgemeinsten Krankheitszustände dieser Art sind aber die Abnormitäten in der Thätigkeit lymphatischer Gefäße, verbunden mit Anschwellungen und Degenerationen der Lymphdrüsen; und wie nun die Erfahrung zeigt, daß hierbey vorzüglich die Befreyung des Darmkanals von aufgehäuftem Schleim und Verhärtungen, die Vermehrung einer gleichmäßigen Sekretion an der innern Fläche desselben (als antagonistischer Reitz) und die Beförderung der Lymphbewegung, verbunden mit regelmäßiger Thätigkeit des Haut-, Nieren- und Lungenorgans wohlthätig wirken könne, so wird es nun auch Pflicht, die auflösenden und abführenden Mittel (vorzüglich die Mittelsalze, das Rheum, die Radix Jalappae, die Fol. Sennae, den Karlsbader Brunnen, die seifenartigen Extrakte, Fel tauri, Sapo venet. u. s. w.) den Umständen gemäß anzuordnen, und damit nöthigenfalls die Antimonialien, den Gebrauch der Seifenbäder, der Friktionen des Unterleibes zu verbinden. — Sind Würmer vorhanden, so wird man zwar die Entfernung derselben durch Anthelmintica nicht verabsäumen, vorzüglich jedoch auf die Beseitigung des Status pituitosus als der eigentlichen Quelle derselben Rücksicht nehmen. Eben so verlangen ferner Blutflüße, Schleimflüße, intermittirende Fieber u. s. w., sobald man sie als Ursachen der Bleichsucht erkennt, die ihnen angemessene Behandlung, und erst wenn dieser Anzeige Genüge geschehen ist, und der bleichsüchtige Zustand als selbstständige Krankheitsform zurückbleibt, wird es Zeit seyn, die Ende des §. 222. erwähnten Mittel in Anwendung zu ziehen, indem zugleich

eine die Reproduktion unterstützende Diät und sonstige zweckmäßige Lebensweise vorgeschrieben wird.

§. 225.

In wiefern übrigens, wenn die Bleichsucht Folge ähnlicher primärer Krankheitszustände ist, die reproduktive Thätigkeit gewöhnlich mehr zerrüttet, und der Körper in jeder Hinsicht mehr geschwächt ist, als in den §. 222. betrachteten Fällen, so wird es auch häufig nothwendig, die tonischen Mittel selbst länger und in stärkern Dosen zu gebrauchen. Man beobachtet hierbey die Vorsicht mit den gelinden Mitteln, (z. B. den leichtern Extrakten, als Extract. Saponar., Trifol. fibr., Cent. minoris) den Anfang zu machen, dann zu den stärkern (Extr. Gentianae, Cortex peruv.) überzugehen, und wenn der Darmkanal hierauf vorbereitet ist, das Eisen in Anwendung zu ziehen, von welchem man entweder die Tr. martis cydoniata unter einen Löffel Wein zu 20 — 30 Tropfen, die Flor. sal. ammon. martiales, oder, sobald die Kranke es verträgt, noch lieber die Pulverform, mit der Flaved. Cort. aurant., Cort. Cinnamomi u. dergl. verbunden, anwendet. Ueberhaupt ist bey Anordnung aller dieser Mittel zugleich auf den Stand der Sensibilität Rücksicht zu nehmen; daher bey phlegmatischen Subjekten die Anwendung von aromatischen Aufgüßen (der Hb. Meliassae, Menth. pip. u. s. w.) so wie das Verbinden der rein bittern Mittel mit geistigen Tinkturen u. s. w., oder, namentlich bey Neigung zu Durchfällen, mit dem Cort. Cascarillae, hingegen bey sehr aufgeregter Sensibilität die Beymischung antispasmodischer Mittel, und, vorzüglich bey Erethismus des Gefäßsystems, die Anwendung mineralischer Säuren (Acid. Halleri, Elix. vitr. Mynsicht.) zweckmäßig ist.

§. 226.

Ferner ist es zur völligen Beseitigung des chlorotischen Zustandes angemessen, sobald theils die vorausgegangenen Krankheiten beseitigt, theils die reproduktiven Thätigkeiten etwas vollkommner hergestellt sind, auf das Erscheinen der

Menstrualfunktion gelind mit hinzuwirken. — Merkwürdig ist es hierbey zu finden, daß in dieser Hinsicht ältere und neuere Aerzte in der Behandlung dieser Krankheit fast ganz auf entgegengesetzten Wegen gingen, indem bey jenen das Herstellen der Menstruation, oder in Ermanglung derselben die Blutentziehungen *) fast eben so sehr als Hauptsache betrachtet wurde, als von den Neuern im Durchschnitte das Anwenden stärkender Mittel an die Spitze gestellt wird; ja man glaubte sogar ziemlich gewaltsame Mittel, um die Herstellung der Menstruation zu bewirken, erlaubt, wohin namentlich das Verfahren Hamilton's, welches Chambon de Montaux anführt, gehört. Dieser nämlich, als er eine zwanzigjährige Bleichsüchtige behandeln sollte, deren Regeln seit 7 Monaten gehemmt waren, wo der Puls schwach und selten, die Verdauung gestört und die Kräfte gesunken waren, glaubte von den gewöhnlichen innern Mitteln eine zu langsame Wirkung erwarten zu müssen, dagegegen von einem mechanischen Mittel, welches den Blutlauf mehr gegen die innern Genitalien richtete, eine günstige Umänderung hoffen zu dürfen. Nachdem er daher der Kranken eine Abführung gegeben, legte er ein Tourniket an den Schenkel **) (ohngefähr wie Behufs der Amputation), komprimirte die Schenkelarterien mäßig, ließ zugleich ein Dampfbad an die Genitalien leiten, und späterhin ein Cardiacum reichen, worauf alsbald die Regeln flossen. — Unter den Umständen jedoch, welche wir hier im Sinne haben, können solche gewaltsame Mittel eben so wenig als stellvertretende allgemeine Blutentziehungen Statt finden, sondern es empfehlen sich hier Behufs der Beförderung der Menstruation nur die gelindern Mittel, als Fußbäder, Halbbäder, weniger die Dampfbäder der Genitalien, wollene Bekleidung oder trockene Friktionen

*) Chambon de Montaux (des Maladies des filles. T. I. p. 119.) sagt daher: „La première Indication est de diminuer la masse du sang, puisqu'il y a une pléthore réelle dans presque tous les sujets attaqués de la chlorose.“

**) A. a. O. S. 204. Auch bey einigen Alten schon findet sich das Binden der Glieder als Beförderungsmittel der Menstruation empfohlen.

der Unterglieder, allenfalls bey sich zeigenden Congestionen nach andern Organen, Blutigel an das Perinäum oder einige blande Abführungen.

§. 227.

Leidet dagegen die Assimilation und Blutbereitung in Folge von Hindernissen, welche dem Hinwirken allgemeiner reproduktiver Thätigkeit auf das Geschlechtssystem sich entgegenstellen, welches erkannt wird, indem hier die Regeln gewöhnlich früher bereits erschienen waren, oder Verbildungen in den Geschlechtsorganen vorhanden sind, dann tritt vorzüglich die oben gelehrte Behandlung verzögerter, gänzlich mangelnder oder gehemmter Menstrualfunktion ein. Dieß sind daher vorzüglich die Fälle, wo in Folge einer verhältnißmäßig zu beträchtlich gewordenen Säftemasse Blutentziehungen, und andere Säfteentleerungen durch vermehrte Darmsekretionen besondern Nutzen gewähren, kurz wo die ältere Behandlungsweise dieser Krankheit (§. 226.) vorzüglich angezeigt ist. Daß ferner, wo solche Verbildungen in Geschlechtsorganen (deren genauere Untersuchung daher unerläßlich bleibt) sich vorfinden, welche, wie z. B. Atresien, eine operative Hülfe zulassen, diese alsobald werde Statt finden müssen, daß ferner eine wohlgeordnete, mehr vegetabilische Diät, verbunden mit Bädern, angemessener Bewegung in freier Luft (wohin insbesondre auch das Reiten und Fahren zu rechnen ist) u. s. w. vorzüglich mit benutzt werden könne, um solche oft scorbutische Entmischungen der Säftemasse zu heben, ergiebt sich von selbst. Weiter verdient aber hierbey auch die eigentliche Geschlechtsfunktion Berücksichtigung, indem z. B. wo der bleichsüchtige Zustand sich einfindet, entweder wegen eines der allgemeinen Körperentwicklung nach nicht hinlänglich aufgeregten Sexualsystems, oder in Folge des entzogenen Geschlechtsreitzes, z. B. bey jungen Wittwen, allerdings die Verheirathung eben so wesentlich zur Beseitigung der Krankheit beytragen kann, als, wo die Bleichsucht in Folge des übermäßigen oder unnatürlichen Geschlechtsreitzes sich entwickelte, die Beschränkung desselben. — Welche besondere Behandlung ferner einzelne Symptome dieser Krankheit zuweilen er-

fordern können, daß z. B. Neigung zur Säureerzeugung die Anwendung absorbirender und aromatisch bitterer Mittel, das Erscheinen scrofulöser Geschwüre, so wie der Hautausschläge eine vorsichtige nicht auf zu plötzliche Unterdrückung gerichtete Behandlung nöthig mache, läßt sich so leicht aus den Regeln der allgemeinen Therapie folgern, daß ausführliche Erörterungen hierüber unnöthig scheinen.

§. 228.

Eigentlich würden nun an diesem Orte auch die übrigen, dem weiblichen Geschlecht in der Periode der Pubertätsentwicklung vorzüglich gefährlichen Reproduktionskrankheiten, namentlich die ohne Eiterung erfolgenden langsamen Auszehrungen sowohl, als die mit Eitererzeugung verbundenen Schwindsuchten, aufzuführen seyn, indeß da diese Krankheitsformen im Wesentlichen auf gleiche Weise auch dem männlichen Geschlecht eigen sind, auch nicht zu sagen ist, daß die Behandlung derselben in dem einen Geschlechte auf irgend verschiedenen Regeln als in dem andern beruhe, so muß dem Plane dieses Werkes gemäß, ihre weitere Betrachtung übergangen werden, und wir wenden uns daher vielmehr zu den:

2.

Verstimmungen der animalen Funktionen während der Pubertätsentwicklung.

§. 229.

Obwohl nämlich auch diese Zufälle dem weiblichen Geschlecht weniger ausschließend angehören, als etwa die Bleichsucht oder die Fehler der Menstrualfunktion, so sind doch die Formen derselben zum Theil so auffallend, und oft an das Wunderbare gränzend, zum Theil werden sie auch durch das Eigenthümliche der psychischen Natur des Weibes so sehr modifizirt, daß wir die Betrachtung derselben um so weniger ausschließen dürfen, da sie zumal auch als Symptome anderer Krankheiten vorkommen, auf alle Weise aber dem Arzte für weibliche Krankheiten die genaue Kenntniß

derſelben nicht mangeln darf, damit er durch die Neuheit dieſer Erſcheinungen nicht überraſcht, und in der ruhigen Entwerfung ſeines Heilplans gehindert werde *).

§. 230.

Um aber zuvörderſt das Eigenthümliche vieler hierhergehöriger Zufälle nicht unnatürlich oder vielmehr übernatürlich zu finden, müſſen wir immer recht klar vor Augen behalten, daß der menſchliche Organismus zwar eine Einheit, aber nicht ein wahrhaft in ſich beſchloſſenes, den Grund ſeiner Exiſtenz allein in ſich tragendes Ganze ſey, daß er vielmehr nicht einen Augenblick gedacht werden kann außer der Einwirkung der ihn umgebenden Natur, von welcher er ſtets durchdrungen iſt, welche er ſtets in ſich aufnimmt, und in welche er ſich ſtets auflöſt. Eben aus dieſem Grunde wird er aber auch fähig, ſich im Ganzen und das Ganze in ſich zu fühlen, ſo daß, je zarter ſeine Empfänglichkeit, ſein Wahrnehmen wird, auch um ſo mehr ſein Empfinden äußerer Veränderungen ſich ausdehnt, und zwar in eine Weite, für deren Begränzung wir durchaus kein unverrückbares Maaß haben, ſo daß als eitle Anmaßung erſcheint, wenn irgend ein Phyſiolog hier eine Säule mit einem non plus ultra aufzurichten gedenkt, denn nur was den Vernunftgeſetzen widerſtreitet, iſt unmöglich. — Kann ſich denn etwa ein Menſch, auf deſſen geſunden Körper die Umſtimmungen der Atmoſphäre, der Witterung, keinen merklichen Eindruck machen, ſinnlich überzeugen, wie es möglich ſey, daß ein Anderer, deſſen Senſibilität in erhöhterem Zuſtande ſich befinden, dieſe Veränderungen, noch ehe ſie wirklich erfolgt ſind, ſchon wahrnimmt? und iſt das Letztere deßhalb etwa weniger in Wahrheit der Fall? —

*) Es iſt ſonderbar, in den neuern Lehrbüchern über Frauenkrankheiten dieſe merkwürdigen Zufälle immer übergangen zu finden, obwohl andere Schriften (z. B. Henke von den Entwicklungen des menſchlichen Organismus) ſie als krankhafte Entwicklungszuſtände mit aufgeführt hatten.

§. 231.

Es ist aber ferner zu bedenken, daß noch ein Unterschied beachtet werden müsse zwischen der Erscheinung der Dinge und ihrem innersten Wesen, d. i. ihrer innern die Form der Erscheinung bedingenden Idee. Nun sind aber die Sinne dem Erfassen der Erscheinung allein bestimmt, keineswegs aber wird es dadurch ausgeschlossen, daß die Idee des Organismus nicht unmittelbar afficirt werden könnte durch die Verhältnisse und Veränderungen anderer mit ihm in einem unermeßlichen Weltall eingebohrener Ideen, ja es ist nothwendig, daß der Theil (und ein Organismus ist stets nur ein solcher) afficirt werden müsse von den Umstimmungen des Ganzen, zu welchem er gehört, und zwar unmittelbar, und auf gleiche Weise, wie das Leben und Gefühl eines einzelnen Organes im Körper sich ändert, jenachdem in andern Organen, und folglich (da ein Theil nicht umgewandelt werden kann, ohne in gewisser Hinsicht das Ganze mit zu ändern) auch im Ganzen wesentliche Umstimmungen Statt gefunden haben. Dieses unmittelbare Wahrnehmen der Verwandlungen im Leben anderer Wesen ist aber um so nothwendiger, je mehr der Organismus integrirender Theil der allgemeinen Natur ist, so sehen wir denn, daß das Insekt, welches nie den Winter erlebte, doch seine Eyer gegen die Kälte desselben zu bergen weiß, so wird der Fisch oder Vogel auf seinen weiten Wanderungen nach dem ihm gesteckten Ziele gezogen, obwohl er es weder sehen, noch riechen, noch fühlen kann, so vermeidet die geblendete Fledermaus das aufgespannte Netz, so empfinden so viele Thiere bevorstehende Witterungsänderungen, Erdbeben u. s. w. — lauter Erscheinungen, deren Verständniß sich uns bald klar eröffnen wird, sobald wir zu einer recht lebendigen Anschauung der Natur in der Einheit uns erheben können, welches indeß die Seele in ihren eigenen Tiefen erfassen muß, welches ihr von außen nicht bewiesen werden kann, und welches daher bey denen, welchen diese Ansichten noch nicht eigen geworden waren, Anlaß gab, entweder solche Erscheinungen lieber geradezu zu läugnen, oder sich mit hypothetischen Sinnesarten zu einer schwachen Erklärung zu ver-

helfen, gegen welche uns doch sogar die eigentlich nur bildlichen Darstellungen jener allgemeinen Verbindungen, wohin Meßmer's Aetherströmmungen gehören, immer noch vorzüglicher scheinen.

§. 232.

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen wenden wir uns nun zu näherer Betrachtung der der Pubertätsentwicklung zugehörigen ungewöhnlichen und abnormen Zufälle der animalen Thätigkeiten im weiblichen Organismus, und müssen zuvörderst, wie denn alle animale Thätigkeit diesen beyden Richtungen folgt, zwischen abnormen Empfindungen und abnormen Gegenwirkungen unterscheiden. Beyde Gattungen sind indeß in der Natur keineswegs so scharf getrennt, daß nicht vielmehr gerade die meisten besondern Krankheitsfälle nach dem Vorherrschen der einen oder andern Abnormität klassificirt werden müßten, und wenn wir daher Krämpfe und Lähmungen einerseits, und erhöhte oder gesunkene Empfindlichkeit andrerseits, allerdings gleich eigentlichen Grundformen zu betrachten haben, so gehen doch die verschiedenen Unterarten derselben nebst ihren vielfachen Combinationen ins Unendliche, so daß wir uns begnügen müssen, nur von den größern Krankheitsgruppen eine allgemeine Charakteristik zu entwerfen.

§. 233.

Untersuchen wir nun zunächst die in dieser Periode des weiblichen Lebens vorkommenden Störungen des Empfindungsvermögens, so haben wir wieder die krankhaften Erscheinungen des innern Sinnes, in welchem das eigentliche Seelenleben sich ausspricht, und des äußern Sinnes zu unterscheiden. Zu denen der erstern Art gehören: a) die Ueberspannungen des Selbstgefühls im wachen Zustande, welche, je nachdem sich das Gemüth der Kranken dabey auf die äußern menschlichen Verhältnisse, oder auf innere geistige und religiöse Gegenstände richtet, zur Sucht bewundert zu werden (sey es auch nur wegen Ertragung vielleicht absichtlich geschaffener Leiden) oder zur Fantasterey, Sprechsucht, Versucht und Musiksucht, oder

endlich zur religiösen Schwärmerey führt; b) die Ueberspannung des Selbstgefühls im Schlafe, als Schlafredenerey und Schlafwandeln, so wie die Ueberwältigung des Selbstgefühls, als Alpdrücken (Incubus); c) die gänzlichen Abspannungen des Selbstgefühls, als Ohnmacht, Apathie und wirklicher Blödsinn. — Zu den Abnormitäten des äußern Sinnes gehören: a) die unverhältnißmäßig starke Erregung der Sinneswahrnehmung durch gewöhnliche äußere Einflüße, und hieher rechnen wir theils örtliche Schmerzen, wo ein Organ vermöge gesteigerter Empfindlichkeit die früher ihm natürlichen Reitze (seyen es nun absolut oder nur relativ äußere, z. B. Einwirkung benachbarter Organe) als schmerzerregend wahrnimmt, theils Bestimmungen des Willens durch den zu stark empfundenen Reitz, also die Nachahmungssucht. b) Die Erregung der Sinneswahrnehmung auf ungewöhnlichem Wege, die sogenannten Sinnesversetzungen, als das sogenannte Sehen durch die Magengegend, oder Hören auf dieselbe Weise oder durch die Fingerspitzen u. s. w. — c) Die Wahrnehmung äußerer Verhältnisse, welche im gewöhnlichen Zustande gar nicht empfunden werden, und zwar des Schauens oder Fühlens in entfernte Orte (Rabdomantie), das Wahrnehmen bevorstehender Dinge, entweder nur durch ein dunkles Gefühl (Ahnung), oder mit klarem Bewußtseyn (Weissagung).

§. 234.

Wir kommen nun zu den Störungen des Vermögens, auf äußere Gegenstände durch Muskularthätigkeit zu wirken. Hieher gehören: a) Lähmungen, und zwar entweder mit übriggebliebener Sensibilität in dem gelähmten Gliede, oder mit aufgehobenem Empfindungsvermögen (torpide Paralyse). b) Erstarrung, und zwar mit vollkommener Unbeweglichkeit der Glieder, Starrkrampf (Tetanus) mit seinen Unterarten (Trismus, Opisthotonus etc.), oder mit wächserner Biegsamkeit derselben (Catalepsis), wo sie jede gegebene Stellung behalten. c) Heftig aufgeregte unwill-

kührliche Muskelbewegung, Zuckungen, clonische Krämpfe, Epilepsie, Veitstanz u. s. w. — Endlich aber halten wir dieses auch für den angemessensten Ort, einiger sonderbaren im vegetativen Leben sich äußernden Abnormitäten zu gedenken, welche wir gleichfalls vorzüglich von krankhaften Einwirkungen des Nervensystems ableiten zu dürfen glauben, und welche in der ungewöhnlich langen Suspension mehrerer dem Leben sonst ununterbrochen nothwendiger Funktionen sich darstellen, wohin zu rechnen: a) die lange Entbehrung von Nahrungsmitteln, b) die lange Unterdrückung natürlicher Ausleerungen, c) die lange Unterbrechung des Athemhplens.

§. 235.

Es ist nun im Folgenden unsere Absicht, diese Krankheitsformen noch im Einzelnen durchzugehen, sie nach ihrer Entstehung und ihrem Vorkommen, so wie nach der Art ihrer Erscheinungen mit den Grundsätzen der Physiologie möglichst in Uebereinstimmung zu bringen, zu beleuchten, und dann von den Mitteln zu handeln, welche, in wiefern sie das Nervensystem unmittelbar in Anspruch nehmen, vorzüglich zur Behandlung derselben empfohlen zu werden verdienen, in wiefern nämlich diese Krankheitserscheinungen selbst nicht vielleicht blos Symptome anderweitiger Störungen darstellen; als welches aus der Verbindung oder vielmehr Anreihung dieser Zufälle an andere primär vorhandene (z. B. Störungen der Menstruation u. s. w.) sich ergiebt, und dann wesentlich nur die Behandlung jenes primären Leidens fordert.

§. 236.

1) Die Ueberspannungen des Selbstgefühls im wachen Zustande betreffend, so sind sie vorzüglich bey schwächlichen überreitzten Jungfrauen, deren Geistesentwicklung der körperlichen weit vorgeeilt ist, zu bemerken; es ist hier, als ob der Geist auf alle Weise die Schwäche und Unvollkommenheit des Körpers verdecken wollte, und zugleich als ob der Geist bey der unvollkommnen körperlichen Organisation, gleichsam des festen Bodens in der sinnlichen

Welt ermangelte, und daher von einer Erscheinung leicht unverhältnißmäßig, ja bis zum Aufgeben aller innern Freyheit angezogen würde. Mädchen dieser Art zeichnen sich vorzüglich aus durch einen zarten Körperbau, feine Haut, sprechende Gesichtszüge und vorzüglich ein äußerst lebendiges Auge, sie sind zu Fieberwegungen und Unordnungen in der Verdauungsfunktion geneigt, haben unruhigen Schlaf und lebhafte Träume. Bemerken diese Individuen nun (und sie fühlen es vermöge ihrer Reitzbarkeit früher und stärker, als gemeinhin geglaubt wird), daß man sie ihrer unvollkommnern physischen Ausbildung wegen bemitleidet, daß ihnen deßhalb wohl gar weniger Ansprüche auf künftiges ehliches Glück verstattet werden, so erwacht ihre Eitelkeit, sie wollen durch die gewaltsamsten Anstrengungen die Ansprüche auf Beachtung erzwingen, welche ihnen die Natur versagt zu haben scheint, und nur allzuleicht geschieht dieß dann auf Unkosten der Wahrheit, ja sie scheuen die heftigsten körperlichen Schmerzen nicht, wenn damit das Ziel, Aufmerksamkeit, ja Bewunderung zu erregen, erreicht werden kann, daher denn die Fälle, wo Personen dieser Art vorgaben, lange Zeit ohne alle Nahrungsmittel zu leben, und allerdings dabey nur sehr wenig genossen*), die Fälle, wo andere ungewöhnliche Dinge erdichtet wurden (z. B. verstellte Somnambulen, oder das Schweitzermädchen, welches eine Natter im Leibe zu haben, und durch die Vagina mit Milch zu ernähren vorgab), ja wo die Personen sogar die schmerzhaftesten Krankheiten nachbilden, und chirurgische Operationen nicht scheuen, wie ein Fall beweiset, wo ein Mädchen sich Kiesel verschiedener Größe in die Harnblase einbrachte und sich den schmerzhaftesten Extraktionen der über die Natur dieser Blasensteine nicht wenig verwunderten Aerzte unterwarf**).

§. 237.

Aehnliche Ueberspannungen hingegen, wenn dabey das Gemüth auf innere ideale Gegenstände gerichtet ist, bringen,

*) S. Osiander über die Entwicklungskrankheiten. 1r Th. S. 188.

**) Man lese diesen sehr merkwürdigen von H. Klein mitgetheilten Fall in Harles Jahrbüchern der teutschen Medicin und Chirurgie. III. Bd. 2s Hft.

obwohl sie ursprünglich ziemlich bey denselben Subjekten und unter ähnlichen Verhältnissen wie die obgedachten entstehen, dann ganz andere Erscheinungen hervor, unter welchen vorzüglich die religiöse Schwärmerey eine eigene und häufig vorkommende Form darstellt. Man bemerkt sie vorzüglich bey Mädchen, welche bey einer mit unverständlichen Religionsbegriffen überfüllten Phantasie von irgend einem Unglücksfall schwer betroffen werden, oder bey andern Individuen, welche bey reitzbarem Gemüth und einem vielleicht früher weniger als recht um göttliche Dinge bekümmerten Sinne, nun durch mystische Prediger plötzlich aufgeschreckt wurden *). Ihr ganzes Wesen scheint dann dem Irdischen entzogen, eine Liebe, deren Inbrunst an Geschlechtsliebe erinnert, ist den Heiligen oder dem Heilande zugewendet, und nur die nähere Erwägung, daß in diesem Zustande weder Klarheit und Ruhe, noch vernunftgemäße Willensfreyheit und Besonnenheit obwaltet, kann gegen den leicht bestechenden Reitz, ja gegen die geistige Erhebung einer schönen Schwärmerin, diesen Zustand als krankhaft darstellen. — Mitunter aber richtet sich wohl auch dieses Bestreben auf Kunst der Sprache oder der Musik, so hörte man von solchen exaltirten Kranken lange Gedichte improvisiren, und mit feurigem Ausdrucke vortragen, man hörte sie mit weit schönerem Ausdruck und mehr Kunst als im natürlichen Zustande singen, ja Instrumente spielen und Sprachen reden **), darin sie sonst wenig geübt waren; obwohl dieses insgemein schnell vorübergehende Zustände sind, und zum Theil als bloße Symptome mit der Sucht nach Auszeichnung oder der religiösen Schwärmerey, oder körperlichen Krankheiten sich verbinden.

§. 238.

Wir kommen nun zu den Abnormitäten, welche auf der Nachtseite des Lebens bey weiblichen, in der Entwicklungsperiode begriffenen Individuen nicht selten bemerkt wer-

*) So sah man ja noch neuerlich, durch eine bekannte Schwärmerin angeregt, junge Mädchen dem Hause ihrer Eltern entweichen, und sich für Bräute Christi erklären.

**) Ostander a. a. O. Th. 1. S. 94.

den, und als Ueberspannungen oder Oppressionen des Selbstgefühls im Zustande des Schlafs oben bezeichnet worden sind. — Alle diese Zustände aber haben etwas besonders Geheimnißvolles, haben deßhalb zu den sonderbarsten Meynungen Veranlaß gegeben, und können wohl überhaupt nie dem erwachten Menschen in allen Beziehungen so klar und verständlich werden, als es das Wachen selbst ist, eben weil das sinnlich Vorhandene nur durch die Erfahrung erkannt wird, der Schlaf aber mit dem in ihm beschlossenen Kreise von Erscheinungen eine zu sehr in sich begränzte Sphäre darstellt, als daß sie vollkommen in den Kreis der freyen Verstandsthätigkeit, dem ersten Bedinguiß der Erfahrung eingehen könnte; hinwiederum aber der Mensch, wenn er in die Sphäre des Schlafs und der Träume eingegangen ist, zu wenig Freyheit und Klarheit hat (eben weil seine hier erregten Zustände selbst freyes Spiel der Phantasie sind) um, so lange er in derselben befangen ist, der wissenschaftlichen Erfahrung fähig zu seyn.

§. 239.

Suchen wir indeß demohnerachtet tiefer in diese Gegenstände einzudringen, so kann dieß nur geschehen, indem wir bedenken, daß überhaupt nicht das Wachen, sondern der Schlaf der ursprüngliche Zustand des menschlichen Organismus sey, daß im Schlaf die Individualität immer wieder dem großen Ganzen, aus welchem sie hervorgetreten, näher gebracht, mehr von diesem Ganzen durchdrungen werde, als in der starrern Selbstständigkeit des wachen Zustandes möglich ist. So finden wir denn im tiefen Schlafe die der Sinneswelt zugekehrte Wirkung der Seele gleichsam aufgelöst in dem Ganzen der Natur, und das Gefühl des individuellen Daseyns überhaupt aufgehoben, allein im leichteren Schlafe kann auch das Gefühl des Daseyns bestehen, es besteht jedoch dann auf andere Weise, nämlich wieder beengt von den Schranken der Zeit und des Raumes in wunderlicher Ungebundenheit; kurz der Traum hebt an. — Ist indeß der Traum so lebendig, daß er selbst über willkührliche Reactionen seine Herrschaft verbreitet, so erzeugt sich eine

widernatürliche Verbindung von Tag- und Nachtseite, ein Schlafwachen (schon der Widerspruch in diesem Worte bezeichnet das Krankhafte) und es tritt hierbey nun ein doppelter Fall ein, nämlich entweder entspricht Traum und Wirksamkeit des Schlafenden den äußern Verhältnissen oder nicht. Das erstere zeigt sich in vorzüglich hohem Grade im Schlafwandeln (Somnambulismus), wo Schlafende bekanntlich das leiseste Gefühl, ja mehr als dieses, einen gewissen Instinkt verrathen, welcher sie in vielerley Dingen sich orientiren, und in den gefährlichsten Stellen sich erhalten und fortbewegen lehrt, und welcher eben aus dem wenig bewußten Versinken der Individualität in den großen Naturkreis verständlich wird (s. §. 231.). — Dieses Schlafwandeln aber findet sich vorzüglich bey sehr sanguinischen Mädchen und vorzüglich wenn die Unterleibsorgane in nicht ganz naturgemäßem Zustande sind, bey aufgetriebenen Lymphdrüsen, Verschleimungen des Darmkanals, Würmern u. s. w, welches darthun kann, daß allerdings das Gangliensystem, wenn wir auch darin keineswegs den alleinigen Grund dieser Verstimmungen suchen mögen, doch wichtigen Antheil an denselben nehmen müsse. — Daß übrigens auch der Einfluß des Mondes auf Erregung dieser Zustände bedeutend sey, ist bekannt, und daß dieser Einfluß gerade beym weiblichen Geschlecht wegen der Einwirkung desselben auf die Menstruation (§. 120 u. f.) bedeutender seyn könne, mir sehr wahrscheinlich.

§. 240.

Die Schlafrednerey betreffend, so ist dieselbe offenbar schon mehr dem bloßen Traume genähert und deßhalb auch meistens den nächsten äußern Verhältnissen weniger entsprechend, somit die Tag- und Nachtseite weniger untereinandermengend, und folglich wieder unnatürlich, übrigens sind die Bedingungen, unter welchen sie entsteht, ziemlich dieselben. — Dagegen haben wir noch diese Erscheinungen des Traumlebens in anderer Hinsicht zu betrachten, nämlich in wiefern sie selbst durch äußere Einwirkungen, oder durch besondere krankhafte Stimmungen des leiblichen Organismus (welche immer für die Phantasie ein Aeußerliches sind) be-

stimmt, und die Freyheit des Phantasiespiels, das reine Auflösen in einen größern Naturkreis beeinträchtigt wird. Hierher gehören nun schon die ängstlichen, erhitzenden oder ermattenden Träume, welche von schwerer, ungesunder oder mit stark riechenden Dingen geschwängerter Zimmerluft, nach schweren Speisen u. s. w. erregt werden; vorzüglich aber gehört hierher das sogenannte Alpdrücken, welches bey vollblütigen, in der Entwicklungsperiode begriffenen weiblichen Subjekten nicht selten vorkömmt, und mir im Wesentlichen darin zu bestehen scheint, daß durch Anhäufung eines nicht hinlänglich oxydirten Blutes in den Gefäßen der großen Centralnervenmassen die Wirksamkeit des Nervensystems mehr noch, als sie es im Schlafe seyn soll, gehemmt wird, zuletzt selbst die Respirationsbewegung zu unterhalten versagt*), und das Gefühl einer schweren, auf die Brust gelegten Last erzeugt, wobey selbst, wenn durch diesen Schmerz das Erwachen endlich herbeygeführt wird, die allgemeine Lähmung, der gleichsam asphyktische Zustand, nicht eher nachläßt, bis es der angestrengten Willensrichtung des Kranken gelungen ist, laut aufzuschreyen, d. i. die Lähmung der zur Athmungsbewegung nöthigen Muskeln zu überwältigen. Es erklärt sich nun sehr wohl, warum die einzelnen Anfälle vorzüglich nach Ueberladungen des Magens, nach hitzigen Getränken, bey schwerer Gewitterluft u. s. w. erfolgen **).

§. 241.

Ferner die Abspannung des Selbstgefühls ist, wo sie in der Entwicklungsperiode, und zwar nicht etwa bedingt durch andere Krankheiten, vorkommt, gewöhnlich die Folge vorausgegangener Ueberspannung, und zwar entweder durch eine auf zu zeitige Entwicklung psychischer Kräfte gerichtete Erziehung, oder in Folge physischer Reitzungen, so wie heftiger Gemüthserschütterungen herbeygeführt. Sie äußert sich am gewöhnlichsten in der Form der Apathie, die

*) Wie sehr die Athmungsbewegung vom Hirn abhängt, haben die Experimente von Brodie, le Gallois und Andern hinlänglicher wiesen.

**) S. vom Alp Reil's Fieberlehre. IV. Bd. §. 94 u. f.

Kranken zeigen ein gedunsenes schlaffes Ansehen, ihr Auge starrt geistlos gerade aus, sie sitzen wohl stundenlang, ohne eine bestimmte willkührlich geregelte Gedankenreihe zu verfolgen, Nichts regt ihre Theilnahme besonders an, und selbst die leiblichen Verrichtungen gehen träge und unvollkommen von Statten. Der Blödsinn selbst ist der höhere Grad dieser Apathie, und die Erscheinungen desselben bedürfen hier keiner nähern Beschreibung. — Dagegen wäre noch von den gewöhnlich schnell vorübergehenden Abspannungen des Selbstgefühls, welche als leichte oder starke Ohnmacht (Lipothymia und Syncope) erscheinen, zu sprechen, allein diese, obwohl sie in den Entwicklungsjahren häufig genug vorkommen, sind so gänzlich die äußern Symptome körperlicher Krankheit, und vorzüglich von krankhaften Zuständen des Gefäßsystems, daß, wenn sie auch zuweilen fast allein das Krankseyn bezeichnen *), dieselben doch in wissenschaftlicher Hinsicht eine besondere Betrachtung nicht gestatten.

§. 242.

Nun zu den Abnormitäten in Wahrnehmungen äußerer Gegenstände, wohin wir zuvörderst die erhöhte Reitzbarkeit für gewöhnliche Sinneseindrücke rechnen **). — Wenn aber der regelmäßige Stand sinnlicher Wahrnehmung abhängt von einer gleichmäßigen Durchdringung der Außenwelt und der Individualität, so ist offenbar eine zu große Reitzbarkeit der Sinne gewissermassen anzusehen als ein Verlieren an das Aeußere, womit das stufenweise Abnehmen der Selbstständigkeit und kräftigen Gegenwirkung, beym Zunehmen der Reitzbarkeit, endlich aber das so bedeutende Erschlaffen individueller Thätigkeit, daß selbst die Receptivität gelähmt wird, übereinstimmt. Wir bemerken da-

*) So die mit Krämpfen verbundenen Ohnmachten der Prinzessin Lamballe, welche H. Osiander a. a. O. 1r Thl. S. 190 nach Saifert erzählt.

**) Die habituellen Schmerzen, an welchen reitzbare Kranke gewöhnlich leiden, übergehen wir hier, in wiefern sie gewöhnlich an örtliche Verbildungen, Entzündungen u. s. w. geknüpft sind.

her, daß eine sehr häufige Reitzung, ein vermehrtes Hinwenden auf das Aeußere veranlaßt, und die Erregbarkeit eben dadurch bis auf einen gewissen Grad immerfort steigert, dann aber lähmt, und werden von hier aus auch über die Ursache der so beträchtlich gesteigerten Sensibilität junger, kunstreich und zärtlich erzogener (d. i. von Jugend auf mit den mannigfaltigsten Reitzen umgebener) Mädchen Aufschluß erhalten können, eine Sensibilität, die sich dann oft durch die sonderbarsten Erscheinungen kund giebt. Hierher gehören die Idiosynkrasien, wo Personen dieser Art den Geruch oder Geschmack gewisser Dinge, ja selbst gewisse Farben oder Töne, so wie die Anwesenheit mancher Thiere (besonders der Katzen, wahrscheinlich zum Theil ihrer starken Elektricität wegen) nicht vertragen können, sondern davon ohnmächtig, zum Erbrechen gereitzt, oder sonst krankhaft afficirt werden; besonders merkwürdig aber ist die aus einem zu starken Eindruck entspringende Nachahmungssucht, welche in einem gewissen Grade auch dem gesunden Menschen, ja schon so vielen Thieren eingeprägt ist, und über deren Grund wir noch einige Betrachtungen beyfügen.

§. 243.

Wenn wir nämlich die verschiedenen Arten der Erregung überhaupt durchgehen, so zeigt sich, daß da, wo noch die Einheit der Organisation unvollkommen, ihr leiblicher Repräsentant, das Nervensystem, noch nicht gebildet ist, eine Erregung von außen auch unmittelbar die Reaktion bedingt; ein Polyp, ein Blatt der Dionaea Muscipula ziehen sich daher unfehlbar zusammen, sobald sie berührt werden. Mit der größern Selbstständigkeit hingegen, der größern Ausbildung der im Nervensystem wirkenden Kraft, wird es immer vollkommner in die Willkühr des Organismus gestellt, ob eine Reaktion erfolgen solle oder nicht. Dieser Gang wiederholt sich vollkommen in einer höhern Sphäre. Die schwächere Individualität, wie sie im Kinde, wie sie zum Theil auch im Weibe erscheint, erkennt leicht, und zwar eben weil sie noch inniger im großen Naturkreise und weniger isolirt lebt, den fremden Willen für den eigenen; unmittelbar, wenn

sie auch zunächst gar nicht auf sie gerichtet war, folgt sie der fremden Willensrichtung, und unbewußt ahmt sie nach. Daher der außerordentliche Nachahmungstrieb der Kinder, daher aber auch das Nachahmen von Thätigkeiten, welche von niedern Organen geübt werden, z. B. der Trieb zum Gähnen, wenn ein Anderer gähnt, die Uebelichkeiten oder das wirkliche Erbrechen, wenn ein Anderer sich erbricht u. s. w.; denn stets je niedriger die Funktion, um so mehr gehört sie der Gesammtheit der Natur an, und um so mehr entfernt sie sich von vernunftgemäßer Einheit und Freyheit. So lange nun dieser Nachahmungstrieb in den Gränzen der Naturgemäßheit bleibt, ist derselbe auch nicht als krankhaft zu betrachten, zeigt es sich jedoch, daß dadurch in einem Organismus, welcher zu freier Willensrichtung bestimmt ist, und sie durch willkührlich geregelte Thätigkeit aussprechen sollte, diese beeinträchtigt, die Freiheit aufgehoben werde, so ist sie krankhaft, und es ergiebt sich, daß, je höher die Reitzbarkeit überhaupt gesteigert ist, die Neigung zu diesem krankhaften Zustande um so größer seyn müsse, Grund genug, um einzusehen, warum die meisten auffallenden Beyspiele krankhafter Nachahmungssucht*) das weibliche Geschlecht, und zwar besonders in den Entwicklungsjahren, wo die Erregbarkeit immer größer ist (s. 211.) darbietet.

§. 244.

Ferner ist eine der sonderbarsten und seltensten Erscheinungen das Erhalten von Sinneseindrücken auf ganz ungewöhnlichem Wege, nämlich durch die Magengegend, oder andere sonst für diese Eindrücke unempfindliche Körperstellen. Manche Schriftsteller zwar haben allen nähern Erörterungen hierüber mit einem Male dadurch ausweichen wollen, daß sie alle Beobachtungen dieser Art geradezu als Täuschungen verwarfen, weil sie nicht mit ihren vorgefaßten Meynungen von dem, was die Natur vermöge, zusammenstimm-

*) So Boethaves bekannter Fall von denen im Waisenhause zu Harlem aus Nachahmungstrieb mit Krämpfen befallenen Mädchen, und ähnliche mehr.

ten. Indeß ist dieß nicht minder thöricht, als bey Aufnehmung so seltener Erfahrungen nicht mit der möglichsten Umsicht und Schärfe zu Werke zu gehen, weßhalb wir H. Osiander*) sehr beypflichten, wenn er gegen die erstern den Montaigne anführt, welcher die Art über Aehnliches im Voraus abzuurtheilen bitter tadelt, und gedenken hierbey auch Leibnitzens, welcher bey Gelegenheit des Atheismus bemerkt, daß Leichtgläubigkeit und Ungläubigkeit sich oft sonderbar vermischen, ja daß zuweilen nur der eigene Vortheil diktirt, was geglaubt und was nicht geglaubt werden solle**); — eine Meynung, welche vielleicht ganz besonders an solche Aerzte erinnern könnte, bey denen nichts Glauben findet, was der bequemen Praxis des Receptschreibens hinderlich werden möchte.

§. 245.

Fragt man aber zuvörderst, ob Erscheinungen dieser Art wirklich mit der Natur des menschlichen Körpers, wie wir sie sonst kennen, in vollkommnem Widerspruch stehen oder nicht, so scheint uns soviel sicher, daß allerdings eigentliches Sehen, eigentliches Hören u. s. w. außer mittelst der für diesen Sinn bestimmten Werkzeuge nicht Statt finden könne; allein dieses anzunehmen finden wir auch in den zu erwähnenden Beobachtungen keinen Grund, indem man insbesondre festhalten muß, daß die Natur ein Ganzes, in unendlichen Kräften sich wechselseitig Durchdringendes ist, daß alle Dinge durch einander existiren, daß daher in einem des Gefühls fähigen Körper die mannigfaltigen äußern Veränderungen auch als Umstimmungen dieses Gefühls sich nothwendig abspiegeln müssen, wobey es jedoch geschehen kann, daß nur ein Theil dieser Umstimmungen zum Bewußtseyn kommt, ja daß sie schon ohne Bewußtseyn die Thätigkeit des Körpers umändern (wohin die Triebe und Instinkte niederer Thiere (§. 231.) gehören). Nun ist aber überhaupt das,

*) A. a. O. 2r Thl. S. 304.

**) S. Geist des H. v. Leibnitz u. s. w. Aus d. Franz. übersetzt. Wittenberg 1775. 1r Thl. S. 70.

was wir Wahrnehmen äußerer Gegenstände nennen, bekanntlich keineswegs ein Wahrnehmen der Dinge an sich, sondern das Wahrnehmen eines Bildes, welches die Phantasie erzeugt, angeregt von den verschiedenartigen Reitzungen des Körpers; und eines Bildes zwar, welches aus den Farben gemalt ist, welche die einzelnen Sinnesformen darbieten, und in welchem daher beym Mangel einzelner Sinnesformen auch die Farben mangeln müssen, welche diesen mangelnden Sinnen entsprechen, so daß ein Blindgeborener daher wohl in Tönen, nach Gefühls-, Geruchs- und Geschmacksempfindungen Vorstellungen haben wird, aber nicht nach Farben und Licht. So wie nun aber z. B. ein Mensch ohne Füße wohl sich fortbewegen lernt, dieses Fortbewegen aber nie Gehen genannt werden kann, so kann nun wohl der Mangel oder die Unthätigkeit eines Sinnes, z. B. des Gesichts, durch eine andere Wahrnehmung ersetzt werden, allein dieß ist nicht Sehen zu nennen; und hier liegt nach unserm Dafürhalten der Hauptknoten in dem Verständniß der fraglichen Erscheinungen.

§. 246.

Nämlich auch die innere, nicht unmittelbar von äußern Erscheinungen angeregte Thätigkeit der Phantasie bildet in den sinnlichen Formen, daher glauben wir einen lebhaft gedachten Gegenstand zu sehen, wir glauben zu hören, zu sehen u. s. w. im Traume, und doch sehen wir eigentlich nicht. So nun auch, wenn das unmittelbare, nicht durch die einzelnen Sinnesformen erregte Gefühl eines äußern Einflußes, dessen Stimmung unser Inneres mit durchdrungen hat, wirklich zum Bewußtseyn gelangt, wird es doch angeschaut werden unter der Form der gewohnten Sinne, welches man im gemeinen Leben sehr passend im Geiste sehen, hören u. s. w. nennt. Z. B. ein Mensch, welcher mit plötzlich gelähmtem Gesicht und Gehör in einen kühlen grünen Wald versetzt würde, und sich durchdrungen fühlte von der frischen Natur, dem eigenen Duft der Blätter und der erquickenden Kühle, dessen Phantasie würde angeregt werden, wenn er früher oft an ähnlichen Orten gewesen wäre, sich den

Wald selbst, das Grün der Blätter, das Geräusch des Windes in den Zweigen auszubilden, ja er würde bey lebhafter Phantasie endlich dieses selbst zu sehen, zu hören glauben, und es ist deutlich, daß dieses Phantasiebild der Wirklichkeit um so mehr entsprechen würde, je lebendiger der Mensch von dem Gefühle dieser Natur durchdrungen war.

§. 247.

Nun ist aber schon mehrmals bemerkt worden, daß der niedere Organismus nothwendig zugleich inniger in der Natur lebt, mehr von ihr durchdrungen wird, als der höhere, und hierauf müssen wir Rücksicht nehmen bey jenen Beobachtungen der scheinbaren Versetzungen der Sinne. — Auch der Mensch nämlich enthält zugleich eine niedere und eine höhere Natur in sich, und es ist klar, daß die niedere Sphäre insbesondre geeignet seyn müsse, von äußern Verhältnissen dergestalt durchdrungen zu werden, daß an diesen innern Modifikationen unmittelbar, in sofern sie durch die vom Aeußern abgezogene und in ihr Inneres schauenden Seele wahrgenommen werden, die Erkenntniß jener äußern Verhältnisse möglich wird, wobey natürlich wieder durch die Phantasie eine solche Vorstellung in die gewohnten Sinnesformen eingebildet werden, und der Mensch glauben muß, diese Gegenstände zu sehen, zu hören u. s. w., obwohl er sie eigentlich vielmehr in einem dem Aeußern wahrhaft entsprechenden Traume wahrnimmt. — Wie weit übrigens die Sphäre dieser Wahrnehmung gehen könne, läßt sich a priori durchaus nicht bestimmen. Der Geist ist über Zeit und Raum, Zeit und Raum sind vielmehr in ihm, und wenn wir bestimmte Beyspiele haben, daß selbst Thiere die Gegenwart von Personen, zu welchen sie große Anhänglichkeit hatten, in einer Entfernung, wo die gewöhnlichen Sinne nicht hinreichten, empfanden, wie dürften wir hier dem Menschen ein non plus ultra willkührlich vorschreiben wollen? — Es gilt hierbey viel mehr treu und unbefangen zu beobachten, welche merkwürdige Erscheinungen die Natur hier uns darbietet, als ihr im Voraus Gränzen ziehen zu wollen.

§. 248.

Fragt man übrigens, welches die niedere Sphäre sey, durch welche der Mensch zu Perceptionen der erwähnten Art fähig werde, so kann hier keine als die Sphäre der Reproduktion gemeynt seyn, welche, in wiefern ihre Sensibilität sogar an den Träger eines eigenen Nervensystems geknüpft ist, noch mehr zu diesen Erscheinungen geeignet wird; womit denn übrigens die Geschichten dieser Erscheinungen selbst übereinstimmen, indem man immer bemerkt hat, daß vorzüglich die den Centralpunkten der Reproduktion, d. i. der Gegend zwischen Herz, Magen und Leber am meisten genäherten Partien des Körpers solcher Perceptionen fähig waren, obwohl wir deßhalb dieser Gegend nicht das Vermögen des Gesichts, des Gehörs u. s. w. selbst zuschreiben können. — Warum hätte man denn wohl nie bemerkt, daß eine Kranke vorgab, mit den Ohren zu sehen? mit den Augen zu hören? mit dem Gehirn überhaupt Sinneswahrnehmungen zu haben? — Warum finden wir überall, selbst bey Personen, welche ihrer geringen Bildung nach unwiderleglich von ärztlichen Hypothesen keine Sylbe wußten, immer wieder die Magengegend als durch diese Sensibilität hervorgehoben? —

§. 249.

Ehe wir nun ganz von dieser Digression zurückkehren (welche wir übrigens nicht gemacht haben würden, wären die hier zur klarern Einsicht doch unumgänglich nöthigen Ideen in den Physiologien bereits allgemein klar genug entwickelt zu finden), nur noch einige Worte über die Möglichkeit des Wahrnehmens eigener innerer Körpertheile in solchen exaltirten Zuständen. Auch dieses nämlich können wir nur als Phantasiebilder, oder wenn man lieber will, als Träume von den Gestalten dieser einzelnen Organe betrachten, und es scheint wohl natürlich, daß wenn Umstimmungen des Gemeingefühls wahrhafte Vorstellungen von Außendingen veranlassen, auch die Organe an und für sich selbst Vorstellungen, und zwar von ihrem eigenen Zustande, erregen. Ja es liegt wohl hierin noch eine bestimmtere Rechtfertigung obiger An-

sicht, denn wäre es nicht ein Widerspruch, wenn man sagte, daß ein Organ sich selbst sähe? sieht ja doch sogar das Auge nicht sich selbst. Vielmehr deuten alle diese Erscheinungen so wie das Gefühl, welches in schweren Krankheiten nicht selten bemerkt wird, und mir bey einem bösartigen Nervenfieber durch eigene Erfahrung bekannt wurde, wo der Kranke nämlich sich doppelt glaubte und einzelne seiner Glieder als zu einem andern Körper gehörig betrachtete, — daß hier Träume (welche indeß auch der Wirklichkeit zuweilen in hohem Grade entsprechen können) sich gestalten. — Eben deßhalb ist aber auch auf die Richtigkeit dieser Vorstellungen nicht zu viel zu geben, denn wenn schon beym wirklichen Sehen viel davon abhängt, wie man sieht, und das rechte Sehen erst erlernt werden muß, ja um so mehr gesehen wird, je mehr man weiß, so können in solchen ungewöhnlichen Wahrnehmungen, und zwar oft sehr unwissender Menschen, große Täuschungen leicht Statt finden, ohne daß man diese Irrthümer deßhalb allein als Belege absichtlichen Betrugs aufstellen darf. — Endlich ergiebt sich aber auch hieraus, daß auf diese Weise die Phantasie keine Bilder erhalten wird, deren sie nicht bereits auf anderem Wege fähig geworden ist; so z. B. daß keiner Blindgebornen durch Magengegend oder Fingerspitzen u. s. w. Gesichtsvorstellungen angeregt werden können, obwohl eine Blindgewordene deren hierdurch eben so lange erhalten könnte, als ihr die Erinnerungen des Gesichtssinnes zurückbleiben.

§. 250.

Was nun die einzelnen Fälle solcher scheinbaren Sinnesversetzungen betrifft, so sind deren allerdings noch zu wenige genau beobachtet, als daß man angeben könnte, unter welchen Umständen und bey welchen Individuen sie vorzüglich bemerkt wurden; jedoch scheint es, als ob sie meistens nur in Verbindung mit andern ungewöhnlichen Stimmungen der Sensibilität, nämlich entweder in dem durch eigene Naturthätigkeit oder durch Kunst entstandenen Somnambulismus, oder bey krampfhaften Zuständen, und namentlich bey der

hysterischen Catalepsis vorkommen. Als Gelegenheitsursachen zu Entstehung dieser Zufälle hat man vorzüglich häufig Regelwidrigkeiten der Menstruation, insbesondre die plötzliche Unterdrückung derselben und heftige Gemüthsbewegungen beobachtet. Die Subjekte waren theils schwächliche reitzbare Personen von feiner Erziehung, theils aber auch Personen aus der niederen Volksklasse und an starke körperliche Arbeiten gewöhnt. Zu den letztern gehört der von Dr. Renard bekannt gemachte, durch das gerichtliche Zeugniß zweier andern Aerzte und eines Predigers beglaubigte Fall einer Taglöhnersfrau von 23 Jahren, welche im kataleptischen Zustande durch Magengegend und Fingerspitzen hörte *), und zwar nicht nur wo diese Theile unmittelbar vom Laute getroffen wurden, sondern auch dann, wenn nur eine Zuleitung zu diesen Theilen, z. B. durch eine Kette von mehreren Personen gebildet worden war. Eben so gehören zu den Fällen der Sinnesversetzung in kataleptischen Zuständen die von Petetin gemachten Beobachtungen **), welcher zuerst die Aufmerksamkeit der Aerzte auf diesen Gegenstand lenkte. Von den sogenannten Sinnesversetzungen bey von selbst entstandenem oder künstlich erregtem Somnambulismus, so wie den dabey nicht selten beobachteten ziemlich wahrhaften Träumen vom innern Körperbau enthalten die zahlreichen Schriften über animalen Magnetismus Beyspiele in Menge. Ein äußerst merkwürdiges Beyspiel einer ohne Catalepsis und Somnambulismus entstandenen Sinnesversetzung, nämlich des Erregens von Gesichtsvorstellungen mittelst der Fingerspitzen, würde hingegen die neuerlich Aufsehen erregende Miß Mavoy in England darbieten, sobald die Thatsache selbst hinlänglich festgestellt wäre ***).

---

*) Hufeland's Journal f. d. pr. Heilk. 1815. 2s St.

**) Man s. diese Beobachtungen nebst andern von D. Renard als Einleitung zum eben angeführten Aufsatze.

***) Die Bemerkungen, welche H. Nees v. Esenbeck im Archiv f. d. thier. Magnetism. III. Bd. 2s St. hierüber mittheilt, zeigen allerdings, daß man mehr Ursache habe, die Thatsache für wahr als für erdichtet anzunehmen.

§. 251.

Endlich kommen wir zu den sonderbarsten und seltensten Erscheinungen der aufgeregten Sensibilität, wo die Schranken des Raumes und der Zeit fast aufgehoben scheinen, und wohin zuerst das Schauen oder Fühlen von Gegenständen gehört, welche nach der gewöhnlichen Weise sinnlicher Wahrnehmung nicht zu erkennen waren. Auch dieses ist selten als einzeln vorkommende Erscheinung, sondern gewöhnlich als Symptom des Somnambulismus beobachtet worden; jedoch würde das Beyspiel der Mad. Pedegache in Spanien, welche das Vermögen besessen haben soll, in das Innere der Körper zu schauen, hierher gerechnet werden müssen, dafern sichere und glaubwürdigere Nachrichten darüber vorhanden wären *). Ein merkwürdiges, von erfahrenen Zeugen beglaubigtes und durch Versuche erprobtes Beyspiel einer hohen rabdomantischen Sensibilität bey einem ohngefähr 20 Jahr alten, sich sonst dem Aeußern nach wohl befindenden Frauenzimmer, von blaßer Farbe, schlankem Wuchs und lebhaftem Gemüth, ist dagegen das vom Bergmeister F. Glinsberg in Arau bekannt gemachte **), wo eine Richtung von Steinkohlenlagern durch dieselbe angegeben wurde, welche dem Bergmeister unerwartet und unbekannt, demohnerachtet durch die Nachgrabung bestätigt worden war. Die Empfindungen, durch welche sie das Verhältniß der Fossilien entdeckt, sind Engbrüstigkeit, Zuckungen, Schweiß, bey Steinkohlen schwefelartiger Geruch u. s. w. Sie gab zu Elgg die Mächtigkeit des Flötzes ziemlich bestimmt an und bezeichnete den Platz einer verborgenen Quelle richtig.

§. 252.

Weit häufiger sind dagegen ähnliche Erscheinungen in den sogenannten magnetischen oder auch in kataleptischen Zuständen beobachtet worden, allwo denn auch das Vorgefühl zukünftiger Dinge oft mit besonderer Schärfe hervortritt. Von

*) S. darüber H. Oslander über d. Entwicklungskrankheiten im 1s u. 2n Thle.

**) Archiv schweizerischer Aerzte. 1r Jahrg. 1s Hft. 1816. S. 56.

beyden wollen wir nur einige Beyspiele erwähnen. So erkannte z. B. des Dr. Renard kataleptische Kranke Personen in andern Zimmern und die Beschäftigung derselben, so wie Geldsummen, Schlüssel u. s. w. in den Taschen der Anwesenden*); so sagte dem Hofmedikus Klein eine von selbst in Somnambulismus gerathene Kranke von 21 Jahren am 30. Juny 1812 auf eine an sie gerichtete Frage: daß eine gewisse Frau den 20. July mit einem Knaben leicht niederkommen, der Arzt aber nachher sich in Acht zu nehmen haben werde, welches pünktlich eintraf, indem den 20. July die Geburt eines Knaben sehr leicht erfolgte, der Hofmedikus Klein hingegen einen ganzen Vormittag wegen Einsackung der Nachgeburt bey der Entbundenen zu thun hatte**). Daß übrigens diese Vorgefühle und bestimmtern Voraussagungen ebenfalls ohne somnambulen Zustand vorkommen, ist wohl unläugbar; Belege davon können mehrere von H. Osiander über das Ahnungsvermögen gesammelte Erfahrungen werden***), so wie als einer der schönsten Fälle des Hinausschauens über die gewöhnlichen Schranken der Sinne die Geschichte des Mädchens von Orleans †) erscheint, deren sittliche Schönheit zugleich aus den trockensten Kriminalakten so rein hervorleuchtet, daß sie einen großen deutschen Dichter zu einer unsterblichen Schöpfung entzünden konnte.

§. 253.

Wirft man aber hierbey wieder die Frage auf, über Vereinbarkeit dieser, mit den andern physiologischen Erschei-

*) A. a. O. S. 72 u. 75.

**) Hufelands Journal d. pr. Heilk. 1815. 2s St. S. 112.

***) Ueber d. Entwicklungskrankheiten in d. Blüthenjahren d. weiblichen Geschlechts. 1r Thl. S. 111 u. f.

†) Man lese die aktenmäßige Geschichte derselben in Gayot von Pitaval sonderbaren und merkwürdigen Rechtsfällen, deutsch, von C. W. Franz. Jena 1792. 4r. Thl. — Sie war nie menstruirt, obwohl, wie durch die Untersuchung der Königin von Sicilien und zwey anderer Damen erwiesen, eine vollkommne und reine Jungfrau. Ihre Seherabgabe, ihre Kraft und Entschlossenheit im Felde, ihre Einfachheit und kindliche Unschuld leuchten aus jedem Zuge hervor.

nungen, so glauben wir weder zu Ausnahmen von übrigens gültigen Naturgesetzen, noch zu einem mystisch verzierten Dualismus, welcher den Geist hier etwas weiter aus der Kapsel des Körpers hervorsehen läßt, unsere Zuflucht nehmen zu müssen, sondern wir weisen nur wieder auf die obigen Ansichten (§. 246 u. 47.) von Durchdringung des Einzelnen durch das Ganze, von dem Menschenleben als integrirendem Theil des Naturlebens zurück, und finden es mit dieser Einheit, in welcher Alles sich wechselseitig bestimmend fortwirkt, vollkommen übereinstimmend, daß unter zwey Bedingungen der Wahrnehmungskreis der innersten menschlichen Einheit, d. i. der Menschenseele, in Zeit und Raum beträchtlich erweitert werden könne, nämlich: erstens wenn der Mensch der Natur sich vollkommen hingiebt, gleichsam in ihr untergeht (in welcher Hinsicht wir die wohlthätigen Instinkte bey Kranken, die Ahnungen bevorstehender Naturereignisse u. s. w. *) betrachten); zweytens wenn der Mensch die Natur geistig in sich aufnimmt, die Natur sich unterwirft, ohne dadurch Kraft, Freyheit und Klarheit des Geistes aufzugeben, sondern vielmehr im erhöhten Besitzgefühl derselben (ein nur Wenigen, von den Banden der irdischen Begehrungen Befreiten, eigenthümliches Vermögen, welches das Volk gewöhnlich nur Heiligen, und in einem gewissen Sinne sehr mit Recht zugeschrieben hat). — Daß übrigens hier, wenn von Krankheit die Rede ist, nur das unter der ersten Bedingung entstandene Fernschauungs- und Ahnungsvermögen gemeynt seyn kann, liegt am Tage.

§. 254.

Noch bleiben uns nun die krankhaften Erscheinungen der Muskularthätigkeit und Reproduktion, durch abnorme Nerveneinwirkung veranlaßt, zu betrachten übrig. Was die abnorme Muskularthätigkeit betrifft, so kommen die Zufälle derselben in den Entwicklungsperioden des weiblichen Geschlechts vorzüglich bey an und für sich reitzbaren und schwächlichen Subjekten in der Form von Lähmungen dann

*) Auf diese Weise sind ja eben auch die Vorgefühle der Thiere erklärbar.

vor, wenn durch vorausgegangene frühzeitige Ausschweifungen Ueberreitzung Statt gefunden hat, und durch die entstandene Schwäche die vollkommne Ausbildung des Geschlechtscharakters gehindert wird; oder wenn sehr heftige Gemüthsbewegungen plötzlich einwirkten. Im Ganzen pflegt indeß gerade dieser Krankheitszustand doch weit weniger häufig, als andere einzutreten, da er zu sehr mit der in dieser Zeit für den Organismus natürlichen Stimmung in Widerspruch steht; wenigstens ist er gemeiniglich nur vorübergehend, und erscheint dann oft mehr als Erstarrung, vorzüglich als Catalepsis. Häufiger kommen dagegen die eigentlichen Krämpfe vor, und zwar zuweilen mit einer Heftigkeit, welche alle Beschreibung übersteigt *), man bemerkt hierbey Tetanus, Opisthotonus, wobey der Körper, völlig im Sprenkel gebogen, sich nur auf Ferse und Hinterhaupt aufstützt, Trismus u. s. w. — Mitunter beschränken sich wohl auch diese Krämpfe auf einzelne Theile, bestehen z. B. in heftigem Kopfschütteln **), oder taktmäßigen Gliederbewegungen (Veitstanz), verbinden sich mit Somnambulismus u. s. w. — Auch diese Zufälle werden übrigens vorzüglich bey sehr reitzbaren Individuen, und besonders nach Gemüthsleiden beobachtet, bestehen nicht selten (wie in dem unten angeführten ersten Falle von Brandis) mit regelmäßiger Menstruation, sind gewöhnlich äußerst hartnäckig und spotten oft der wirksamsten innern Arzneymittel.

§. 255.

Endlich bemerken wir auch den Einfluß solcher Verstimmungen des Nervensystems auf den Gang der reproduktiven Funktionen im Ganzen zwar immer, aber in einzelnen Fällen an besonders auffallenden Erscheinungen. Hierher rechnen wir namentlich das lange Entbehren von Nahrungsmitteln, welches vorzüglich bey weiblichen Individuen bemerkt

*) Man lese z. B. nur die Schilderung der Krämpfe, welche der Arzt Brandis bey einem 19jährigen Frauenzimmer beobachtete. (Hufeland's Journal d. prakt. Heilk. 41. Bd. 2. St. S. 9.).

**) S. einen ausgezeichneten Fall dieser Art bey Brandis a. a. O. S. 19.

wurde, und allerdings gerade wegen der überhaupt thätigern Reproduktion hier weniger überraschend, ja im Allgemeinen wohl nicht so unbegreiflich scheinen kann, als man großentheils glaubt. Der Körper nämlich, dessen Existenz nur eben in einer stäten Verwandlung, in einem stäten Wechsel von Aufnahme und Zerstörung besteht, hat zwey Wege, diese Existenz zu sichern, entweder die Assimilation zu erhöhen, oder die Exkretion zu mindern, durch den Stand welcher Faktoren sich denn viele Erscheinungen erklären lassen. So sehen wir in acuten Krankheiten oft bey Hemmung so vieler Lebensäußerungen auch diesen Stoffwechsel sehr zurückgetreten und die Existenz durch eine äußerst geringe Stoffaufnahme lange Zeit unterhalten, mit welcher immer noch die, wenn auch oft sehr merkliche Stoffabnahme des Körpers in keinem Verhältnisse steht; so finden wir auch bey vielen Thieren (z. B. Amphibien und Fischen) eine lange Lebensdauer ohne merkliche Stoffaufnahme unschwer möglich, und daß dieß ganz besonders während der Entwicklungsperioden vorkomme, scheint in der Natur des Organismus begründet, welcher hier (eben so wie in Krankheiten, deren Ganzes immer wieder als organische Entwicklung betrachtet werden muß) zu sehr in sich beschäftigt ist, und dadurch in schwächere Wechselwirkung mit der Außenwelt tritt, weßhalb wir vorzüglich an Thieren, wenn sie sich verwandeln, eine sehr verminderte Nahrungsaufnahme bemerken. Raupen z. B. hören auf zu fressen, wenn sie sich einspinnen, und daß gerade, wenn in der Puppe das Thier zum Schmetterlinge umgestaltet wird, eine äußere Ernährung gar nicht weiter Statt findet, ist bekannt; eben so fressen Vögel in der Mause weniger u. s. w.

§. 256.

Finden wir nun zur Zeit der Entwicklungsperiode ähnliche Erscheinungen im Menschen, so sind wir gewiß nicht berechtigt, dieselben, ihrer Unmöglichkeit wegen, stets für absichtliche Betrügerey zu erklären, und wenn gleich in mehrern Fällen theils in Folge unvorsichtigen ärztlichen Benehmens, theils durch gleichzeitig erwachte Eitelkeit der Kranken (s. §. 236.) Uebertreibungen der Thatsachen Statt ge-

funden haben, so sind doch theils diese Fälle selbst *) theils andere **) Beweis genug, daß der weibliche Körper in gewissen Stimmungen wirklich mit außerordentlich geringer Nahrung lange Zeit ausreichen könne. — Weit seltner hingegen, und nur in Folge außerordentlicher Umänderungen der Organisation, wird das Hemmen der Athmungsfunktion der Lungen beobachtet, wohin der von H. Osiander angeführte Tacconi'sche Fall gehört, wo ein Mädchen, nachdem es im fünften Jahre einen Sturz aus dem Fenster erlitten (also doch wahrscheinlich eine heftige Hirnerschütterung Statt gefunden hatte), 10 Jahre lang ohne alles bemerkliche Athemholen (die Athmungsbewegung hängt bekanntlich im hohen Grade vom Gehirn ab) zugebracht, und also ohne kleinen Kreislauf (demnach auf bloße Hautrespiration beschränkt) gelebt hatte ***). Eine Erscheinung, welche indeß, wenn wir das überhaupt geringere Athmungsbedürfniß im weiblichen Geschlecht (§. 59.) ausnehmen, doch in zu entfernter Verbindung mit der Geschlechtseigenthümlichkeit steht um weitere Erörterungen darüber hier zu erlauben.

§. 257.

Wir kommen nun, nachdem wir eine Schilderung dieser mannigfaltigen, sonderbaren, vom Nervenleben ausgehenden, oder in ihm sich vorzüglich äußernden Entwicklungskrankheiten gegeben haben, zu einem sehr schwierigen Punkte, nämlich zu der Lehre von der Behandlung derselben. Es ist aber hier beynahe derselbe Fall, wie in der Behandlung der Gemüthskrankheiten und Geistesverirrungen überhaupt, wo durch die dunkeln Vorstellungen vom Verhältniß

*) S. Osiander über d. Entwicklungskrankheiten. 1r Thl. S. 183.

**) So erzählt Adair in seinem philosoph. medicin. Abriß d. Naturgeschichte d. Menschen, aus d. Engl. überf. v. Michaelis. 1788. S. 195. das Beyspiel einer gewissen Johanna Naunton, welche 67 Tage ohne alle Nahrung, außer etwas Citronensaft von Zeit zu Zeit, zubrachte, so wie den Fall einer Schwindsüchtigen, welche 35 Tage blos von Wasser, mit einigen Tropfen Spiritus nitri dulcis vermischt, lebte.

***) S. Osiander a. a. O. S. 187.

dessen, was wir Seele nennen, zum Körper, die verschiedensten Ansichten erzeugt worden sind. — Hier können und sollen nur kürzlich diejenigen Regeln zusammengestellt werden, welche Vernunft und Erfahrung als die mindest zweydeutigen und als die einfachsten darstellen.

§. 258.

Zuerst aber bemerken wir in dieser Hinsicht, daß, indem offenbar in so vielen Fällen es sich erkennen läßt, wie Störungen in den niedern Funktionen auf die höhern zurückwirken, es das vorzügliche Augenmerk des Arztes seyn müsse, in den oben betrachteten Zufällen der Entwicklungsperiode des weiblichen Geschlechts den Stand der niedern organischen Verrichtungen genau zu untersuchen, auf krankhafte Zustände der Verdauungswerkzeuge, Verschleimung, Obstruktionen, fehlerhafte Gallenabsonderung, hinlängliche Rücksicht zu nehmen, ferner den Zustand des Lymphsystems so wie des Gefäßsystems und insbesondre der venösen Gefäße, endlich aber die Bildung und Thätigkeit der Geschlechtsorgane zu beachten. Finden sich nun hier auf irgend eine Art bedeutende Störungen vor, so wird die Behandlung und Beseitigung derselben, nach den Regeln, welche theils die specielle Therapie, theils die Lehre von den Geschlechtskrankheiten aufstellt, den Arzt stets zuerst beschäftigen müssen, indem entweder das Leiden des Nervensystems selbst hierdurch verschwinden, oder doch eine die Heilung desselben erschwerende oder gänzlich hindernde Complication dadurch entfernt werden wird.

§. 259.

Einen zweyten Hauptpunkt ärztlicher Behandlung muß ferner die Untersuchung und Regulirung der gesammten Lebensordnung der Kranken ausmachen. Es wird ganz vergebens seyn, für die meisten Fälle von Krämpfen, von überspannter Empfindlichkeit u. s. w. einen noch so zweckmäßigen Heilplan zu entwerfen, gelingt es dem Arzte nicht, die vielfachen Diätfehler, den Mißbrauch von warmen, erhitzenden und erschlaffenden Getränken, die Reitzung der Phantasie durch ungewöhnte [illegible] und unpassenden Umgang, das Nachtschwärmen und

so viele andere Sprossen eines immer weiter greifenden, immer mehr von Naturgemäßheit zurückweichenden Luxus zu verbannen. Man eröffne daher die Behandlung damit, solchen Kranken, ihren Umständen gemäß, eine Lebensordnung von der Zeit des Aufstehens bis zum Schlafengehen vorzuzeichnen, ihnen, wenn es die Umstände erlauben, eine zweckmäßige körperliche Beschäftigung, häusliche Arbeiten u. s. w. zur Pflicht zu machen, und halte mit Festigkeit auf der pünktlichen Befolgung dieser Vorschriften. Findet man aber die Kranken unfolgsam, findet man, daß sie nach eigenem Gutdünken sich Abweichungen erlauben, wie dieß wohl namentlich in manchen mit Einbildungen überhäuften Individuen aus den höhern Ständen der Fall zu seyn pflegt, so gebe man lieber, wenn Gegenvorstellungen nicht beachtet werden, eine Behandlung auf, bey welcher weder für die Kranke Erfolg, noch für den Arzt Freude zu hoffen ist.

§. 260.

Ein dritter für die Behandlung dieser so wie anderer Krankheiten besonders wichtiger Gegenstand ist die Beseitigung der entfernten Ursachen. Indem nun aber in Krankheiten niederer organischer Systeme, so wie in der Lebensweise vorzüglich häufige Veranlassungen zu den genannten Leiden des Nervensystems gegeben sind, wird allerdings durch die Befolgung der in den beiden vorigen Paragraphen gegebenen Regeln ein großer Theil der gegenwärtigen Indikation erfüllt, obwohl auch außerdem noch manches zu thun übrig bleibt. Namentlich gehört aber hierher die allmählige Verbesserung allgemeiner Constitution, besonders Verminderung der unglücklichen krankhaften Reitzbarkeit, worin allerdings durch anhaltendes Fortwirken auf dem rechten Wege viel geschehen kann, namentlich indem man Veränderung des Aufenthalts, Benutzung mineralischer Bäder, innerer und äußerer Mittel zur Erhöhung kräftiger Muskularthätigkeit und Reproduktion zu Hülfe ruft. Außerdem ist aber Verhütung der Gelegenheitsursachen, wohin besonders heftige Gemüthsbewegungen und Ausschweifungen gehören, zu berücksichtigen, ja es kann selbst, nachdem irgend gewaltsame Gemüthserschütterungen Statt ge-

habt haben, oder längere Zeit hindurch niederdrückende Stimmungen das psychische Wohlseyn der Kranken störten, ein ruhiges und angemessenes Benehmen des Arztes sowohl, als der von ihm geleiteten äußern Umgebungen, ein Benehmen, durch welches der Kranken das Auffassen des rechten Gesichtspunktes für die Würdigung widriger äußerer Verhältnisse erleichtert wird, sehr viel zum Unschädlichmachen dieser Gelegenheitsursachen beytragen, wobey wir noch bemerken, daß wenn der Arzt in sich selbst nicht diejenige Individualität fühlt, welche auf diese Weise für die Kranken heilbringend werden kann, es dann sehr zu wünschen ist, daß er den Beystand eines erleuchteten Geistlichen oder erfahrenen Freundes suche, auf keine Weise aber die Krankheit von dieser Seite zu bekämpfen völlig unterlasse.

§. 261.

Viertens aber ist es die Aufgabe des Arztes, auf das gestörte Nervenleben selbst einzuwirken, und sein Normalverhältniß herzustellen, wozu ihm, unserer Ansicht nach, drei Wege offen stehen. — Entweder nämlich erregt er Veränderungen in den niedern organischen Systemen, welche den Einwirkungen der Außenwelt überhaupt am meisten zugänglich sind, und bewirkt dadurch mittelbar wohlthätige Umstimmungen im Nervenleben; oder er bedient sich solcher Mittel, welche das Nervenleben unmittelbarer in Anspruch nehmen, wohin die narkotischen, geistigen, antispasmodischen Arzneystoffe gehören, obwohl auch bey diesen vorzüglich und zunächst vielleicht mehr das Bildungsleben des Nerven und durch dieses die sensible Thätigkeit afficirt wird, in wiefern diese Stoffe als materielle Bestandtheile des Körpers aufgenommen werden und in das Gefäßsystem eingehen müssen, um ihre Wirkung zu zeigen. Drittens endlich benutzt der Arzt die imponderabeln Einflüsse, welche ohne irgend nachweisbare Stoffübertragung die Umstimmung des sensiblen Lebens unmittelbar bewirken, und von welchen denn eine Stufenfolge sehr verschiedener Thätigkeiten aufzuführen ist, welche wir so ordnen möchten: Wärme und Kälte, Licht und Finsterniß, tellurischer Magnetismus, Elektricität, Galvanismus,

thierischer Magnetismus, psychische Einwirkung; und wir bemerken hierbey, daß uns kein wahrer Grund vorhanden zu seyn scheint, welcher die Meynung einiger Gelehrten rechtfertigen könnte, daß die meisten dieser, oder alle diese Erscheinungen im Innern gleichartig und nur verschiedene Formen einer derselben, namentlich der Elektricität oder des Galvanismus wären; bloße Aehnlichkeit einzelner Aeußerungen dieser Thätigkeit kann hierfür nicht beweisend seyn, und das qualitativ Verschiedene derselben leuchtet deutlich genug hervor, zwar sind sie insgesammt Aeußerungen des allgemeinen Naturlebens, allein so wenig wir berechtigt sind, im individuellen Organismus Gefäßthätigkeit, Muskelkraft, chemische Vorgänge als bloße Modifikationen etwa der Nerventhätigkeit oder daß etwas zu betrachten, sondern alles dieses als eigenthümliche Zweige des einen Lebens erkennen müssen, so auch ist dieß bey jenen Thätigkeiten der Fall. — Wir werden nun diese einzelnen Behandlungsweisen, in wiefern sie allerdings in den eben betrachteten Krankheiten, sobald dieselben wirklich idiopathische Nervenleiden sind, von vorzüglicher Wirkung seyn, ja die eigentlichen und wesentlichen Heilmittel derselben darstellen müssen, näher erörtern, und zwar mit Hinsicht auf die abgehandelten besondern Krankheitszustände, wodurch denn das für einzelne Fälle passende Verfahren aus dem Zusammenhalten der Natur der Krankheit und der Lehre von der Wirkung dieser Mittel sich leicht von selbst ergeben wird.

§. 262.

Zunächst aber die Behandlung der Nervenleiden durch Einwirkung auf die niedern Systeme betreffend, so könnte man dieselbe auch die antagonistische Methode nennen und mehrere Arten derselben unterscheiden. Wir rechnen dahin: 1) die ausleerende Methode, welche bestehen kann in der Anwendung von Brech- und Abführmitteln, oder in Vermehrung anderweitiger Sekretionen, oder in Blutentziehungen. — Was die Brech- und Abführmittel anbelangt, so bemerkt man dieselben von besonderer Wirksamkeit in allen überspannten Zuständen mit kräftigem Wirkungsvermögen und zwar insbesondre wenn die Krankheit nicht blos in ungewöhn-

lichen Geistesrichtungen, sondern auch in Verstimmung des körperlichen Zustandes sich äußert, als z. B. im Schlafreden, Schlafwandeln, Alpdrücken und bey mehrern Arten von Krämpfen, sobald sie vollsaftige, kräftige Subjekte befallen. Noch mehr wird indeß diese Methode angezeigt seyn, wenn Neigung zu gastrischen Zuständen, Obstruktionen, Drüsenanschwellungen u. s. w. vorhanden ist, existiren indeß diese oder ähnliche Krankheiten wirklich, so werden resolvirende und abführende Mittel schon nach den §. 258. erwähnten Regeln sich nothwendig machen. Die Wahl der einzelnen Mittel und ihre Dosen müssen sich nach der Individualität der vorkommenden Fälle richten, jedoch werden leichtere Brechmittel (Ipecacuanha auch in refracta dosi zur Ekelkur), namentlich bey den mehr durch gewaltsame Gemüthsaufregung sich äußernden Krankheiten, Fantasterey und Schwärmerey, krankhafter Reitzbarkeit der Sinnesorgane u. s. w. nützlich wirken, dahingegen drastische Abführungen aus Jalappa, Mercur. dulc. Fol. Sennae u. s. w. von Zeit zu Zeit angewendet, mehr bey blödsinnigen Zuständen, bey phlegmatischen Subjekten, mit verschleimtem Darmkanal und Wurmbeschwerden, blande Abführungen (durch Mittelsalze, Electuaria lenitiva, und was bey sehr sensibeln Körpern sich vorzüglich empfiehlt, durch Oleum Ricini) vorzüglich bey entzündlicher Diathesis, Congestionen u. s. w. nützlich werden.

§. 263.

Von den Erregungen anderweitiger Sekretionen erwähnen wir zuerst die künstlich bewerkstelligte und unterhaltene Eiterung durch Fontanelle, Haarseile oder offen erhaltene Vesicatoria; Mittel, welche namentlich wo die Krankheit nach plötzlich verschwundenen andern Krankheiten, z. B. Hautausschlägen u. s. w. entstand, oder auch nach Gemüthserschütterungen eine Verstimmung des Nervenlebens folgte, besondern Nutzen gewähren, und besonders bey abnorm aufgeregter Sensibilität, clonischen Krämpfen, Veitstanz u. s. w. angewendet zu werden verdienen. Weniger häufig finden sich dagegen Fälle, wo von den die Hautaussonderung, die Speichel-

oder Harnsekretion *) befördernden Mitteln in diesen Krankheiten Anwendung gemacht werden kann, zum wenigsten werden sie gewöhnlich mehr durch andere diese Nervenleiden bedingende Krankheiten (§. 258.) indicirt seyn. Oefterer hingegen ist von Blutentziehungen Nutzen zu erwarten, einem Mittel, welches man zwar sehr oft als für Störungen des Nervenlebens ganz unpassend betrachtet hat, und welches demohnerachtet so vielfältige Erleichterung sogar bey an sich schwächlichen und reitzbaren Subjekten gewährt; denn, so wie immer die Blutmasse gern nach einem in aufgeregter Thätigkeit sich befindenden Theile hindrängt, so auch findet sich bey abnorm gesteigerter Sensibilität die Nervensubstanz (an und für sich schon eine der blutreichsten), durch Congestionen noch mehr in ihrer Thätigkeitsäußerung gehemmt, und es erscheint dadurch Blutentziehung hierbey wohlthätig wirkend. Auf welche Weise übrigens die Blutentziehung vorzunehmen sey, müssen die Umstände bestimmen. Bey vollsaftigen, an Ohnmachten, Alpdrücken, heftigen Zuckungen leidenden Personen, zumal bey sparsamer oder verzögerter Menstruation, sind gewöhnlich stärkere Ausleerungen nothwendig, bey sehr schwächlichen mit Nervenzufällen behafteten Mädchen wird hingegen die Anwendung oft wiederholter kleiner Blutentziehungen, und zwar entweder nach Berlinghieri's Methode **) durch kleine Venäsektionen, oder, was vorzüglich bey mehrern Lokalleiden Empfehlung verdient, durch Blutigel oder Schröpfköpfe Statt finden.

§. 264.

2) Die irritirende Methode gründet sich vorzüglich auf das Gesetz, daß bey sehr hervorgehobener Thätigkeit in einem Theile des Körpers, Thätigkeiten anderer Organe herabgestimmt

*) Gelinde Diuretica werden indeß vorzüglich, wo noch andere Krankheitsstoffe im Körper sind (namentlich Ausschlagsmaterien) allerdings zuweilen mit Nutzen angewendet.

**) S. Osiander über d. Entwicklungskrankheiten 2r Thl. S. 285. Berlinghieri heilte heftige konvulsivische Anfälle eines hysterischen Mädchens durch gegen 400 kleiner Aderläße zu einer halben Unze.

werden. Sie kann auf sehr verschiedene Weise in diesen Krankheiten, und zwar oft mit sehr großem Nutzen angewendet werden, und zwar gewährt sie hierbey einen doppelten Vortheil, einmal fixirt sie durch den mit der Anwendung dieser Mittel verbundenen Schmerz das Selbstgefühl mehr auf einen gewissen, vorher vielleicht geschwächten Theil, oder auf den körperlichen Zustand überhaupt, und beugt dadurch manchen Ueberspannungen desselben vor, anderntheils erregt die heftigere Reitzung eine Entzündung, welche oft zu einem noch wohlthätigern Ableitungsmittel der Blutmasse vom Nervensystem wird, als Blutentziehungen an und für sich werden können. Es gehören hierzu Vesicatoria, Synapismen, die Moxa, das Einreiben mit Tr. Cantharidum, Liniment. volatile, Spirit. sal. ammon. caust. u. s. w. — Die Anwendung dieser Mittel betreffend, so sind sie vorzüglich bey örtlichen Schmerzen, Lähmungen und partiellen Krämpfen hülfreich, nur bemerke man, daß eine Neigung zu Fieberbewegungen, und eine sehr gesteigerte allgemeine Reitzbarkeit den Gebrauch derselben einschränken, oft auch wohl ganz verbieten.

§. 265.

Wir kommen ferner zur Behandlung jener Krankheitszustände durch innere oder äußere, das Nervensystem vorzüglich in Anspruch nehmende Arzneymittel. Wir unterscheiden vorzüglich die indifferenzirenden, abspannenden, indirekt oder direkt die aufgeregte Nerventhätigkeit mindernden, und die erregenden Mittel. Unter den erstern setzen wir den indifferentesten der Stoffe, welche uns die äußere Natur darbietet, oben an, nämlich das Wasser, dessen treffliche Wirkung als laues Bad bey aufgeregter Sensibilität, Schmerzen, Krämpfen, ja selbst nach stürmischen Gemüthsbewegungen, durch die vielfältigsten Beobachtungen anerkannt ist *). Eben so wohlthätig aber wirkt das Wasser in einer der Körper-

*) Man lese hierüber besonders H. M. Marcard über d. Natur und d. Gebrauch d. Bäder. Hannov. 1793. vorzüglich das 7. Kap. wo auch der Schlaf machenden Wirkung des Bades gedacht ist.

wärme entsprechenden Temperatur innerlich, und der große Nutzen, welchen Theeaufgüße und Lavements (eigentlich nichts als warme Bäder für Magen und Darmkanal) bey ähnlichen Leiden gewähren, ist keinem Arzte unbekannt.

§. 266.

Zunächst an die allgemein indifferenzirende Wirkung des Wassers schließt sich die nun schon mehr individuelle vieler Produkte des Pflanzenreichs, welche, in wiefern sie auch im thierischen Organismus die vegetative Seite (das ruhige in sich gekehrte Bildungsleben der Pflanze) hervorrufen, die übermäßigen Erregungen des animalen Lebens herabstimmen. — Wir zählen hierher zunächst die milden Oehle, entweder rein als solche innerlich oder äußerlich angewendet, oder in der Verbindung mit Schleim und Wasser als Emulsionen; ferner den Pflanzenschleim und Zucker, dann aber die betäubenden Mittel, welche, obwohl oft anfänglich eine lebhafte Reaktion gegen ihre Einwirkung bemerkt wird, doch in zureichender Quantität bald den Organismus dem Pflanzenleben näher bringen, d. i. beruhigen, einschläfern. Hierher gehört denn das Opium vorzüglich, dessen vorsichtiger *) (insbesondre die Abwesenheit von Congestionen nach den Hirngefäßen, so wie von Neigung zu Obstruktionen fordernder) Gebrauch, bey nervösem Gliederschmerz und gesteigerter Empfindlichkeit einzelner Sinnesorgane oft großen Nutzen gewährt. Aehnlich ist ihm der Crocus, das Extractum Hyoscyami **) und das bey Brustkrämpfen vorzüglich wirksame Extractum Lactucae virosae ***). Weniger scheinen für diese Krankheiten zu passen: Aconitum, Stramonium, Cicuta und Fol. Lauro-

*) Zuweilen vertragen Mädchen, an verstimmter Sensibilität leidend, diese Narcotica gar nicht. Ich sah einst schon nach ¼ Gr. die allerheftigsten Krämpfe entstehen.

**) Diese Mittel sind es auch besonders, welche in mehrern dieser Krankheiten in Rauchform, mehr als geschieht, angewendet zu werden verdienen. S. Hufeland üb. d. Anwendung d. Heilmittel als Rauch in dessen Journal f. d. pr. Heilk. 1809. 5s St.

***) S. darüber Schlesinger in Hufelands Journal f. d. pr. Heilk. XXI. Bd. 1s St.

cerasi, zum mindesten hat die Erfahrung noch nicht so entschieden für dieselben gesprochen. Mehr mit scharfem Stoffe verbunden ist das Narkotische in der Belladonna, indeß wirkt sie gerade deßhalb wohl in convulsivischen Krankheiten sehr nützlich*).

§. 267.

Weniger narkotisch, aber durch ihre Mischung aus bittern und ätherisch-öhligten Stoffen zugleich das Muskel- und Nervensystem in Anspruch nehmend, und deßhalb den krankhaften Conflict beider (Krampf) vorzüglich zu beseitigen geeignet, sind die Valeriana, die Flor. Chamomill., Hb. Melissae u. s. w. — Besonders ist der Baldrian ein mit Recht geschätztes Mittel für viele der oben beschriebenen Entwicklungszufälle, sobald er nur in hinlänglich starker Gabe (etwa nach Osiander zu einer halben bis ganzen Unze täglich) und in Pulverform angewendet wird. — Verwandt in der Wirkung sind den genannten ferner einige thierische Substanzen, nämlich das Castoreum und der Moschus, von welchen das erstere mehr den Sensibilitätsstörungen in den Unterleibsnerven, das zweite mehr den Störungen im Centralnervensystem angemessen scheint; und einige Mittel aus der Reihe der metallischen, als die Flor. Zinci und Magisterium Bismuthi, welche bey Abwesenheit von gastrischen Zuständen und Säureerzeugung, so wie von entzündlicher Diathesis besonders in Krampfzufällen mit Nutzen gebraucht werden. — Alle diese Mittel bilden übrigens durch ihre schon mehr erregende Wirkung den Uebergang zu den eigentlichen flüchtigen Reitzmitteln, von welchen jedoch gerade in diesen Entwicklungskrankheiten im Ganzen seltner Gebrauch zu machen ist. — Zuerst aber ist hier der arzneylichen Anwendung des Weins zu gedenken, welcher durch eine beruhigende, der erregenden bald nachfolgende Wirkung sich noch den narkotischen Mitteln in etwas verwandt zeigt, und daher bey schwächlichen, reitzbaren, kleinmüthigen, mit Zittern, Sinnesschwäche und ähnlichen Beschwerden behafteten

*) S. Osiander über d. Entwicklungskrankheiten. 2r Thl. S. 297. und Harles Jahrbücher d. teut. Medic. u. Chir. II. Bd. 1s Hft.

Subjekten so äußerst wohlthätig wird. Ferner hat man den Campher seit längerer Zeit bey Gemüthskrankheiten überhaupt, vorzüglich aber auch in den durch Gemüthserschütterungen erregten oder nach andern Krankheiten sich ausbildenden melancholischen Zuständen junger Frauenzimmer nützlich gefunden. Er wird vorzüglich phlegmatischen Individuen wohlthun, bey entzündlicher Diathesis hingegen nicht gegeben werden dürfen. Indem wir die übrigen hierher gehörigen Mittel, als Serpentaria, Imperatoria, die Naphthen, die verschiedenen Tinkturen u. s. w. übergehen, erwähnen wir nur noch des flüchtigen Laugensalzes, welches als Liquor C. C., Spirit. sal. ammon. foeniculat. u. s. w., vorzüglich in Verbindung mit narkotischen Substanzen, mit dem beßten Erfolg, namentlich in den krampfhaften Entwicklungskrankheiten angewendet wird.

§. 268.

Endlich haben wir noch die Klasse der imponderabeln Heilmittel für diese Krankheiten zu betrachten, welche so wichtig und sachgemäß sie auch immer erscheinen mögen, doch eben in ihrer Imponderabilität, darin daß sie nicht nach einem Recepte verordnet werden können, darin, daß sie reinen Willen zu helfen, Beharrlichkeit und Aufopferung in ihrer Anwendung fordern, den Grund davon enthalten, daß sie weit weniger als billig benutzt, ja oft wohl gar zu Modethorheiten herabgewürdigt werden. — Wir haben aber hierher gerechnet zuerst Licht und Finsterniß, Wärme und Kälte. Diese mächtigen Einflüße, denen der Organismus fortwährend unterworfen ist, von welchen in der ganzen uns umgebenden Natur Leben und Entwicklung abhängt, deren Wirkung insbesondre auf das Nervenleben sowohl im gesunden als kranken Zustande so bedeutend ist, werden auch für die gegenwärtig betrachteten Krankheitsformen in vieler Hinsicht wohlthätig, wenn sie von der Hand eines umsichtigen Arztes geleitet sind. Wärme und Licht (wohin auch die Insolationen oder das Sonnenbad gehört) wirken vorzüglich bey schwächlichen, melancholischen Subjekten in angemessenem nach und nach gesteigertem Grade vorzüglich, ja sie sind selbst zur

Verhütung krampfiger Anfälle mit Nutzen anwendbar *). Kälte und Finsterniß hingegen werden zu Beseitigung mancher exaltirten Zustände, zu Zwangsmitteln bey eingebildeten oder vorgegebenen Nervenkrankheiten manches wirksame Mittel an die Hand geben, nicht zu gedenken, daß die plötzliche örtliche Anwendung der Kälte so wie der Wärme zu einem der wirksamsten Reitzmittel wird, und daher bey Paralysen, Krämpfen u. s. w. viel zur Heilung beytragen kann.

§. 269.

Ferner den telluriſchen oder metalliſchen Magnetismus betreffend, ſo iſt dieſes ſchon ſeit einigen Jahrhunderten von Mehrern empfohlene und angewendete Mittel beſonders gegen Lähmungen, Schmerzen und Krämpfe von Nutzen befunden worden, und verdient gewiß auch in den genannten Entwicklungskrankheiten häufigern Gebrauch, als neuerlich davon gemacht zu werden pflegt. Die Form ſeiner Anwendung muß übrigens der Natur dieſer Krankheit angemeſſen ſeyn, und ſchwerlich wird daher jemand den Magnet als Pulver und in Pflaſterform, wie er von den alten Aerzten häufig gebraucht wurde, noch jetzt anwenden. Am ſchicklichſten ſind Stäbe, eyförmige oder herzförmige Platten, oder Garnituren von Magnettäfelchen, wo immer Nord- und Süd-Pol ſich berühren müſſen, welche in Seide eingeſchlagen auf den leidenden Theilen getragen werden. Bey Anwendung von Magnetſtäben muß übrigens namentlich die Richtung derſelben beachtet werden, da bekannt iſt, daß die Richtung eines Eiſenſtabes in den magnetiſchen Meridian allein ſchon denſelben magnetiſch machen kann, und ſonach erwartet werden muß, daß auch bey dem bereits magnetiſch geweſenen Stabe die Heilkraft verſtärkt oder geſchwächt werde, je nachdem die

*) So beobachtete H. Naſſe einen Fall, wo epileptiſche Anfälle, nur wenn der Kranke im Dunkeln gelaſſen wurde, wiederkehrten. Auch ſehe man hierüber von H. Oſiander (Neue Denkwürdigkeiten I. Thl. 1ſt Hft. S. 120 u. f.) die ſchon von den Alten für höchſt wichtig gehaltene Einwirkung von Licht oder Finſterniß bey krampfigen Krankheiten erörtert.

Richtung desselben passend oder unpassend ist. Am besten scheint es zu seyn, die Nordpolspitze an den leidenden Theil, die Südpolspitze aber gegen den Nordpol der Erde zu halten. Hell, Unzer*) und einige französische Aerzte (Andry und Thouret)**) haben neuerlich sich des Magnets, und zwar zum Theil auch in den genannten Entwicklungskrankheiten des weiblichen Geschlechts vorzüglich bedient. Besonders wichtig aber würde es seyn, wenn die von H. Kieser***) gemachte Beobachtung über die Kraft des Eisens einen Zustand von Schlaf, ja von Schlafwachen, und durch diesen Schlaf die Heilung von Krankheiten zu bewirken, durch weitere Erfahrungen hinlänglich bestätigt würde, indem davon gewiß für die Behandlung der hier betrachteten Nervenzufälle ausgezeichneter Nutzen erwartet werden dürfte. Ueberhaupt nämlich scheint der tellurische Magnetismus herabstimmend auf den Organismus zu wirken, der individuellen Kraft desselben, als eine vom Erdorganismus ausgehende Thätigkeit, entgegengesetzt, aus welchem Gesichtspunkte wir denn vorzüglich seine hinreichend bestätigte schmerzlindernde Kraft erklärlich, und namentlich auch die von größern Massen des Eisens (des vorzüglichen Trägers dieser Kraft) bemerkte schläfmachende Wirkung begreiflich finden.

§. 270.

Noch haben wir auch des Galvanismus und der Elektricität als Heilmittel für die Nervenleiden gedacht, jedoch muß der Gebrauch derselben hier allerdings manche Einschränkungen erleiden, da die meisten jener Zustände auf abnorm gesteigerter Sensibilität beruhen, und Galvanismus wie Elektricität an sich stark erregende Einflüße sind. Vorzüglich verdienen sie daher nur bey Lähmungen, Schwächezuständen, Torpor und Blödsinn angewendet zu werden; allein

*) J. C. Unzer's Beschreibung eines mit dem künstlichen Magneto angestellten medicin. Versuches. Hamb. 1775.

**) Andry's u. Thourets Beobachtungen u. Versuche üb. d. Gebrauch d. Magnets in d. Arzneyk. Aus d. Franz. Leipz. 1785.

***) Archiv. f. d. thier. Magnetismus. III. Bd. 2s St.

auch dann nie ohne die gehörigen physikalischen Kenntnisse, ohne hinlängliche Ordnung und Ausdauer in der Kur, ohne Beachtung der in den bessern Schriften über diese Gegenstände*) vorzüglich empfohlenen und durch Erfahrung bewährten Methoden, und nur unter der gehörigen Berücksichtigung des Zustandes der übrigen organischen Systeme, namentlich des Gefäßsystems, indem z. B. bey vollblütigen, zu Congestionen und Entzündungen geneigten Subjekten von der Anwendung dieser Mittel leicht gefahrdrohende Zufälle besorgt werden müßten. Das Verfahren bey der Benutzung dieser Mittel hier übrigens ausführlicher zu beschreiben, würde zu viel Raum bedürfen, und wir verweisen daher auf die angeführten Schriften.

§. 271.

Endlich ist noch von der Behandlung dieser Krankheiten durch die mittelbare Einwirkung eines Menschen auf den andern zu sprechen, wohin der sogenannte animale Magnetismus und die psychische Behandlung gehört. — Daß nun aber überhaupt eine solche Wirkung lebendiger Körper auf einander Statt haben könne, läßt sich schon aus so mancherley Idiosynkrasien, aus den Beyspielen, welche selbst als Zufälle anderer Krankheiten so häufig bemerkt werden und eine natürliche Abneigung oder Zuneigung gegen gewisse Individuen aussprechen, erkennen. Wirkt nun auf willkührlich bestimmte Weise der Inbegriff gesammter organischer Lebensthätigkeit auf den Gesammtorganismus der Kranken, so giebt

*) Fr. H. Martens vollständige Anweisung zur therapeutischen Anwendung des Galvanismus u. s. w. Weißenfels 1803. — Ebendersselbe übersetzte eine kleine Schrift von Geiger (Abhandlung über den Galvanismus und dessen Anwendung v. Dr. C. Fr. Geiger. Leipz. 1803.), in welcher unter andern S. 42. die Heilung einer Amaurosis bey einer 20jährigen an unterdrückter Menstruation leidenden Person durch Galvanismus erzählt ist.

Tib. Cavallo's Versuch über d. Theorie und Anwendung d. medicinischen Elektricität. Aus d. Engl. Leipz. 1799.

C. G. Kühn Geschichte d. medicin. u. physikal. Elektricität. Leipzig 1783. 2 Thle. nebst 2 Fortsetzungen. 1796, u. 1805.

dieſes den Begriff des neuerlich ſo vielfach beſprochenen thieriſchen Magnetismus, des Mesmerismus oder Lebensmagnetismus; wirkt hingegen die Kraft der Vernunft des Arztes mit Freyheit auf die geiſtige Thätigkeit der Kranken gerichtet, auf die Verbeſſerung körperlicher Zuſtände, ſo nennen wir dieß die pſychiſche Behandlung.

§. 272.

Was den thieriſchen Magnetismus betrifft, ſo wird wohl jetzt nicht leicht mehr irgend ein unpartheyiſcher Mann, welcher die verſchiedenen Schriften *) über dieſen Gegenſtand verglichen, oder ſelbſt einige Beobachtungen hierüber zu ſammeln Gelegenheit hatte, in Abrede ſtehen, daß die durch magnetiſche Manipulation (deren ausführliche Beſchreibung man ebenfalls in in den unten aufgeführten Schriften nachſehen möge) hervorgerufenen Zuſtände, nicht nur keineswegs etwa immer Täuſchung ſeyen, ſondern höchſt merkwürdige, oft den eben erwähnten von ſelbſt entſtandenen ungewöhnlichen Phänomenen krankhaft aufgeregten Nervenlebens ähnliche Erſcheinungen abgeben. Es beſtehen aber bekanntlich die an und in dem magnetiſirten Individuum wahrzunehmenden Veränderungen zunächſt im Gefühl vermehrter Wärme, wohlthätiger allgemeiner Aufregung und nachfolgender Abſpannung, endlich in ruhigem Schlaf, welcher dann oft in Schlafwachen, Verſetzung der Sinne, Verzückung u. ſ. w. übergeht, immer aber erſt wieder durch gewöhnlichen Schlaf in das Wachen zurückgeführt wird, und dadurch beweißt, daß (wie dieß namentlich von H. Kieſer dargeſtellt wurde) alle jene ungewöhnlichen Erregungen des Nervenlebens der Nachtſeite des

*) Heilkraft des thieriſchen Organismus nach eigenen Erfahrungen v. D. Arnold Wienholt. 3 Thle.

Verſuch einer Darſtellung des animaliſchen Magnetismus als Heilmittel von C. A. F. Kluge. Berlin 1811.

Ferner mehrere Zeitſchriften, das ältere Archiv f. d. thier. Magnetismus von Nasdhoff, d. neuere von Kieſer, Wolfarts Aſklepiäon, ferner Brandis über pſychiſche Heilmittel und Magnetismus, 1818. und das neuere, beſonders in Meſmers Geiſt bearbeitete Werk über den Magnetismus von Ennemoſer.

Lebens angehören, und daher auch nicht (wie dieß Andere gern hätten behaupten mögen) über den Zustand des natürlichen Wachens gesetzt zu werden verdienen. Wenn dieß nun aber anerkannt ist, so erscheint dagegen die eigentliche Heilkraft dieser Zustände weit mehr in Zweifel gezogen, und wenn sich nun aus dem Vergleich einer Anzahl von Krankheitsfällen, durch Magnetismus behandelt, allerdings ergiebt, daß erstens die Kuren sämmtlich ungewöhnlich lange Zeit, oft ein und mehrere Jahre dauerten, zweitens die Krankheiten oft nur augenblicklich in ihren auffallendsten Symptomen gemäßigt wurden, übrigens aber oft ganz im alten Zustande blieben, manche Krankheiten wohl auch verschlimmert, wenige aber wahrhaft geheilt wurden, so müßte gewiß das Zutrauen zu diesem Mittel sehr erschüttert werden, wenn wir nicht zugleich die Ursachen, welche das Nichtgelingen vieler magnetischer Kuren bedingen, berücksichtigen wollten. Es scheinen diese aber zu seyn: 1) nicht hinlängliche Beachtung der Indikation des Magnetismus. Jedes Arzneymittel nämlich wirkt nur da, wo es nach wissenschaftlichen und Erfahrungsgrundsätzen wirklich angezeigt ist, allein bey dem Magnetismus hat man oft sehr wenig an Indikation oder Contraindikation gedacht, sondern bey Krankheitszuständen, sie mochten Namen haben und Constitutionen betreffen, welche sie wollten, aufs gerathewohl, namentlich wenn etwa einige andere Kurmethoden ohne Erfolg geblieben waren, magnetisirt, und zwar wohl aus dem schwer zu vertheidigenden Grunde, weil der Magnetismus ein Universalmittel sey. 2) Hat man zu viel Fremdartiges den Kuren beygemischt, die Erscheinungen des Schlafwachens nur hervorzubringen getrachtet, um seine Neugierde an den sonderbaren Aeußerungen der Kranken zu befriedigen. 3) Ist man oft mit zu weniger, ja ohne alle ärztliche Kenntniß dabey zu Werke gegangen, und 4) endlich werden bey so langen Kuren oft andere Verhältnisse, angeregte Neigungen zwischen Magnetiseur und der Magnetisirten, Gemüthsleiden, Fehler der Lebensordnung u. s. w. leicht irgend einmal vorkommen können, dann aber, wenn sie gerade einen entscheidenden Zeitpunkt treffen, wohl die Bemühungen ganzer Monathe fruchtlos machen.

§. 273.

Wird daher der Magnetismus mit reinem Willen zu helfen, abgesehen von aller Sucht nach wunderbaren Erscheinungen, Vorhersagungen u. dgl. mit hinreichender ärztlicher Umsicht, am rechten Orte, mit schicklicher Leitung der äußern Verhältnisse, und sattsamer Stätigkeit (welche freylich oft Aufopferungen fordert, deren der praktische Arzt nicht leicht fähig ist) ausgeübt und angewendet, so muß er gewiß als ein großes Mittel geachtet werden, und wir fürchten auch nicht *), daß er, wenn man so strenge Anforderungen macht, alsbald aus der Reihe häufig gebrauchter Mittel verschwinden werde. — Was nun aber insbesondre die Anwendung **) des Magnetismus in den genannten Entwicklungskrankheiten betrifft, so fordert sie gewiß die Berücksichtigung der im vorigen Paragraph genannten, der Kur nachtheiligen Einflüße in vorzüglich hohem Grade und überhaupt besondere Vorsicht; viele dieser Zustände beruhen nämlich an sich schon auf abnorm gesteigerter Nervenwirkung, werden daher durch eine stark eingreifende magnetische Behandlung beträchtlich verschlimmert, und können nur von einer einfachen, beruhigenden, den vom natürlichen nicht sehr verschiedenen Schlaf bewirkenden Einwirkung Hülfe erhalten ***). Besonders beruhigend scheint die vorsichtige Anwendung des Magnetismus aber immer bey krampfhaften Zufällen dieser Perioden gewesen zu seyn, wovon die genannten Schriften über den thie-

*) H. Oslander über die Entwicklungskrankheiten. 2. Thl. S. 222 und 223.

**) Die verschiedenen Methoden der Anwendung sind namentlich in dem oben angeführten Werke von Kluge sehr gut neben einander gestellt.

***) So erzählt Wienholt (drei Abhandlungen über den thierischen Magnetismus, herausg. v. D. J. Chr. F. Scherf. Brem. 1807.) die Geschichte eines eilfjährigen an Melancholie und einzelnen, gewaltsame Geistesverwirrung drohenden Anfällen leidenden Kindes, welches durch den unter Wienholts Leitung vom Vater oder von der Mutter angewendeten Magnetismus, welcher hier blos täglich einige Stunden Schlaf bewirkte, gänzlich geheilt wurde.

rischen Magnetismus viele Beyspiele enthalten, dann muß aber insbesondre die kräftige Atmosphäre und Einwirkung eines gesunden Organismus bey den an allgemeiner Schwäche, Zittern, partiellen Lähmungen und darnieder liegender Reproduktion leidenden Subjekten, wo anhaltende deprimirende Affekte, überfeine physische Erziehung, frühe Ausschweifungen u. s. w. die Krankheitsursachen abgeben, vorzüglich nützlich werden, allein es wird deßhalb hierbey auch die Wahl des Magnetisirenden von Wichtigkeit seyn, in welcher Hinsicht denn gewiß besonders eine geistig und körperlich möglichst gesunde, der Kranken sonst auch nahe und werthe Person (Mutter, Vater, ein älterer Bruder z. B.) in vieler Hinsicht den Vorzug verdient.

§. 274.

Die rein psychische Behandlung dieser Krankheiten angehend, so ist zuvörderst zu bemerken, daß ihre Anwendung immer noch eine gewisse Empfänglichkeit von Seiten der Kranken voraussetzt, denn es ist leicht zu erkennen, daß z. B. im ausgebildeten Blödsinn, überhaupt schon bey sehr verminderter Geisteskraft auch die Wahrnehmung fremder geistiger Einwirkung vermindert seyn müsse. Ferner wird diese Behandlung mehr für Fälle passen, wo die Krankheit durch abnorme Gemüthsrichtung, also z. B. durch Nachahmungssucht, durch religiöse oder poetische Schwärmerey u. s. w. sich äußert; und endlich scheint sie auch vorzüglich da geeignet, wo plötzliche heftige Eindrücke *) diese und ähnliche Zufälle erregt hatten, obwohl sie auch mitunter in langwierigen und allmählig entstandenen krampfhaften Krankheiten **) mit Nutzen

*) Auf diese Weise heilte man öfters plötzlich durch Mittheilung entstandene Krämpfe durch Drohungen; so Boerhave im Harlemer Waisenhause. Mehrere ähnliche Fälle, auch den ziemlich komischen von Al Raschid's Beyschläferin erzählt Reil, Fieberlehre IV. Bd. S. 108 u. 655.

**) Mehrere Fälle dieser Art sind von Brandis, in dem ganz hierher gehörigen Aufsatze über die Heilung von Krankheiten durch imponderable Arzneymittel (Hufeland's Journ. d. pr. Heilk. 41. Bd. 2s St.) mitgetheilt.

angewendet worden ist. — Lassen sich jedoch über irgend eine Methode im Allgemeinen rücksichtlich ihres Gebrauchs wenig Vorschriften geben, so ist es diese. Alles beruht nämlich hierbey fast auf der Individualität des Arztes, welcher sie anwendet. Nur der mit Kraft des Geistes, mit energischem Willen und reiner Theilnahme an fremden Leiden Ausgerüstete wird auf diese Weise zum Wohle seiner Kranken wirken können, für ihn aber bedarf es auch keiner Regeln, denn es sagt ihm die Erwägung vorliegender Umstände bald, was in diesem Falle zu thun sey. — Man möchte daher wohl, wie J. Paul den Dichtern, hier den Aerzten zurufen: „Vor allen Dingen habt Genie!“ und wir finden daher auch glückliche Anwendung dieser Methode immer nur bey wenigen aber ausgezeichneten Aerzten in der Geschichte der Heilkunst bemerkt*). — Erinnert muß jedoch werden, daß wir unter solcher psychischer Behandlung keineswegs blos das gewaltsame Erschüttern der Kranken durch einzelne Machtsprüche im Sinne haben, sondern vorzüglich glauben, daß die ruhige aber feste und stätige Einwirkung einer gesunden geistigen Individualität auf eine verstimmte, kleinmüthige, geschwächte nicht anders als höchst wohlthätig für das innerste, und in wiefern dieses die Wurzel des äußern Lebens ist, auch für das äußere Leben solcher Kranken wirken müße. Wobey wir an des trefflichen Lessing Ausspruch gedenken, welcher sagt, daß der Umgang mit einem kraftvollen weisen und guten Menschen die eigentliche Seelenarzney sey.

§. 275.

Nachdem nun also die verschiedenen Methoden, welche die Kunst zur Behandlung jener Entwicklungskrankheiten darbietet, ihrer Natur nach im Einzelnen erwogen worden sind, kann sich aus der Vergleichung mit dem, was oben über die Natur der Krankheit selbst erinnert worden ist, leicht die Wahl der für besondere Fälle schicklichen Heilverfahren erge-

*) Mehrere interessante Bemerkungen hierüber finden sich in Heinroth de voluntate medici, medicamento insaniae. Lips. 1818.

ben, und wir fügen daher schlüßlich nur noch zwey Bemerkungen bey: erstens, daß man nicht übersehen dürfe, wie manche jener Zustände, welche in der Entwicklungsperiode des weiblichen Geschlechts von Zeit zu Zeit beobachtet worden sind, überhaupt gar keiner ärztlichen Behandlung unterworfen seyn können. — Wer möchte die edle Begeisterung einer Johanna von Orleans krankhaft nennen? wer die Eigenthümlichkeit der rabdomantischen Sensibilität, welche in das innerste Leben des Organismus verflochten seyn kann, durch Arzneymittel heben wollen? — Zweytens, daß viele dieser Entwicklungszustände, durch das Fortschreiten des Lebens selbst gehoben werden, zu rasches ärztliches Einwirken folglich, in wiefern es einen nothwendigen organischen Prozeß stört, leicht zum Nachtheil der Kranken gerathen könne, und daß daher, bevor überhaupt die ärztliche, oft allerdings auch sehr nothwendige Behandlung Statt finden kann, die genaueste Erforschung der Individualität des Falles besonders wichtig, und stets die einfachere, die Natur mehr leitende als zwingende Behandlung die angemessenste seyn werde.

---

§. 276.

Wir wenden uns jetzt zu einigen andern Krankheitserscheinungen, welche nun ganz besonders der Periode ausgebildeter Weiblichkeit angehören und entweder in dem mit krankhafter Heftigkeit herrschenden Geschlechtstriebe, oder in dem völlig gehemmten Fortpflanzungsvermögen, oder endlich in dem verstimmten Verhältniß zwischen Sensibilität und Reproduktion begründet sind, und in den Formen der Nymphomanie, Unfruchtbarkeit und Hysterie erscheinen.

3) Mutterwuth, Manntollheit, (Nymphomania, Andromania, Furor uterinus).

§. 277.

Eine traurige, der auf Sitte und Schamhaftigkeit gegründeten weiblichen Natur Hohn sprechende, und eben

deßhalb einen höchst widrigen Anblick gewährende Krankheit, welche in übermäßig hervorbrechendem, Verstand und Gewissen fast oder vollkommen überwältigendem Triebe zur Geschlechtslust sich zu erkennen giebt. Man bemerkt dieselbe bey jüngern und ältern Personen, vorzüglich sanguinischen oder cholerischen Temperaments, mit kräftigem Körper, theils, obwohl seltner, noch in den Entwicklungsjahren und zuweilen mit chlorotischen Symptomen verbunden, theils während der ganzen, jedoch vorzüglich während der spätern Periode der Geschlechtsreife, ja sogar während der Schwangerschaft, und es können füglich mehrere Grade dieses Uebels unterschieden werden. Erster Grad nämlich, die Geilheit (Salacitas), wo zwar noch nicht alles Schamgefühl verloren ist, aber theils das Aeußere des Körpers (das erhitzte Gesicht, die schwimmenden Augen, die starkgerötheten aufgeworfenen Lippen u. s. w.) die angeregte Sinnlichkeit offenbaret, theils kein Mittel, die Befriedigung zu erzwecken, verschmäht wird, wohin wir Putz, unzüchtige Kleidung und Reden vorzüglich rechnen, obgleich auch die Masturbation solchen Kranken sehr gewöhnlich ist.

§. 278.

Der zweyte Grad ist die eigentliche Melancholia uterina, indem die Kranke, welche die Ueberwältigung ihres bessern Selbst durch einen rohen gewaltsamen Trieb empfindet, in Trübheit des Gemüths versinkt, ein stilles vor sich hin Starren eintritt, der Körper selbst leidet, abmagert, die Verdauung und der Schlaf gestört werden, demohnerachtet aber alle Gedanken auf Geschlechtsbefriedigung gerichtet sind, auch wohl schamlose Entblößungen und Anerbieten versucht werden, bey Annäherung männlicher Individuen aber, die innere Begier durch Unruhe, unstäte Blicke, Worte und Gebärden sich vorzüglich kund giebt. — Der dritte Grad endlich verdient den Namen Mania; die Freiheit des Willens ist hier gänzlich aufgehoben, die Kranke wüthet, reißt sich die Kleidung ab, fällt Mannspersonen mit Raserey an, schreiet, die Ausleerungen erfolgen oft bewußtlos, und wenn durch solche Anstrengungen die Kräfte erschöpft sind, folgt stilles Hinbrüten,

Melancholie oder selbst soporöser Zustand. Gewöhnlich pflegt übrigens der dritte Grad, wenn er nicht bald gehoben wird, den Tod zu beschleunigen, indem dabey die Reproduktion immer mehr sinkt, Blödsinn, Auszehrung, Wassersucht oder Apoplexie eintritt und das hier gewiß wünschenswerthe Ende herbeyführt; auch Selbstmord ist hier nicht ungewöhnlich.

§. 279.

Ueber das eigentliche Wesentliche dieser traurigen Krankheit (die sogenannte nächste Ursache) haben bisherige Untersuchungen noch zu wenig Aufschluß gegeben. Die ältern Aerzte suchten sie in der Schärfe und Gährung des weiblichen Samens, die Neuern gewöhnlich in übermäßigem Geschlechtstriebe, mit Wahnsinn oder Melancholie verbunden*). Betrachtet man indeß theils die disponirenden, theils die Gelegenheitsursachen der Nymphomanie, theils was die Erwägung der verschiedenen Ausgänge der Krankheit zeigt, theils endlich was die Physiologie über den Sitz der Geschlechtslust im weiblichen Körper lehrt, so wird es mehr als wahrscheinlich, daß namentlich chronische Entzündungen der Ovarien die Ursache aller jener Erscheinungen darstellen, welche den Begriff der Nymphomanie geben. — Nicht zu läugnen nämlich ist es, daß die Ovarien eben so der erste Grund der weiblichen Zeugungsfähigkeit, und somit auch des Zeugungstriebes sind als die Hoden der männlichen. Viele der niedern weiblichen Thiere entbehren daher alle Geschlechtsorgane, nur die Ovarien nicht, ja daß selbst im Menschen die Ovarien allein der Erzeugung und Ausbildung eines neuen Individuums fähig sind, beweisen die später zu betrachtenden Eyerstocksschwangerschaften. — Nun sehen wir aber allerdings, wie sich dieses in der ausführlichen Geschichte der

*) Ueber Literatur und die verschiedenen Ansichten von dieser Krankheit darf folgende kleine Schrift empfohlen werden: F. A. Peschek Diss. in. de furore uterino. Lips. 1810. — Nur daß der Verfaßer den eigentlichen Sitz der Krankheit in die äußern Genitalien verlegt, ist wohl eben so wenig zu billigen, als wenn man den Sitz des Hungers in die Mundhöhle verlegen wollte.

normalen Schwangerschaft noch bestimmter ergehen wird, in beginnender Schwangerschaft, also bey der stärksten geschlechtlichen Erregung des weiblichen Organismus, die Ovarien in einem Zustande, welcher dem der Entzündung in vieler Hinsicht verglichen werden kann, und es ist also leicht begreiflich, wie umgekehrt der entzündliche pathologische Zustand der Genitalien, die äußerste Steigerung der Geschlechtsbegierde (gleichsam den Trieb den im Normalzustande dieser erhöhten Gefäßthätigkeit verbundenen Zustand angehender Schwangerschaft herbeyzuführen) zur Folge haben könne und müsse.

§. 280.

Sollte man vielleicht dieser Ansicht entgegenstellen, daß es mit ihr unvereinbar sey, daß, wie die Erfahrung zeigt, Schwangerschaft gerade bey dieser Krankheit doch so selten eintrete, so kann erwiedert werden, daß dieses vielmehr zur Bestätigung diene, indem wir ähnliche Erscheinungen auch in den Entzündungen anderer Organe nur allzuhäufig finden. So wird z. B. bekanntlich die Magen- und Darmentzündung vom heftigsten Durste begleitet, und demohnerachtet gewöhnlich alles Getränk ausgebrochen und nicht assimilirt, und eben so finden wir sehr einleuchtend, daß die Ovarien, wenn sie in einem wahren krankhaften Entzündungsprocesse begriffen sind, der normalen Erregung, welche zur Conception nöthig ist, unfähig werden. — Was die Sektionen betrifft, so hat man sie überhaupt selten angestellt, auch die Ovarien dabey weniger beachtet; jedoch werden wir bey den später zu beschreibenden Krankheiten der Eyerstöcke finden, in wie naher Verbindung heftiger, zu Ausschweifungen führender Geschlechtstrieb und abnormer Zustand der Genitalien zu stehen pflegen; auch sah ich in zwey Fällen die Ovarien von Personen, welche einer ausschweifenden Lebensweise beschuldigt wurden, etwas vergrößert, geröthet und mit kleinen Pusteln, fast wie mit einem chronischen Hautausschlage, bedeckt.

§. 281.

Ueber die entfernten Ursachen ist zu bemerken, daß sowohl die disponirenden als die Gelegenheitsursachen

namentlich auf zweyerley Wege die Krankheit zu erzeugen vermögen, nämlich entweder vom Gemüth aus, oder vom Organ. Zu den disponirenden Ursachen gehören aber lebhafte Phantasie, auf wollüstige Gegenstände durch häufige unschickliche Lektüre, durch schlüpfrigen Umgang und vieles Tanzen gerichtet; ferner Vollblütigkeit, lebhaftes Temperament, Genuß stark nährender und zugleich erhitzender, Congestionen nach den Geschlechtsorganen herbeyführender Speisen und Getränke, Schlafen in sehr warmen Betten, Mißbrauch der Kohlentöpfe, übermäßige Befriedigung des Geschlechtstriebes, zumal während der Schwangerschaft (wo um so eher bey der an sich stärkern Erregung des Geschlechtssystems und Unstatthaftigkeit neuer Conception die chronische Entzündung der Ovarien eintreten kann), Wurmbeschwerden, vorzüglich Askariden (welche sich zuweilen wohl selbst zu den Geschlechtsorganen verbreiten), scharfer weißer Fluß, Steine in den Harnwegen u. s. w. — Gelegenheitsursachen können fast die meisten derer, das Gemüth oder die Geschlechtsorgane afficirenden heftigen Reitze werden; wir zählen dahin namentlich Unglück in der Liebe (eine sehr häufige Veranlassung), plötzliche Entziehung des gewohnten Geschlechtsgenußes (weßhalb die Krankheit bey jungen Wittwen nicht selten beobachtet wird), Reitzung der Genitalien durch unpassend schlecht verfertigte oder gelegte Pessarien, durch drastische Abführmittel, durch Emmenagoga, zur Unzeit bey Amenorrhöe vollsaftiger Personen angewendet, durch stark reitzende Einspritzungen, syphilitische Ansteckung, heiße Dampfbäder u. s. w. — Alles Ursachen, deren Natur dem oben angegebenen entzündlichen Charakter der Krankheit vollkommen entspricht.

§. 282.

Die Prognose ist bey dieser Krankheit immer mißlich, jedoch am übelsten, wenn sie bereits den zweiten oder gar den dritten Grad erreicht hat, in welchem letztern sie in der Regel unheilbar zu seyn pflegt, vielmehr in vollkommner Tollheit, durch Epilepsie oder die übrigen §. 278. erwähnten Arten sich endigt: günstiger wird daher die Voraussagung nur da seyn können, wo die Krankheit auf einer niedern

Stufe verweilt, noch nicht von langer Dauer ist, und die veranlassenden Ursachen eine leichte Beseitigung gestatten. Selten beobachtete man, daß die Krankheit ohne ärztliche Hülfe sich glücklich entschied, und dann vornehmlich unter folgenden von Astruc *) aufgezeichneten Umständen, welche übrigens sämmtlich von der Art sind, daß sie mit unserer oben aufgestellten Ansicht von dem eigentlich Wesentlichen der Krankheit vollkommen übereinstimmen: — 1) nämlich hob sich die Krankheit zuweilen, indem ein starker Gebärmutterblutfluß entstand, 2) bey eintretendem starken Hämorrhoidalfluße, 3) durch langwierigen schwächenden weißen Fluß (welches alles auf Beseitigung entzündlicher Leiden hinweist), 4) durch eintretende wirkliche Schwangerschaft (welche indeß aus oben erwähnten Gründen kaum anders als im ersten Grade des Uebels Statt finden wird); 5) wenn der Uterus einen beträchtlichen Vorfall erlitt und nun der Einwirkung kälterer äußerer Temperatur ausgesetzt ist (wo die Kälte antiphlogistisch wirkt).

§. 283.

Die Regeln zur Behandlung der Mutterwuth mußten übrigens ebenfalls höchst schwankend bleiben, so lange man über das Wesentliche der Krankheit noch keinen bestimmten Begriff gefaßt hatte, und es scheint allerdings, als wenn auch hier theils die bisher durch Erfahrung bewährten Regeln mit der Meynung von der entzündlichen Natur des Uebels vollkommen übereinstimmten, theils diese Ansicht selbst zu neuen Behandlungsweisen nicht unwichtige Fingerzeige gewährt. Im Allgemeinen darf man daher wohl sagen, daß die Behandlung zwar nach den verschiedenen Stadien verschieden, aber doch immer vorzüglich antiphlogistisch werde seyn müssen, wobey indeß zugleich die speciellen veranlassenden Ursachen berücksichtigt werden müssen, und namentlich auch die allgemeinen diätetischen Regeln für dergleichen Unglückliche von besonderer Wichtigkeit sind, deren wir daher hier zunächst gedenken. Es gehört aber hierher 1) Aufent-

*) Maladies des Femmes. T. II. p. 570.

halt in reiner kühler Luft, 2) Vermeidung zu warmer Schlafstellen, daher leichte Bedeckung, Matrazen u. s. w. empfohlen werden müssen; 3) kühlende Diät, Obst, säuerliche wässerige Früchte, als Gurken, Melonen u. s. w.; 4) reichliches verdünnendes Getränk, aus Dekokten von Althäa und Queckenwurzel, der Gerstentrank mit Cremor tartari, Limonade u. s. w. — 5) Hinlängliche Beschäftigung der Körperkräfte durch Arbeiten, namentlich Gartenarbeiten; 6) Zerstreuung durch veränderten Aufenthaltsort und Umgebungen, weßhalb kleine Reisen sehr wohlthätig zu seyn pflegen; 7) strenge Bewahrung vor allem, wodurch Geschlechtslust erregt werden könnte, als z. B. häufiges Sehen männlicher Individuen, weßhalb nichts der Heilung hinderlicher seyn kann, als wenn in übelgeleiteten Irrenanstalten solche arme Geschöpfe neugierigen Fremden zur Schau dargeboten werden; vorzüglich aber muß hierher die Bewachung der Personen, um sie von der ihnen so gewöhnlichen Selbstbefriedigung abzuhalten, gerechnet werden, welche Aufgabe indeß oft schwer genug auszuführen ist, indem sie ihrem krankhaft herrschenden Triebe auf alle Weise genug zu thun suchen *) und oft das Anlegen von Zwangswesten und ähnlichen Vorrichtungen nöthig macht.

§. 284.

Die eigentlich ärztliche Behandlung muß nun insbesondre und zunächst die veranlassenden Ursachen berücksichtigen, und, in wiefern diese doppelter Art sind, d. i. theils vom Gemüth, theils vom Organ ausgehen, auch theils auf die Seele, theils auf den Körper wirken. — In ersterer Hinsicht, welche besonders in Fällen, wo die Krankheit durch psychische Einflüße herbeygeführt wurde, wichtig ist, kann namentlich bey geringerem Grade des Uebels die kräftige Erweckung des im Weibe doch so mächtigen Schamgefühls durch eindringende Vorstellungen des verständigen Arztes oder

*) Man beobachtet z. B., daß diese Personen, wenn sie an Reitzung der Schamtheile gehindert werden, durch Reitzung der Brustwarzen, ja durch Reitzung der Nasenlöcher, ihre traurige Lust zu büßen suchen.

auch wohl eines erfahrenen Geistlichen, sehr viel ausrichten. Außerdem sind mehrere andere entgegengesetzte, vorzüglich deprimirende Gemüthsbewegungen als Heilmittel zu Hülfe zu nehmen; hierher gehört namentlich in dem ersten Grade der Krankheit Erregung der Furcht vor den traurigen Ausgängen derselben, auch späterhin Schreck durch Drohungen.

§. 285.

In Rücksicht auf den Körper verlangt die Krankheit zunächst Entfernung fortwährend einwirkender localer Ursachen. Tragen die Personen Pessarien, so sind diese entweder ganz herauszunehmen (indem, wie oben bemerkt wurde, bey Gebärmuttervorfällen oft die Nymphomanie von selbst verschwand), oder, wenigstens wenn sie anderer Ursachen wegen nicht ganz entbehrt werden können, sind sie durch minder reitzende Unterstützungsmittel, z. B. durch einen eingelegten Schwamm, zu ersetzen. Eben so müssen Wurmcomplicationen gehoben, Ausschlagskrankheiten, jedoch mit Vorsicht, geheilt werden. Scharfer weißer Fluß macht besonders häufige Reinigung der Genitalien durch kaltes Auswaschen mit bittern Decokten nothwendig, obwohl Schleimflüße selbst, gleich andern vielleicht eintretenden Blutflüßen, hierbey nicht zu schnell unterdrückt werden dürfen. — Wäre übrigens Entziehung des naturgemäßen oder gewohnten Geschlechtsgenußes Krankheitsursache, und hat das Uebel noch keinen höhern Grad erreicht, wie namentlich gleich nach entwickelter Pubertät, so muß allerdings, wenn es sonstige Umstände erlauben, baldige Verheirathung empfohlen werden, indem dann oft die Veränderungen der Geburtstheile durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett das Uebel am gründlichsten heben können, dahingegen bey weiter vorgerückter Krankheit, auch die natürliche Befriedigung der Geschlechtslust nur die Krankheit erhöhen würde.

§. 286.

Ferner muß in Hinsicht der entzündlichen Natur der Krankheit außer dem oben erwähnten antiphlogistischen Regimen vorzüglich auch eine antiphlogistische ärztliche Behand-

lung durch innere und äußere Mittel empfohlen werden. Wir rechnen dahin, bey kräftigen vollsaftigen Individuen, die von Zeit zu Zeit wiederholten Blutentziehungen und kühlenden Abführungen aus Mittelsalzen, Pulpa tamarindorum u. s. w., die kühlen Bäder, die kalten Waschungen der Genitalien, die Umschläge von Camphoressig über dieselben. Ferner wirken antagonistisch erregte Absonderungen sehr vortheilhaft, als: die Ekelkur durch häufige kleine Dosen der Ipecacuanha, ja selbst Merkurialeinreibungen in die Leistengegend, sogar bis zur Erregung eines leichten Speichelflußes, oder oberflächliche Eiterungen durch Einreibungen von Tartarus emeticus (welche wir hier in höhern Graden des Uebels empfehlen möchten). — Was nun den höchsten Grad der Krankheit und oft schon den zweyten betrifft, so kann allerdings, namentlich bey schon beträchtlicher Dauer oft überhaupt keine vollkommne Heilung gehofft werden, und zwar immer um so weniger, je mehr sich die geistigen Thätigkeiten dabey gestört zeigen, und dann bleibt das Unterbringen solcher Unglücklichen in eine zweckmäßige Versorgungsanstalt, um sie den Augen der neugierigen Menge zu entziehen, oft das einzige Geschäft des Arztes; obwohl man vielleicht auch hier noch die Frage aufwerfen könnte, ob nicht durch eine längere Zeit noch anhaltend fortgesetzte antiphlogistische Behandlung, ja im äußersten Falle wohl selbst durch die Exstirpation der Ovarien (eine anerkanntermaaßen ohne allzugroße Gefahr des Lebens vorzunehmende Operation) Hülfe möglich sey? —

4) Unfruchtbarkeit (Sterilitas).

§. 287.

Wir bezeichnen auf diese Weise denjenigen Zustand des dem Alter nach zeugungsfähig seyn sollenden weiblichen Körpers, wo unter den äußern, im Normalverhältniß die Empfängniß zur Folge habenden Bedingungen dieselbe demohnerachtet gar nicht erfolgt; diejenigen Fälle daher schließen wir vom Begriffe der Unfruchtbarkeit aus, wo die Empfängniß

durch Mißverhältniß beiderseitiger Geschlechtstheile *), durch Abneigung zweier Gatten, oder durch männliche Impotenz verhindert wird, indem unter solchen Umständen wohl die Ehe, aber nicht das Weib unfruchtbar seyn kann, über welche Verhältnisse die nähere Erörterung in die gerichtliche Medicin gehört **).

§. 288.

Die Unfruchtbarkeit des Weibes ist nun aber eigentlich nicht an und für sich als Krankheit zu betrachten, sondern kann vielmehr nur die Folge allgemeiner oder örtlicher Krankheitszustände seyn, welche jedoch, da ihnen diese für das weibliche Leben so einflußreiche Wirkung gemeinsam ist, unter diesem Gesichtspunkt besonders zusammengestellt zu werden verdienen. Es gehören aber hierher: 1) allgemeine sehr phlegmatische oder mehr männliche Constitution, oft durch mangelnde Menstruation und sehr schwachen oder gänzlich fehlenden Geschlechtstrieb noch näher charakterisirt. 2) Ursprüngliche bedeutende Bildungsfehler der Geschlechtstheile, als Mangel der Ovarien, der Gebärmutter, bedeutende Verwachsungen der Vagina oder des Muttermundes (obwohl wir schon früher bemerkt haben, daß diese Verwachsungen allein doch wohl die Conception nicht immer unmöglich machen [s. Anmerk. zu §. 139.], wohin auch ein von H. Osiander ***) erzählter, und ein noch wichtigerer von

*) Einen Fall dieser Art s. in Stark's neuem Archiv f. Geburtshülfe. I. Bd. IV. St. S. 376.

**) S. darüber den 7. Abschnitt in dem kurzgefaßten System der gerichtlichen Arzneywissenschaft von J. D. Metzger. Vierte, von Gruner besorgte Auflage. 1814.

***) Dessen neue Denkwürdigkeiten. I. Thl. 1s Hft. S. 259. Eine Person hatte vor 8 Jahren zum zweiten Male geboren, und war 4 Jahre nachher von venerischer Krätze, weißem Fluß und Augenentzündung durch Quecksilber gründlich kurirt worden, dann wohl gewesen, nun schwanger geworden, hatte auch in der Schwangerschaft nichts krankhaftes empfunden, und demohnerachtet fand man die Vagina über zwei Zoll lang verwachsen. Hätte hier nicht vermuthet werden sollen, daß die Verwachsung während der Syphilis

Dr. Böniſch*) beobachteter Fall gehört), allgemeine ſehr beträchtliche Verengerung des Scheidenkanals, ſehr großes und feſtes Hymen, ja ſelbſt ein außerordentlich verengertes Becken. 3) Später entſtandene Verbildungen der Genitalien, welche den Coitus überhaupt, oder wenigſtens die normale Aufnahme und Zurückbehaltung des männlichen Sperma's hindern. Hierher gehören: ſtarke Einriſſe des Mittelfleiſches bis in den After, beträchtlicher Scheidenvorfall, Schiefлagen, Umſtülpung oder Vorfall des Uterus, und bedeutende Zerreiſſungen, Verhärtungen, Geſchwüre des Muttermundes**), Beſonders aber auch Ausartungen der Eyerſtöcke (z. B. Waſſerſucht derſelben), Verwachſungen der Muttertrompeten u. ſ. w. oder wohl gar Zerſtörungen oder Exſtirpationen einzelner Theile der innern Genitalien.

§. 289.

4) Fremde Körper in den Genitalien, als übelgelegte Peſſarien, Polypen von beträchtlichem Umfange in der Vagina oder im Uterus (kleinere Polypen des Uterus geſtatten wohl zuweilen die Conception, hindern jedoch in der Regel das Austragen der Frucht), Reſte der Placenta, Schleimpfröpfe u. ſ. w. — 5) Ein hoher Grad von Atonie der Geburtstheile, welcher entweder als torpide Schwäche, mit gänzlich geſunkener Senſibilität (durch Kälte, Schlaffheit, Unempfindlichkeit der Genitalien charakteriſirt) oder als Schwäche mit krankhaft geſteigerter Senſibilität (durch Schmerzhaftigkeit und Krämpfe in den Geſchlechtsorganen, und oft auch in den ihnen nahe liegenden Theilen, als im Darmkanal oder

---

vor 4 Jahren geſchehen ſey? oder darf man annehmen, daß eine Vagina während der Schwangerſchaftszeit und ohne andere Zufälle 2 Zoll weit verwachſen könne?

*) Berger Diss. Ad Theoriam de foetus generatione analecta. Lips. 1818. Die Perſon hatte nie gehörig menſtruirt, lange in der Ehe gelebt und bey endlich doch erfolgter Schwangerſchaft zeigte ſich nach langen Geburtswehen durchaus kein Muttermund.

**) Daß übrigens ſelbſt bey offnem Krebs der Gebärmutter zuweilen doch noch Conception erfolgen könne, hat die Erfahrung gelehrt.

in den Harnwegen sich äußernd) erscheinen kann. Diese Schwäche selbst kann denn wieder durch verschiedene Veranlassungen herbeygeführt worden seyn, z. B. durch ausschweifende Lebensart, langwierigen weißen Fluß, übermäßige Menstruation, sehr häufige Wochenbetten, öfteres Abortiren, schwere Entbindungen, Metrorrhagien, Syphilis, Wassersucht des Uterus u. s. w. — 6) Allgemeine bedeutende Krankheiten aller Art, Fieber, Wassersuchten, hoher Grad von Bleichsucht u. s. w. 7) Der zu häufige Coitus.

§. 290.

Die Prognose über Heilbarkeit oder Unheilbarkeit der Unfruchtbarkeit, welche namentlich in gerichtlicher Hinsicht oft, z. B. um das Urtheil in Ehescheidungssachen zu bestimmen, von besonderer Wichtigkeit ist, richtet sich natürlich ganz nach der Art der erwähnten verschiedenen, hierbey möglicher Weise zum Grunde liegenden Ursachen. — Ungünstig muß sie daher ausfallen bey beträchtlichen, keine Abhülfe durch Operation gestattenden Mißbildungen, oder später Statt gehabten Zerstörungen einzelner Geschlechtstheile, Wassersuchten der Eyerstöcke u. s. w.; günstiger hingegen bey Verbildungen der Geschlechtstheile, welche ärztliche Hülfe gestatten, z. B. Scheidenpolypen, kleinern Vorfällen und Schiefslagen des Uterus. Ueberhaupt aber werden dynamische Ursachen (z. B. Atonie der Geschlechtstheile) immer eine weit günstigere Prognose geben, als organische.

§. 291.

Eben so wie die Prognose wird sich nun auch die ärztliche Behandlung der Unfruchtbarkeit nach den verschiedenen ursachlichen Verhältnissen richten, so daß denn einleuchtend ist, wie bey männlichem Habitus, verbunden mit Mangel der Menstruation und des Geschlechtstriebes, bey Mangel einzelner Geschlechtstheile, besonderer Kleinheit des Becken- oder Scheidenkanals, überhaupt gar keine Hülfe Statt finden kann, dahingegen andere heilbare Krankheiten der Geschlechtstheile, als Atresie der Scheide oder des Uterus, Leucorrhöe, Gebärmutter- und Scheiden-Polypen, nach-

gebliebene Reste der Placenta u. s. w. theils schon erörterte, theils noch zu erörternde Heilungsmethoden nothwendig machen, weßhalb uns denn nur die hier ein besonderes Heilverfahren gebietenden Ursachen noch etwas näher zu erwägen übrig bleiben.

§. 292.

Wir rechnen hierher zunächst die allgemeine phlegmatische Constitution, durch schwammigen Körperbau, langsamen Puls, träges Temperament u. s. w. charakterisirt. Hier werden denn namentlich eine mehr reitzende Diät, der Gebrauch eines guten alten Weins, aromatische Kräuterbäder, spirituöse Waschungen des Rückgraths und der Kreuzgegend nach denselben, die Anwendung der Elektricität, innerlich der Chinaabkochungen mit der Tr. Cinnamomi, Cortic. aurant. u. s. w., ferner das Reisen, das Trinken des Driburger oder Pyrmonter Mineralwassers, verbunden mit Aufheiterung des Gemüths, nützlich werden. — Zweitens bey besonderer (obwohl nicht absoluter) Engigkeit der Genitalien müssen laue seifenhafte Bäder, Dampfbäder, eingebrachte, mit erweichenden, schleimigen, öhligen Dingen befeuchtete Schwämme, Einreibungen des Perinäi mit mildem Fett oder Oehl besonders empfohlen werden. Vorzüglich ist jedoch auch zu bemerken, daß bey so engen Genitalien oft die Befruchtung am ersten Statt finden wird, wenn der Coitus in der letzten Zeit der Menstruation, oder gleich nach Beendigung derselben vollzogen wird, indem hier die Genitalien noch mehr erweicht und erweitert zu seyn pflegen, und zugleich, wie schon oben bemerkt wurde, der weibliche Körper zu dieser Zeit am meisten der Conception fähig ist.

§. 293.

Was drittens die verschiedenen abnormen Lagen des Uterus betrifft, so machen diese zwar die Behandlung nöthig, von welcher noch späterhin bey den organischen Krankheiten des Uterus besonders die Rede seyn wird, allein es ist doch auch zu bemerken, daß bey gewissen fehlerhaften Lagen desselben auch durch eine besondere Haltung des Körpers mäs-

rend des Coitus selbst (z. B. nach Schmidtmüller*) bey Schiefslagen des Uterus nach rückwärts, wegen des nach dem Schambogen gedrängten Muttermundes durch den Coitus a posteriori) der Zweck der Empfängniß eher erreicht werden kann. Zuweilen kann wohl auch eine beträchtliche Weite und Schlaffheit die Ursache seyn, welche die zur Erzeugung nöthige Erregung, sowohl der männlichen als weiblichen Genitalien hindert; es sind dann die Bedingungen der Schlaffheit aufzusuchen, bey beträchtlichen Einrißen des Mittelfleisches wird daher eine neue Skarifikation der Wundränder, Anlegung der blutigen Nath und ruhige Lage nothwendig, um die Wiedervereinigung zu bewerkstelligen; außerdem hingegen bey bloßer Schlaffheit ist Anwendung adstringirender Mittel, des Waschens mit rothem Wein, der Einspritzungen der Dekokte von Eichen-, Weiden-, Ulmenrinde, der Tormentillwurzel, der Galläpfel, oder schwacher Eisenvitriolauflösungen zu empfehlen.

§. 294.

Wo ferner anderweitige allgemeine Krankheiten, Unregelmäßigkeiten der Menstruation, Bleichsucht, Syphilis, Skirrhus, Krebs, Wassersuchten u. s. w. die Conception hindern, muß theils nach oben entwickelten Grundsätzen, theils nach den Regeln, welche die specielle Therapie hierüber ertheilt, die Heilung derselben bezweckt, und nachbleibende allgemeine Atonie nach den §. 292. angegebenen Rücksichten behandelt werden. — Besonders häufig ist die örtliche Schwäche der Genitalien Ursache der Unfruchtbarkeit, und der Arzt muß daher trachten, erstens die Ursachen derselben, als Hämorrhagien, zu häufige oder zu starke Menstruation, Schleimflüße u. s. w. zu entfernen, theils den Schwächezustand selbst seiner Natur angemessen zu behandeln. Stellt sich daher die Schwäche, verbunden mit sehr erhöhter Sensibilität dar, so entstehen vorzüglich leicht krampfhafte Zusammenziehungen

*) S. dessen Handbuch der medicinischen Geburtshülfe. Thl. I. S. 46. wo überhaupt die Lehre von der Unfruchtbarkeit sehr vollständig abgehandelt ist.

der Muskelfibern des Scheidenkanals (Vaginalkrampf nach Schmidtmüller) machen den Coitus höchst schmerzhaft, zumal wenn sich zugleich in Folge mangelhafter Sekretion der Vagina eine Trockenheit derselben hinzugesellt und die Befruchtung findet nicht Statt. Bey diesem Leiden ist sodann vorzüglich auf den Stand der Sensibilität überhaupt Rücksicht zu nehmen, indem es am häufigsten bey hysterischen Individuen, bey Personen, welche an schmerzhafter Menstruation leiden u. s. w. vorkommt. Man muß daher die allgemeine Constitution durch bessere Lebensordnung und Diät zur Norm zurückführen, dabey laue Bäder, Landluft, roborirende Mittel zu Hülfe nehmen, und endlich, um die abnorme Reizbarkeit der Genitalien zu mindern, erweichende Dampfbäder*), Einreibungen des Olei hyoscyami, öfteres Einbringen eines Schwammes in laue mit Opiattinktur vermischte Milch getaucht, Einspritzungen von Abkochungen der Mohnköpfe, von Aufgüßen des Bilsenkrautes, der Kamillen, der Valeriana u. s. w. anwenden. —

§. 295.

Im Gegentheil aber kann auch torpide Schwäche vorhanden seyn, und dann ist vorzüglich theils im Allgemeinen auf Erregung einer kräftigern Reproduktion durch stärkende Diät, Reisen, Besuchen mineralischer Bäder und die übrigen §. 292. angezeigten Mittel Rücksicht zu nehmen, theils von den das Geschlechtssystem insbesondre in Anspruch nehmenden Mitteln Gebrauch zu machen, welches vorzüglich diejenigen seyn werden, deren bey Betrachtung der aus Torpidität verzögerten oder zu schwachen Menstruation öfters gedacht worden ist. Wir rechnen dahin namentlich die Verbindung des Extraktiv- und harzigen Stoffes mit ätherisch öhligten Bestandtheilen, also die China mit der Zimmttinktur, der Caskarille, den Gummiharzen, ja bey sehr hohem Grade der Atonie, der Sabina, und der Cantharidentinktur; gleichzeitig

*) Auch die örtlichen Bäder durch den Weiblich'schen Badestuhl (s. dessen kleine Schrift über den Badestuhl. Wien 1818.) versprechen hier besondern Nutzen.

den Gebrauch äußerer Mittel, der geistigen Einreibungen, des Einreibens vom flüchtigen Liniment mit Tr. Cantharidum in die Kreuzgegend, die Urtikation (das Streichen mit Nesseln, so daß die Blätter in einer den feinen Häckchen derselben entgegengesetzten Richtung die Haut berühren) das Tragen eines mit ätherischen Oehlen geschärften Emplastri aromatici, das trockne Frottiren der Schenkel, örtliche aromatische Bäder, die Anwendung der Elektricität u. s. w. — Auch von drastischen Abführmitteln, aus Rad. Jalappae, Rheum, Senna u. s. w., wenn sie von Zeit zu Zeit, als Erregungsmittel des dem Geschlechtssystem so nahe verwandten Darmkanals, dargereicht werden, hat man in Verbindung mit den übrigen Mitteln, vorzügliche Wirkungen bey diesem Zustande von Atonie beobachtet. — Endlich wird es der Arzt, wo er über den Zustand der Unfruchtbarkeit zu Rathe gezogen wird, nie umgehen können, rücksichtlich des ehlichen Umganges selbst beiden Gatten zweckmäßige diätetische Vorschriften zu ertheilen, vorzüglich das Uebermaaß desselben, eine gar nicht seltne Ursache der Unfruchtbarkeit, einzuschränken, die sonstigen Regeln aber nach den einzelnen vorkommenden Fällen zu bestimmen.

5) Hysterie, Mutterbeschwerung (passio hysterica, adscensus uteri).

§. 296.

Die Hysterie ist eine von denen Krankheiten, welche der außerordentlichen Vielgestaltigkeit ihrer Symptome wegen schwer eine vollständige Beschreibung, fast gar nicht eine kurze Definition zulassen, und welche, demohnerachtet so kenntlich sind, daß, wer sie nur einigemal gesehen hat, sie wenigstens nicht leicht wieder verkennen wird. — Vorzüglich hat man sie mit der Hypochondrie des männlichen Geschlechts zusammengestellt, und es hat dieß sogar Veranlassung zu der Streitfrage gegeben, ob beide nicht eins und dasselbe seyen? — Bejahend wurde diese Frage schon von mehreren ältern Aerzten, als Sydenham, Tissot

und Selle entschieden, und unter den Neuern tritt ihnen auch H. Jörg bey *), welcher selbst der Meynung ist, es sey besser, den Namen der Krankheit zu vertilgen, zumal da ihr Sitz nicht im Geschlechtssystem (worauf ihr Name von ὑστέρα, uterus, deutet) und es daher schicklicher wäre, sie als weibliche Hypochondrie zu bezeichnen, deren Charakter von der männlichen Hypochondrie nur indem er durch den Geschlechtscharakter modificirt werde, sich unterscheide. Entgegengesetzter Meynung sind Andere, z. B. H. Haase **), welcher sowohl in den wesentlichen Krankheitserscheinungen, als in der Art sie zu behandeln wichtige Unterschiede zwischen beiden findet. — Wir gedenken nun hier zuerst die Art des Vorkommens und die Aeußerungen der Hysterie zu schildern, und hoffen, daß sich sodann aus der Betrachtnng über das Wesentliche und Ursachliche dieser Erscheinungen auch das Verhältniß dieser Krankheit zur Hypochondrie ergehen werde.

§. 297.

Der hysterische Zustand also, von welchem wir vorläufig nur erinnern, daß er vorzüglich durch Störungen assimilativer und reproduktiver Thätigkeit, verbunden mit Verstimmungen im Leben des centralen und insbesondre des sympathischen Nervensystems sich ausspreche, kommt zwar namentlich in der eigentlich zeugungsfähigen Lebensperiode, vorzüglich zwischen dem 20—46sten oder 48sten Jahre vor, pflanzt sich jedoch zuweilen auch auf das spätere Lebensalter fort, so wie er mitunter wohl auch in der Entwicklungsperiode unter den hier einheimischen, oben beschriebenen Nervenleiden eine Stelle mit einnimmt, ja viele derselben wohl erst selbst hervorruft. Ein lebhaftes Temperament, eine reitzbare Körperconstitution, wie sie namentlich zartgebauten Brünetten eigen zu seyn pflegt, bilden ferner, verbunden mit stark entwickelter Geistesthätigkeit, diejenige Individualität, welche dieser Krankheit am mei-

*) Krankheiten des menschlichen Weibes. S. 585.

**) Ueber die Erkenntniß und Kur der chronischen Krankheiten. 2r Th. S. 282.

sten unterworfen zu seyn pflegt; übrigens kommt sie bey Frauen und Jungfrauen vor, und obwohl vorzüglich nicht verheirathete oder unglücklich verheirathete, kinderlose Frauen, besonders aber junge Wittwen, daran zu leiden pflegen, so bleiben doch selbst Schwangere, Wöchnerinnen und Stillende von diesen Anfällen nicht ganz befreyt.

§. 298.

Bey den Aeußerungen der Krankheit haben wir zuvörderst der Periodicität ihrer Anfälle zu gedenken, durch welche sie an andere ebenfalls in gewissen Zeiträumen wiederkehrende Nervenkrankheiten, z. B. die Epilepsie und den Veitstanz erinnert. Diese Periodicität aber ist in sofern zwiefach, als in einem Falle die Wiederkehr der Anfälle durch äußere Veranlassungen, Gemüthsbewegungen, starke Sinneseindrücke u. s. w. herbeygeführt wird, ohne diese Einflüße aber die Anfälle auf unbestimmte Zeit außen bleiben, und dieses Periodische ist dann ganz Produkt der Reitzbarkeit des Nervensystems und des äußern Moments; oder im andern Falle, wird die Wiederkehr des Paroxysmus mehr nach regelmäßigen Zeiträumen (ohngefähr wie die Wiederkehr eines Wechselfieberanfalls) bestimmt, und ist das Ursachliche davon mehr der andere Faktor der Krankheit, d. i. das reproduktive System, welches als ein Niederes dem wechselnden Gange des äußern Naturlebens mehr hingegeben ist, und von seinen Perioden mit afficirt wird, wohin denn ganz besonders die bey vielen Hysterischen zur Zeit der Menstruation stärkern Anfälle gehören. — Uebrigens darf die Periodicität dieser Krankheit nicht so verstanden werden, als ob außer den Anfällen ein vollkommnes Wohlbefinden Statt habe, indem vorzüglich die krankhafte Nervenreitzbarkeit, Gemüthsverstimmung, die Verdauungsbeschwerden, die Kranken nie zu verlassen pflegen.

§. 299.

Wir gehen nun zur Schilderung der verschiedenen Krankheitssymptome nach den einzelnen organischen Systemen über, und werden sodann von der Erscheinung des hysterischen Anfalls insbesondre handeln: — Animale Sphäre. 1) Symp-

tome gestörter Sensibilität. Ein vorzüglich gewöhnlicher Zufall ist die sehr gesteigerte Receptivität der Sinnesorgane, so daß das schwächste Geräusch, das Fallen eines Buchs, das Oeffnen einer Thüre, eine starke Anrede u. s. w. die Kranken wirklich schmerzhaft oder schreckhaft afficirt; eben so pflegt es mit den übrigen Sinnen zu seyn: das Auge verträgt weder helles Licht noch kräftige Farbe, nur was matt, schwächlich, schmachtend aber zierlich ist, gefällt solchen Kranken. Besonders aber ist auch die Empfindlichkeit im Geruch und Geschmack gesteigert; schon der Geruch einer Blume, noch weit mehr aber der von stärkern flüchtigen Arzneystoffen, Campher, Moschus u. s. w. erregt oft Schwindel und Ohnmachten, und überhaupt sind die sonderbarsten Idiosynkrasien hier ganz in der Ordnung, so daß dagegen oft wieder andere sehr widrige Dinge, z. B. Castoreum, Asa foetida, ganz leicht genommen werden. Zu dieser geschärften Sensibilität gehört auch das feinere Gefühl für die Individualität anderer Personen, und sonstige äußere Verhältnisse, welche auf die Sinne eines gesunden Körpers keinen Eindruck machen, in welcher Hinsicht mir wieder an das erinnern müssen, was oben über Nervenzufälle in den Entwicklungsperioden gesagt ist. Ferner gehören hierher die mannigfaltigen Sinnestäuschungen, und die sehr erhöhte Empfindlichkeit des innern Sinnes gegen alle Arten von Krankheitszuständen. Als Folgen der erstern nämlich sind die Flecken, Funken, Bilder, Phantasmata vor den Augen, das Doppeltsehen, das Brausen vor den Ohren u. s. w., als Folgen der letztern die häufigen Klagen, zum Theil über ganz eigene Krankheitsempfindungen, zu betrachten.

§. 300.

Diese besondern Krankheitsempfindungen beziehen sich vornehmlich auf Kopf und Unterleib. Im erstern stellen sich oft heftige, bohrende, immer auf einem Punkt fixirte Schmerzen ein (Clavus hystericus), oder der Schmerz erscheint als heftiges beschwerliches Ziehen in der Hinterhauptsgegend, als Migräne, auch als äußerliches Reißen, Gefühl von Kälte, Schmerzen längst des Rückenmarks, Empfindung von Ameis-

Heraufkriechen in demselben; im Unterleibe als schmerzhafte Spannung in den Präcordien, Gefühl von Zusammenschnürung an einzelnen Stellen des Darmkanals, welches oft den Ort wechselt, und daher von den Kranken mit der Empfindung einer sich fortbewegenden Kugel verglichen wird (Globus hystericus), vorzüglich aber von Schmerz im Uterus selbst, vielleicht oft durch Krampf der Muskelfibern in den runden Mutterbändern veranlaßt, welches von den Kranken als schmerzhaftes Aufgehobenwerden des Uterus beschrieben wird.

§. 301.

Ueberhaupt aber müssen hierher auch noch die Verstimmungen des höhern Nervenlebens, sowohl im Schlafe, als im wachen Zustande gerechnet werden. Der Schlaf nämlich ist gewöhnlich höchst unruhig bis zur wahren Agrypnie, unruhige, äußerst lebhafte Träume, Schlafredneren, und selbst Nachtwandeln kommen nicht selten vor. Im wachen Zustande zeigt sich eine außerordentliche Erregbarkeit des Gemüths, die verschiedensten Stimmungen wechseln sehr rasch, die unbedeutendsten Veranlassungen erregen Aergerlichkeit, Trübsinn, Weinen; aus Melancholie, welche jedoch im Ganzen vorherrschend ist, springt oft eine Kranke dieser Art zur Lustigkeit über, besonders aber werden hysterische Individuen durch eine ungemeine Redseligkeit charakterisirt, mit welcher sie oft, zu nicht geringer Qual des Arztes alle, auch die unbedeutendsten Krankheitssymptome, ja oft diese gerade am meisten, erörtern, hierbey auch es sich angelegen seyn lassen, alles recht gewaltig, gefahrdrohend und unerträglich zu schildern, ja oft zu Erdichtungen ihre Zuflucht nehmen, und sich beleidigt fühlen, wenn der Arzt nicht mit derselben Wichtigkeit wie sie, die Krankheit betrachtet.

§. 302.

2) Die Symptome gestörter Muskularthätigkeit betreffend, so sind hierher die vielfachen Arten von Krämpfen zu rechnen, woran hysterische Kranke zu leiden pflegen, Zufälle, deren eigentliche Natur in vieler Hinsicht noch eine wichtige Aufgabe für Physiologen und Patho-

logen ist, und worüber denn zuvörderst im Allgemeinen noch einige Betrachtungen hier stehen mögen. Nehmen wir aber zuvörderst die Erscheinung des Krampfes in einem willkührlichen Muskel, wo er sich am deutlichsten verfolgen läßt, so finden wir denselben in einem sonst ganz gesunden Körper namentlich unter zwey Bedingungen, entweder nämlich bey zu heftig einströmender Blutmasse, oder bey zu stark einstrimender Nervenwirkung; hat z. B. ein Muskel geruht, oder ist er auch schon ermüdet, und wirkt plötzlich eine heftige Willenserregung auf denselben, so tritt Krampf ein, die Muskelsubstanz, durch plötzlich gesteigerten Einfluß des Nerven gewaltsam gegen die nervige Mitte angezogen, erstarrt gleichsam, preßt den Nerven, erzeugt Unbeweglichkeit (Starrkrampf) oder bey schwächerer Muskularthätigkeit nur periodisches Angezogenwerden, Zittern (Zuckungen) und heftigen Schmerz, wie dieß Jeder zuweilen besonders in den größern Muskeln, z. B. den Wadenmuskeln, erfahren haben wird. Etwas ähnliches geschieht aber auch, wenn der Blutlauf gegen eine ruhende Muskelpartie längere Zeit einigermassen durch Druck gehindert war, nun dieser Druck aufhört, und eine verhältnißmäßig größere Blutmenge, als die, woran der Muskel bereits sich gewöhnt hatte, zuströmt; auch hier ist der Muskel gespannt, seiner freien Bewegung beraubt, es entsteht ein prickelnder Schmerz (das sogenannte Einschlafen der Glieder) und nur erst wenn das Gleichgewicht der Blutvertheilung wieder hergestellt ist und dieser Theil sich wieder an die ihm zugetheilte Menge gewöhnt, tritt die freye Bewegung wieder ein, welche jedoch hier überhaupt nicht in dem Maaße, als im erstern Falle, gerauh zu seyn pflegt, hier aber auch nicht wie im erstern Falle durch Zuckungen, sondern nur durch mehr oder minder gelähmte Bewegung (Starrkrampf) sich äußern wird.

§. 303.

So wie nun auf diese zweyerley Weise im gesunden Körper ein schnell vorübergehender Krampf entstehen kann, so entstehen durch diese Veranlassungen, die sich wohl auch zum Theil mit einander verbinden können, im krankhaft ver-

kimmten Organismus heftigere Krampfzufälle, wobey die Ursache der stärkern Nervenerregung entweder in äußern, die Nervenenden afficirenden Reitzen, oder in innern, auf die Centralmassen des Nervensystems wirkenden Momenten liegen kann, in welchem letztern Falle die Krämpfe (Starrwerden oder konvulsivische Bewegungen) allgemein zu werden pflegen. Eben so kann denn auch die Gefäßthätigkeit entweder im Allgemeinen heftig aufgeregt seyn und Krämpfe bewirken (wohin die krampfhaften Zustände in entzündlichen Fiebern gehören) oder örtlich angeregt krampfhafte Erstarrungen veranlassen (wohin die Krampfzufälle bey Entzündungen und Congestionen gehören). Im Ganzen scheinen auf die letztere Weise (vom Gefäßsystem aus) vorzüglich die Krämpfe in den unwillkührlichen Muskeln zu entstehen, so daß wir die krampfhaften Einschnürungen des Darmkanals in der Kolik, die krampfhaften Zustände in den Harnwegen, die Einschnürungen des Uterus u. s. w. vorzüglich aus diesem Gesichtspunkt betrachten möchten, womit das Gesellen dieser Zufälle zu entzündlichen Zuständen und Congestionen, und die hierbey oft so entschieden hülfreiche antiphlogistische Behandlung in vollkommnem Einklange steht.

§. 304.

Was nun die Krampfzufälle hysterischer Individuen insbesondre anbelangt, so gehören sie beiden erwähnten Gattungen an und erscheinen überhaupt hier fast in allen möglichen Formen, Starrkrampf, Convulsionen, Catalepsis, Veitstanz, Sardonisches Lachen, Hundskrampf, besonders aber die Krämpfe in den der Willkühr im Normalzustande entzogenen Gebilden, Brustkrämpfe, Schluchzen, Magenkrampf, Kolik, Gebärmutterkrampf sind bald einzeln, bald mehrere zugleich, in den Anfällen der Hysterie öfters bemerkbar, und bringen mehrere der oben genannten besondern Schmerzgefühle hervor. — Die Krämpfe selbst erreichen übrigens auch hier oft eine ungemeine Heftigkeit, so daß wir wieder an Mehreres oben bey den Krampfzufällen in der Entwicklungsperiode Erwähnte (§. 254.) erinnern können.

§. 305.

Reproduktive oder vegetative Sphäre. 1) Symptome gestörter Gefäßthätigkeit sind zunächst der sowohl außerhalb als namentlich innerhalb der Anfälle veränderte Pulsschlag, gewöhnlich durch Frequenz und Kleinheit, seltner durch Langsamkeit, dagegen oft durch Unordentlichkeit ausgezeichnet, ferner große Neigung zu Congestionen und Fieberbewegungen, häufiges Herzklopfen, schneller Wechsel der Temperatur an der Oberfläche des Körpers, so wie der Hautfarbe, namentlich aber die vielfachen Rückwirkungen, welche die abnorme Gefäßthätigkeit auf andere Systeme äußert, wohin die Anfälle von Schwindel, Ohnmachten, ja vollkommen asphyktischer Zustand, so wie mehrere der oben erwähnten Sinnestäuschungen u. s. w. zu rechnen sind.

§. 306.

2) Die Symptome gestörter Verdauung betreffend, so fehlen sie fast nie und äußern sich auf die verschiedenste Weise, nämlich: 1) durch Appetitlosigkeit oder widernatürliche Appetite; 2) verdorbenen, bald bittern oder fauligten, bald salzigen oder sauren Geschmack; 3) eine belegte schleimige Zunge; 4) durch öfteres Aufstoßen und überhaupt ganz besondere Neigung zu starker Luftentwicklung im Darmkanal; 5) Erzeugung von Säure in den ersten Wegen (obwohl es mir scheint, als ob dieses Symptom der Hypochondrie, und zwar vielleicht der im Manne überhaupt vorwaltenden Oxydation wegen weit mehr als der Hysterie eigenthümlich sey.); 6) schlechte Verdauung, wo entweder die Nahrungsmittel zum Theil unverändert wieder abgehen, oder Druck, Schmerzen und Krämpfe veranlassen, auch wohl überhaupt die Assimilation sehr langsam von Statten geht, so daß daher Kranke solcher Art mitunter eines ungewöhnlich langen Fastens fähig sind; 7) fehlerhafte Gallenabsonderung theils der Menge nach (Polycholie), theils der Qualität nach (wo sich zuweilen Gallensteine erzeugen); 8) Unordnung in den Stuhlausleerungen, daher oft öfterer Wechsel von theils flüßigen, theils verhärteten Stuhlausleerungen,

obwohl die seltnen trägen knotigen Darmexcretionen diesen Kranken am gewöhnlichsten zu seyn pflegen.

§. 307.

3) Symptome gestörter Athmung so wie abnormer secernirender Thätigkeit. Zu den erstern rechnen wir namentlich die gewöhnlich durch abnorme Reizbarkeit der Bronchien begründeten asthmatischen Anfälle, den krampfigen Husten u. s. w. — Zu den letztern theils die abnormen Zustände der Hautausdünstung, durch häufigen Schweiß oder auch im Gegentheil durch sehr trockne Haut bezeichnet, theils abnorme Verhältnisse in der Thätigkeit der übrigen größern Ausscheidungswerkzeuge, unter welchen wir noch der Harnwege insbesondre gedenken müssen, indem die Nieren vorzüglich in und nach den Anfällen eine abnorme Menge hellen wäßrigen Urins auszuscheiden pflegen, und selbst in der Blase eine Menge krampfhafter und schmerzhafter Zustände bey Hysterischen nicht selten bemerkt werden.

§. 308.

Ob endlich 4) das Geschlechtssystem an dieser Krankheit bedeutenden Antheil nehme, darüber sind wieder die Meynungen getheilt, indem die ältern Aerzte fast alle übrigen Zufälle von diesem System ableiteten, mehrere Neuere hingegen behaupten, daß der Antheil desselben äußerst unbeträchtlich sey. Erwägt man nun aber genauer, wie bey den meisten Hysterischen beobachtet wird, daß wenn auch die Bildung der Geschlechtsorgane, ja selbst die Menstruation keine hervorstechenden Regelwidrigkeiten zeigt, doch gewöhnlich der eigentliche Zweck des Geschlechtsorganismus, die Erzeugung, unvollkommen erreicht wird, indem es unverheirathete, vorzüglich aber verheirathet gewesene, oder unglücklich verheirathete, auch die den klimakterischen Jahren sich nähernden Individuen sind, bey welchen die Krankheit am öftersten vorkommt, erwägt man ferner, wie tief das Geschlechtssystem überhaupt in das Wesen des weiblichen Körpers eingreift, welches eben durch die vorwaltende Produktivität desselben ausgesprochen ist, und wie nothwendig es allgemeine Zerrüt-

lung und Verstimmung veranlassen muß, wenn die eigentliche Bestimmung, der Zweck, auf welchen alles hinweist, gar nicht oder unvollkommen erreicht wird, so muß man wohl mehr der ältern Ansicht von dieser Krankheit beypflichten, wovon noch bey der Untersuchung der sogenannten nächsten Ursache weiter die Rede seyn wird. Uebrigens ist denn doch auch nicht zu läugnen, daß Unordnung der Menstruation, vorzüglich die zu häufige, oder zu seltne, oder unterdrückte Menstruation, ferner anderweitige Krankheiten der Geschlechtstheile, als: weißer Fluß (ein besonders häufiger Begleiter der Hysterie), Verhärtungen, Krämpfe im Uterus u. s. w. so wie abnormes Verhältniß des Geschlechtstriebes, gar nicht selten bey solchen Kranken wahrgenommen werden.

§. 309.

Wir kommen nun zur Erörterung des Wesens (der nächsten Ursache) der Hysterie und Bestimmung ihres Verhältnisses zur Hypochondrie, eine bey der Vielgestaltigkeit des Gegenstandes allerdings schwierige Aufgabe; demohnerachtet scheint uns in folgender Bestimmung das Wesentlichste aufgefaßt werden zu können, indem wir sagen, daß die Erscheinungen der Hysterie zunächst bedingt werden: durch eine Verstimmung des Nervensystems, welche eine Folge ist des Mißverhältnisses zwischen allgemeiner und geschlechtlicher Produktivität. Auf diesen Krankheitsgrund weisen auch die entfernten, sowohl disponirenden als Gelegenheitsursachen hin, denn alles, was Mißverhältnisse in der reproduktiven Thätigkeit erzeugt, und zugleich die Erregbarkeit des Nervensystems steigert, führt die hysterischen Beschwerden herbey; hierhin gehört: schwächliche, reitzbare, angeborene, oder durch luxuriöse Erziehung, zu zeitig angestrengte Geistesthätigkeit und sonstige unpassende Lebensweise erworbene Constitution; ferner unordentliche Diät (Köchinnen leiden deßhalb nicht selten an Hysterie), das in den höhern Ständen gewöhnliche Untereinandermischen von Thee, Kaffee, Backwerk, Chokolade u. s. w., dabey vieles Sitzen und Beschäftigung mit weiblichen Arbeiten, wodurch eben so wie durch beengende Kleider, Schnürbrüste u. s. w.

der Unterleib zusammengepreßt und die Verdauung gestört wird, auch üble Luft, schwerverdauliche Nahrung; dann psychische Einflüße, als: Erregungen der Phantasie durch ungewählte Lektüre, Einwirkung verschiedenartiger Leidenschaften oder deprimirender Affekte, unglückliche Liebe und endlich geschlechtliche Ausschweifungen oder gänzlicher Mangel an naturgemäßer Befriedigung des Geschlechtstriebes, Störungen der Menstruation, Krankheiten der Geschlechtsorgane, Unfruchtbarkeit oder zu häufige Wochenbetten, ja auch wohl zuweilen plötzlich gehemmte andere Krankheiten, Gicht oder chronische Hautausschläge.

§. 310.

Das Verhältniß aber der Hysterie zur Hypochondrie betreffend, so scheint es kein anderes als das des weiblichen Geschlechts zum männlichen überhaupt; auch die Hypochondrie nämlich ist zwar in Verstimmung des Nervenlebens in Folge abnormer Zustände der reproduktiven Funktionen begründet, allein wie im männlichen Körper überhaupt die assimilativen Funktionen weniger überwiegen, wie das Geschlechtssystem hier weniger als im Weibe in das Ganze eingreift, wie dagegen gerade hier die Produktivität und Kraft mehr in einer höhern Sphäre sich offenbaren sollen, so nehmen nun auch Störungen dieser Thätigkeiten hier eine ganz andere Form als im Weibe an, äußern sich in Verfinsterungen des Gemüths (besonders in Menschen, welche überhaupt mit sich nicht zu Klarheit und Frieden gekommen sind) und durch alle jene Beschwerden, welche vorzüglich auf gestörte Unterleibsfunktionen hinweisen, indeß gerade hier wegen dieser Unklarheit des Gemüths mit solcher Heftigkeit empfunden werden.

§. 311.

Den Krankheitsverlauf des hysterischen Zustandes anbelangend, so ist er im Ganzen langwierig, im Besondern ein remittirender zu nennen. Die Krankheit pflegt nämlich, wie schon oben (§. 299.) erinnert wurde, Anfälle zu machen, welche theils der Art ihrer Erscheinung, theils

licher dieſelbe iſt, je mehr erregt die Receptivität des Nervenſyſtems erſcheint, je mehr vielleicht das Uebel ſelbſt durch erbliche Anlage als begründet angenommen werden kann, oder auf unvollkommen erfolgter Entwicklung des ganzen Körpers beruht, um ſo geringer iſt die Ausſicht auf baldige Genesung. 2) Nach dem Stande der Digeſtions- und Aſſimilationsorgane; je weniger dieſe etwa durch eine ſehr lange Dauer des Uebels zerrüttet ſind, um ſo größer wird die Hoffnung zur Heilung ſeyn. 3) Nach dem Zuſtande der geſchlechtlichen Funktionen, welche, je regelmäßiger ſie von Statten gehen, auch um ſo mehr die Heilbarkeit des Uebels erwarten laſſen (daher zuweilen Wiedereintritt der Menſtruation, oder beginnende Schwangerſchaft die Hyſterie beſeitigen). 4) Nach dem Verhältniſſe zu andern Krankheiten, indem der Eintritt ſekundärer Krankheiten (§. 313.) natürlich die Prognoſe verſchlimmern muß, dahingegen die Wiederkehr vorher unterdrückt geweſener Krankheiten, z. B. von Hautausſchlägen, Hämorrhoiden, Gicht, auch vortheilhaft wirken kann. 5) Nach den Urſachen der Krankheit und den ſonſtigen Verhältniſſen der Kranken, ob es überhaupt möglich oder wenigſtens in der Gewalt des Arztes iſt, die letztern für ſeinen Zweck günſtiger zu ordnen, und die erſtern zu beſeitigen.

§. 315.

Behandlung. Wie bey Behandlung der Nervenzufälle in den Entwicklungsperioden (§. 274.) iſt auch bey Hyſteriſchen, ja vielleicht hier, der größern Erfahrenheit der Kranken wegen, noch mehr, die Individualität des Arztes von wichtigem Einfluß. Ernſte, ruhige, Vertrauen erregende Beſonnenheit des Arztes, übrigens ohne abſtoßende Kälte, wirkt auf ſolche Kranke äußerſt wohlthätig, und oft mindert dann ſchon die Gegenwart deſſelben den Anfall um Vieles. Wie nun aber ein ſolches Benehmen eines Theils den Kranken äußerſt nützlich wird, ſo iſt dieſe Beſonnenheit auch dem Arzte beſonders nothwendig, um bey den gewaltſamen Stürmen der Krankheit nicht des Vermögens einer ruhigen Erwägung des eigentlich Weſentlichen verluſtig zu gehen, und aus den wortreichen Berichten der Kranken das Wichtige

Herauszunehmen und es von dem minder Wichtigen zu scheiden, wobey man denn oft finden wird, daß gerade diejenigen Symptome, worauf die Kranken in ihren Erzählungen das meiste Gewicht legen, und die sie oft mit unermüdlicher Redseligkeit schildern, weit weniger beachtet zu werden verdienen als andere, welche sie oft während ihrem Berichte ganz unwillkührlich verrathen oder nur nebenbey erwähnen.

§. 316.

Ferner ist nicht zu übersehen, daß diese Kranken eine große Neigung haben, ihre Krankheitssymptome als recht gefährlich vorzustellen, ja deren wirklich mitunter, aus einer gewissen Sucht bewundert zu werden, erdichten; welches indeß den Arzt auch nicht dahin bringen darf, ihnen das Gehör gänzlich zu versagen, als wodurch leicht eine nachtheilige Spannung zwischen der Kranken und dem Arzte erzeugt, und wenigstens die psychische Einwirkung des letztern gänzlich gehemmt wird, ja welches zum Theil auch deßhalb ungerecht wäre, da die Kranke ihr eingebildetes Leiden oft nicht minder heftig als ein wirkliches empfindet.

§. 317.

Bey der Behandlung selbst verdienen nun zwei Punkte vorzüglich berücksichtigt zu werden: Erstens daß der Arzt alle Gewalt, welche er über die Kranke besitzt, zunächst darauf verwende, die Feststellung einer zweckmäßigen Lebensordnung und Diät zu erhalten. — In Vergehungen gegen solche Regelmäßigkeit ist ja in den meisten Fällen die Ursache des Krankseyns zu setzen und daher auch keine Hoffnung zur Heilung zu fassen, wenn nicht die Kranken dahin zu bewegen sind, zweckmäßigen Verordnungen in dieser Hinsicht sich zu fügen. Zweitens aber muß im Allgemeinen gegen die bey diesen Krankheiten so gewöhnliche blos symptomatische oder palliative Behandlung gewarnt werden. Wie wir nämlich erinnert haben, ist zwar die Erscheinung der Krankheit oft eine bloße Kette von Symptomen aufgeregter Sensibilität, allein das Bedingende derselben ist vielmehr die Störung der Reproduktion, und zwar sicher nicht blos in wiefern das

Nervensystem diese Störungen wahrnimmt, sondern auch in wiefern seine Bildung selbst leidet. Wird daher die Krankheit fortwährend mit sogenannten Nervenmitteln, krampfwidrigen Mitteln u. s. w. bekämpft, auf die Wurzel aller Bildungsthätigkeit aber, d. i. auf Digestion und Sanguifikation keine oder nicht genügende Rücksicht genommen, so kann es leicht der Fall seyn daß, obwohl hin und wieder die Krankheit etwas erleichtert wird, sie doch im Ganzen immer tiefer einwurzelt, immer mehr die Quellen des Lebens untergräbt, und immer unheilbarer wird.

§. 318.

Es wird sonach auch hier Aufgabe der Behandlung, zuvörderst dem Gange der Krankheit, den in irgend einem gegebenen Falle vorhandenen besondern Ursachen ihrer Entstehung nachzuspüren und diese zu bekämpfen. Finden sich daher, was hier so häufig bemerkt wird, in Folge früherer scrofulöser Zustände Auftreibungen der Unterleibseingeweide, verschleimter Zustand des Darmkanals, fehlerhafte Gallenbereitung, Obstruktion u. s. w., so muß abgesehen von allen andern Symptomen (von palliativer Behandlung der dringendsten sprechen wir weiter unten), durch zweckmäßige Anwendung resolvirender Mittel, des Extract. Taraxaci, Saponariae, Chelidonii, der Mittelsalze, mit Rheum, Senna u. s. w., der Seife, der Antimonialien, der frischen Kräutersäfte, durch Besuchung des Karlsbades, durch Anordnung einer sehr einfachen strengen Diät, bey fleißiger Körperbewegung im Freien, äußerlich durch Friktionen des Unterleibes und Seifenbäder, zunächst die Beseitigung der abnormen Zustände des Darmkanals, Zweck der Behandlung bleiben. Gleichermaaßen kann aber auch das Gefäßsystem selbst der Sitz der Krankheit seyn, die Blutbereitung ist bey Hysterischen oft sehr reichlich, das Blut selbst oft, aus der Ader gelassen, dick und sehr wenig geröthet, es bilden sich dann Ueberfüllungen, namentlich des Venensystems, und ganz besonders des durch einen Zwischenkreislauf (in der Leber) vom allgemeinen Kreislaufe und der Einwirkung des Herzens mehr entfernten Pfortadersystems, es wird dadurch das Gan-

glienſyſtem nachtheilig afficirt, ja es werden Congeſtionen nach Bruſt und Hirn veranlaßt. Dieſen Zuſtand bemerken wir vorzüglich bey kurzen gedrängten Körpern, welche eine reichliche Diät führten, beſonders mit Abnormitäten der Menſtruation, Verbildungen der Geſchlechtstheile, welche Empfängniß hindern, verbunden, und er pflegt ſich dann auch namentlich durch Schwindel, Alpdrücken, Ohnmachten und heftige Krämpfe der willkührlichen Muskeln zu äußern.

§. 319.

Unter ſolchen Verhältniſſen wird dann auch das Heilverfahren zunächſt gegen die Abnormitäten des Gefäßſyſtems gerichtet ſeyn müſſen. Den Anfang der Kur wird man öfters durch eine oder einige allgemeine Blutentziehungen zu machen genöthigt ſeyn, obwohl der Vortheil den ſie gewähren, in der Regel nur vorübergehend iſt, vorzüglich aber iſt durch wenig nährende, mehr vegetabiliſche Diät, durch reichliches ſäuerliches Getränk, durch hinlängliche Bewegung zur Verminderung der Blutmaſſe zu wirken. Dabey ſind namentlich Obſtruktionen im Darmkanale zu verhüten, öftere blande Abführungen erweiſen ſich wohlthätig, und nach denſelben iſt ſodann insbeſondre von den die Contraction im Gefäßſyſtem erregenden Mitteln, den mineraliſchen Säuren (Elixir. vitrioli Mynsicht. z. B.), ſo wie von den rein bittern Mitteln Gebrauch zu machen. — Außerdem gehen jedoch nicht ſelten die Störungen der Reproduktion in der Hyſterie von krankhaftem Zuſtande der Geſchlechtsfunktion ſelbſt aus, und dann muß auch gegen dieſe die Behandlung vorzüglich gerichtet ſeyn; Abnormitäten der Menſtruation müſſen ſodann nach oben erörterten Grundſätzen beſeitigt, Krankheiten des Uterus, der Ovarien u. ſ. w., nach ſpäter durchzugehenden Regeln behandelt werden, bey einer dem Allgemeinbefinden unangemeſſenen erzwungenen geſchlechtlichen Enthaltſamkeit, muß der Arzt zur Verehlichung rathen, indem bey Individuen dieſer Art oft Beſchwerden, welche keinerley Mitteln weichen wollten, in der eintretenden Schwangerſchaft oder wenigſtens nach der Geburt verſchwinden. Eben ſo ſehr können indeß andern Theils Ausſchweifungen, namentlich

Selbstbefriedigung, Mißverhältnisse der Reproduktion und Verstimmung der Sensibilität veranlassen, und dann müssen theils eindringende Vorstellungen, theils genaue, freylich oft schwer mögliche Aufsicht als wesentliche Mittel der Heilung in Ausführung gebracht werden.

§. 320.

Endlich aber bemerken wir, daß oft die Hysterie auf ganz ähnliche Weise an die klimakterischen Jahre, wie die oben erwähnten Nervenzufälle an die Pubertätsentwicklung, geknüpft sind. In wiefern nämlich bey herannahendem Alter die Produktivität immer stufenweise abnimmt, bey einer gewissen Stufe aber unfähig wird, die Menstruation als gleichsam kritischen Blutfluß monathlicher Congestionen zu erzeugen, obwohl eine im Verhältniß zum Körper reichlichere Säfteerzeugung nichts destoweniger noch eine Zeitlang Statt findet, wie sich nun selbst bey gesunden Körpern um diese Periode mancherley obwohl gewöhnlich bald vorübergehende Beschwerden erzeugen, so kann dadurch bey krankhaft gesteigerter Sensibilität oft die ganze Reihe hysterischer Zufälle rege gemacht werden. Dieser Zustand giebt dann zwar, in wiefern man erwarten darf daß nach beendigter Revolution auch jene krankhaften Erscheinungen sich verlieren werden, im Ganzen eine günstige Prognose, läßt jedoch auch nur ein sehr beschränktes, fast allein auf Minderung der hervorstechendsten Symptome abzweckendes Heilverfahren zu, und in wiefern nun überhaupt bey der Hysterie, namentlich während der Anfälle öfters die einzelnen Symptome eine besondre augenblickliche Behandlung nöthig machen, gehen wir jetzt noch die hierfür geltenden Regeln in der obigen Ordnung (§. 300. u. f.) durch.

§. 321.

1) Für die Behandlung der Zufälle von gesteigerter Sensibilität aber, welche, theils wo den frühern Anzeigen hinsichtlich der Reproduktionsstörungen bereits Genüge geleistet ist, zur Hauptindikation wird, theils in den Stürmen der Anfälle dringend nöthig erscheint, möchten wir zwei Wege unterscheiden, welche man den negativen und positiven nennen

Kranke. Der erstere nämlich wird auf Minderung äußerer Erregungen abzwecken, es wird dahin gehören Aufenthalt des Kranken an einem ruhigen, weder zu hellen noch zu dunkeln, mäßig erwärmten, mit reiner Luft erfüllten Ort, Entfernung von Personen, welche widrig oder überhaupt erregend auf die Kranke wirken. Der andere wird auf die Anwendung von Mitteln gerichtet seyn, welche die allgemeine oder lokale abnorme Erregung herabstimmen, und hierher gehört nun wieder der ganze Heilapparat, welchen wir bey den der Hysterie nahe verwandten Nervenzufällen der Entwicklungsperiode durchgegangen haben (s. §. 265. u. f.), also laue allgemeine Bäder, örtliche Dampfbäder, Fomentationen, Cataplasmata, Friktionen, die narcotica, antispasmodica und die imponderabeln Arzneymittel, von denen allen am angeführten Orte bereits das Nähere angegeben worden ist.

§. 322.

2) Da die Störungen der Muskularthätigkeit vorzüglich Produkte abnormer Einwirkungen des Nerven- und Gefäßsystems auf die Muskelfaser sind, so werden sie auch nur von diesen Seiten her behandelt werden können. Krämpfe also, von abnormer Nerventhätigkeit erregt, machen wieder das im vorigen Paragraph erwähnte Verfahren nothwendig, dahingegen die durch Congestionen, entzündliche Reizungen u. s. w. bedingten, die Behandlung krankhafter Gefäßthätigkeit fordern. 3) Die Störungen der Blutbewegung selbst betreffend, so kann, wie oben bemerkt wurde, in der Behandlung dieser Abnormität allerdings oft die Hauptindikation liegen, oft aber wird sie auch nur symptomatisch gefordert, da schon früher bemerkt ist, wie häufig selbst bey anscheinend reinem Nervenleiden das Gefäßsystem im Spiel zu seyn pflegt. Blutentziehungen, namentlich örtliche, machen dann, während der Anfälle, nebst ableitenden Mitteln, sich nothwendig, zu welchen letztern die kühlenden Fomentationen des leidenden Theils (z. B. des Kopfes), verbunden mit Fußbädern, Beförderung der Hautausdünstung durch trockne warme Friktionen, Cataplasmata; ferner innerlich blande Abführun-

gen, verdünnte vegetabilische oder mineralische Säuren, Emulsionen, der Cremor tartari, das Nitrum u. s. w.

§. 323.

4) Rücksichtlich der gestörten Verdauungsfunktion ist hier wieder nur von den einzelnen belästigenden Symptomen der Anfälle die Rede, welche oft besondere Maaßregeln zu ihrer Beseitigung fordern; hierhin gehören wieder Kolikanfälle, Magenkrampf, Blähungsbeschwerden, Obstruktionen, Diarrhöen, Erbrechen u. s. w. — In allen diesen ist aber vorzüglich auf drei Punkte Rücksicht zu nehmen: erstens auf Entleerung des Darmkanals von schädlichen Stoffen, wo nun die Umstände anzeigen müssen, ob die Entleerung durch Brechmittel (deren Wirkung auf das gesammte Nervensystem hierbey zugleich in Anschlag zu bringen ist), oder durch Abführmittel, oder durch Lavements, deren äußerst wohlthätige, krampflösende Wirkung in diesen Krankheiten zur Genüge bekannt ist, geschehen müsse. Zweitens auf Verhütung der Wiedererzeugung solcher Stoffe theils durch Erhöhung des Tonus in der peristaltischen Thätigkeit, theils durch Verbesserung der Sekretionen des Darmkanals, wohin denn die bittern, absorbirenden und Digestivmittel: Mentha crispa und piperita, die römischen Chamillen, Extract. Taraxaci, Saponariae, Centaurii minoris, Cascarillae, die Kämpf'schen Visceralklystiere, mehrere Mittelsalze, die Magnesia, äußerlich Waschen der Magengegend mit Mischungen aus Spirit. serpilli, Spirit. Sal. ammon. caust. und einigen Tropfen vom Oleo Menth. p., Tragen aromatischer Pflaster, Krämtergürtel u. s. w. gehören. Drittens auf Berücksichtigung der verstimmten Nerven- und Gefäßthätigkeit der Unterleibseingeweide, in welcher Hinsicht, jedoch erst nach gehöriger Erfüllung der ersten Indikation, vorzüglich von den krampfwidrigen und ableitenden Mitteln Gebrauch gemacht werden kann, wohin wir theils die Valeriana und Flor. Chamomill. in Aufgüssen, den Liq. C. C., das Opium, die milden Oehle, die schleimigen Mittel, Emulsionen, die Lavements aus Valeriana-Aufgüssen, die Einreibungen einer Opiatsalbe oder des Kamillenöhls in den Unterleib, die warmen Fomentationen und

Cataplasmata mit antispasmodischen Mitteln vermischt, und bey Congestionen, vorzüglich in Folge der Hämorrhoidaldisposition, oder gehemmter Menstruation, Anlegung von Blutigeln an das Perinäum, Friktionen und warme Bedeckungen der Unterschenkel rechnen.

§. 324.

5) Die Symptome gestörter Athmung und Absonderung sind im Ganzen abermals vorzüglich die Folgen von Unordnungen im Gefäß- oder Nerven- und Muskularsystem, und hiernach zu behandeln; nur fordern einige derselben verschiedene Modifikationen dieser Behandlung, so Krampfhusten oder asthmatische Anfälle als Folgen abnormer Contraction in den Fasern der Lungenzellen und Bronchien oder in den größern den Respirationsbewegungen dienenden Muskeln fordern warme Fomentationen der Brust, schleimiges demulcirendes Getränk, Inhalationen durch die von Madge erfundenen Einathmungsmaschine *), die Anwendung von Extract. Hyoscyam., Lactucae viros., ableitender Reizmittel, reitzender Einreibungen der Vesikatorien u. s. w. — Werden hingegen diese Zustände, was häufig der Fall ist, mehr vom Gefäßsystem bedingt, von Congestionen nach der Brust, wohl gar von Abnormitäten des Herzens, dann sind allgemeine und örtliche Blutentziehungen, leichte Abführungen, Fußbäder und der übrige für diese Fälle geeignete Heilapparat in Anwendung zu ziehen. — Auf ähnliche Weise sind auch die öftern Anfälle von Ohnmachten zu behandeln, wobey wir nur noch erwähnen, daß diese Anfälle, vorzüglich wenn sie auf heftige Stürme von Krämpfen u. s. w. folgen, nie zu plötzlich durch Anwendung der gewöhnlichen Erweckungsmittel, starker Gerüche, der Friktionen u. s. w. verscheucht werden dürfen, indem, worauf namentlich H. Nasse aufmerksam gemacht hat, ihnen unter diesen Umständen allerdings eine wohlthätige heilende Kraft zugeschrieben werden muß, in ihnen der Organismus recht ei-

*) S. darüber auch H. Osiander's Entwicklungskrankheiten. 2r Thl. S. 142. auch d. Abbildung einer solchen in Thom. Hayes Warnung vor d. Folgen der Katarrhe, übers. v. Michaelis. Lpz. 1787.

gentlich ausruhen, ſich erholen ſoll, daher durch zu zeitige Unterbrechung der Ohnmacht neu aufgeregt und beunruhigt werden muß.

§. 325.

Auf ziemlich gleiche Weiſe ſind denn auch ihren Urſachen nach die verſchiedenen Störungen der Abſonderungen zu behandeln. Hautkrämpfe, trockne brennende Haut, fordern laue Bäder und gelinde Friktionen in oder nach denſelben; bey Blaſenkrämpfen ſind Emulſionen, kleine Doſen Opium, ſchleimige Getränke, Fomentationen, Cataplasmata, allgemeine und Halbbäder, ſo wie Rückſicht auf etwaige Störungen im Pfortaderſyſtem, Hämorrhoidalcongeſtionen, oder wohl gar entzündliche Zuſtände vorzüglich angezeigt. Endlich 6) die Störungen der Geſchlechtsfunktionen betreffend, ſo iſt davon bereits früher (§. 319.), in wiefern die Berückſichtigung derſelben oft einen Haupttheil der allgemeinen Kur ausmacht, gehandelt worden. Einzelne ſchmerzhafte Zuſtände aber, welche in den Anfällen erſcheinen, als Krämpfe im Uterus, krampfhafte Verſchließung des Muttermundes während der Menſtruation u. ſ. w. erfordern ziemlich dieſelbe Heilmethode, wie die vorher erwähnten Blaſenkrämpfe, nur daß man hier noch die mehr direkt auf den Uterus wirkenden Injektionen aus Kamillen, Valeriana, Bilſenkraut oder Schierlingsaufguß, Abkochung der Mohnköpfe in Milch u. ſ. w. oft mit Nutzen zu Hülfe nehmen kann. — Daß übrigens auch bey allen dieſen örtlichen ſchmerzhaften Symptomen der Hyſterie die Einwirkung des animalen Magnetismus oft von großem Nutzen befunden iſt, kann nur der Befangene läugnen, und daß daher auch in dieſer Hinſicht von einem Mittel, welches zu weilen die Stürme, welche keinem andern weichen, doch noch beruhigt, unter hinlänglicher Berückſichtigung der weſentlichen Krankheitsurſachen, Anwendung gemacht zu werden verdiene, liegt am Tage.

II. Krankheitszustände der einzelnen weiblichen Geschlechtsorgane.

§. 326.

Wir dürfen es als ein Gesetz für die Lebenserscheinung menschlicher Organisation betrachten, daß je vollkommner eine gewisse Seite derselben der vegetativen Sphäre angehört, sie um so mehr der Einwirkung äußerer Natur, folglich auch den schädlichen Einflüßen der Außenwelt unterworfen, um so mehr zu Krankheiten geneigt sey; und zwar dieses in demselben Grade als die Thätigkeit, die Wichtigkeit dieses Organs gesteigert ist. Daher z. B. die so vielfachen und so häufigen Krankheiten der Verdauungswerkzeuge, welche mehr als alle andere Systeme denselben ausgesetzt sind, daher aber auch im weiblichen Geschlechte, wo die Geschlechtsfunktion, wie schon früher bemerkt wurde, allerdings tiefer in das gesammte Leben eingreift als im männlichen, das öftere Vorkommen der Krankheiten der Geschlechtsorgane, unter welchen Organen sodann wieder keines häufiger und auf so verschiedenartige Weise afficirt wird als der Uterus, eben weil er, wenn auch nicht die Wurzel (denn diese liegt in den Ovarien), doch den eigentlichen Heerd geschlechtlicher Produktivität enthält. — Unter den Abnormitäten nun, welche der Uterus und zum Theil auch die übrigen Geschlechtsorgane darbieten, hat man, in sofern der nicht schwangere Zustand berücksichtigt wird, vorzüglich zweierley Klassen, nämlich Abnormitäten ihres Bildungslebens und Abnormitäten ihres räumlichen Verhältnisses zu andern Organen, d. i. ihrer Lage zu unterscheiden. — Zu den erstern gehören theils die Erscheinungen abnorm aufgeregter Gefäßthätigkeit, als Entzündungen, Blutungen, abnorme Sekretionen, und die Folgen der abnorm aufgeregten Gefäßthätigkeit: Eiterungen, Geschwülste, Auswüchse, Wasseranhäufungen, Verhärtungen, Krebsgeschwüre; zu den letztern gehören die Senkungen (namentlich in Bruchgeschwülste), und die vorzüglich auf den Uterus, zum Theil auch auf die Vagina sich beschränkenden Vorfälle, Vor-

wärts- und Rückwärtsbeugungen, Schieflagen und Umstülpungen.

I.

Krankheiten der Gebärmutter.

A. Störungen des Bildungslebens.

1.

Entzündung der nicht schwangern Gebärmutter (Metritis).

§. 327.

Wenn überhaupt im vorigen Paragraph gesagt wurde, daß die Häufigkeit der Krankheiten vorzüglich mit abhänge von dem Grade der Thätigkeit und Wichtigkeit eines Organs, so gilt dieß insbesondre von der Entzündung, und was daher den Uterus betrifft, so finden wir ihn auch stets, um je angeregter seine Thätigkeit ist, um so mehr zur Entzündung geneigt. Fast nie entzündet sich daher der Uterus im jungfräulichen Körper vor dem Eintritte der Catamenien, außer etwa sekundär ergriffen von der Entzündung benachbarter Gebilde, oder unmittelbar durch mechanische Verletzung gereizt *). Etwas leichter schon kann diese Krankheit sich ausbilden nach völlig entwickelter Pubertät, jedoch auch hier am leichtesten zu der Zeit, wo, mit Ausnahme der Schwangerschaft, das Gefäßleben dieses Organs am höchsten gesteigert ist, d. i. zur Zeit der Menstruation selbst. — Es ist aber die Metritis nicht blos an sich, sondern vorzüglich auch wegen der vielfachen an sie sich anschließenden andern Bildungskrankheiten eine der wichtigsten Krankheitserscheinungen, welche das weibliche Leben außerhalb des Cyklus von Schwangerschaft, Ge-

*) P. Frank sagt (Epitom. d. curand. hom. morbis (Lib. II. p. 217.): Hoc ipsum viscus in virginibus necdum menstruatis rarissime, neque conspecto unquam a nobis exemplo, inflammatur.

burt und Wochenbett darbietet, und es wird deßhalb nöthig, ihre Geschichte mit besonderer Genauigkeit zu verfolgen.

§. 328.

Entzündung überhaupt aber, dieß dürfen wir wohl als das Resultat sowohl der gesunden Naturanschauung dieser Krankheit, als der vielfachen Untersuchungen darüber betrachten, ist ihrem Wesen nach: örtlich abnorm hervorgehobenes Gefäß- oder Bildungsleben; allein weniger beachtet scheint es, daß man den Satz nicht umkehren darf, und daß es zu einem falschen Begriffe führen muß, wenn man sagt: jedes abnorm hervortretende Bildungsleben sey Entzündung, indem offenbar eine Menge krankhafter Auswüchse (z. B. Polypen, Fettgeschwülste), Verwachsungen u. s. w. unter Erscheinungen entstehen, welche auch nicht eines der charakteristischen Zeichen der Entzündung (Röthe, turgescirende Anschwellung, vermehrte Wärme und Schmerz) darbieten, und daher nur in Folge gefaßter Vorurtheile zur Entzündung gerechnet werden können. Demohnerachtet ist nicht zu verkennen, wie schwer es sey, die Gränze zwischen dieser falschen Bildungsthätigkeit (Degeneratio) und wahrer Entzündung zu bestimmen, ja man darf überzeugt seyn, daß in der Natur eine wahre Gränze zwischen beiden gar nicht existire, daß sie vielmehr unmerklich in einander übergehen und sogar gleichzeitig an einer Stelle vorkommen können, denn wie oft sehen wir nicht krankhafte Geschwülste sich entzünden. — Will man indeß eine schärfere Bezeichnung der Entzündung, so kann es wohl nur die folgende seyn, welche sagt: Entzündung sey örtlich abnorm hervortretendes Bildungsleben, in der Erscheinung bestimmt durch Röthe, erhöhte Wärme, turgescirende Anschwellung und vermehrte Empfindlichkeit, im Wesen begründet durch Beschränkung auf den bestehenden Begriff des Organs, bey welcher wahrhafte Metamorphosen dieses Organs nur als Folge sich anschließen können, dahingegen bey der falschgerichteten Bildungsthätigkeit die Metamorphose selbst die Hauptsache ist.

§. 329.

Durch dieſe Anſicht ſcheint zugleich die acute Natur, die Intenſität der wahren Entzündung verſtändlich zu werden, indem es deutlich iſt, daß gerade dieſes Beſchränken, dieſes Concentriren, welches der Entzündung natürlich iſt, die Heftigkeit der Zufälle und die ſo leicht daran ſich anknüpfende Erſcheinung wahrer innerer Zerſtörung, entweder durch organiſche Zurückbildung in einen körperlichen flüßigen Urſtoff (Eiterung), oder durch unorganiſche fäulnißartige Auflöſung (Brand) bedingen muß, weßhalb wir auch Zertheilung, Eiterung und Brand als die drei eigentlich der Natur der Entzündung allein rein angehörenden Ausgänge betrachten, Ausſchwitzungen aber, ſie mögen nun von plaſtiſcher Lymphe gebildet, die Verhärtung oder den Skirrhus, oder äußere Verwachſungen, oder als ſeröſe Flüßigkeit die Waſſeranhäufung bedingen, ſchon als weniger rein der Entzündung angehörig, und mehr als Uebergänge zu bloßer falſchgerichteter Bildungsthätigkeit ſich darſtellend anſehen können. Es ergiebt ſich ferner, daß die ſogenannte chroniſche Entzündung das eigentliche Mittelglied zwiſchen acuter Entzündung und abnormer Produktivität ſey, und wenn es oft ſchon ſchwer oder unmöglich iſt, in der Natur den Gränzpunkt, wo acute Entzündung aufhört und chroniſche Entzündung beginnt, anzugeben, ſo wird denn endlich ein ſolcher feſter Punkt zwiſchen chroniſcher Entzündung und reiner Degeneration um ſo mehr vermißt werden, je gewöhnlicher das Eine anfängt, wenn das Andere noch nicht aufgehört hat.

So weit denn alſo das Glaubensbekenntniß des Verfaſſers über die Entzündung im Allgemeinen, worauf im Folgenden öfters wird verwieſen werden müſſen, und welches hier gleich bey der zuerſt abgehandelten Entzündungskrankheit niedergelegt iſt, damit dem Leſer die Entſcheidung, ob er dieſe Anſicht zur Seinigen machen könne, oder ob nicht, und ob er dem zu Folge Modifikationen auch der weitern Darſtellungen ſich zu machen nöthig habe, erleichtert werde.

§. 330.

Die Entzündung der nicht schwangern Gebärmutter aber, eine Krankheit, deren besondere Kennzeichen weiter unten aufgeführt werden sollen, hat man auf verschiedene Weise eingetheilt, einmal Rücksicht nehmend auf die verschiedenen Gebilde am Uterus, in die rosenartige (Metritis erysipelatosa), welche durch Ergriffenseyn des Bauchfells, in wiefern es den Uterus überzieht, charakterisirt wird (denn eine besondere rosenartige Entzündung auch der innern Gebärmutterfläche anzunehmen, ist man wohl überhaupt schwerlich, und außer der Schwangerschaft und Wochenperiode gar nicht anzunehmen berechtigt), und in die phlegmonöse (Metritis phlegmonosa), wo das gesammte Parenchyma der Uterinwände leidet. Ein andermal nimmt man Rücksicht auf die Gegend der Gebärmutter, welche von Entzündung befallen ist, und unterscheidet sonach Entzündung des Gebärmuttergrundes, des Mutterhalses, der Vorder- und Hinterfläche, oder der rechten oder linken Seitenfläche des Gebärmutterkörpers. Diese letzteren Unterscheidungen, welche überhaupt im nicht schwangern Uterus mit geringer Deutlichkeit erscheinen, sind weit weniger wesentlich, und werden daher von Mehreren*) gänzlich übergangen.

§. 331.

Ferner unterscheidet man, und zwar mit mehr Recht, die ursprüngliche Entzündung des Uterus (Metritis idiopathica s. primaria) und die übertragene oder nachfolgende (Metritis secundaria s. symptomatica) welche letztere vorzüglich an Krankheiten benachbarter Gebilde, an Entzündung des Darmkanals, der Harnblase, der übrigen Strecken des Bauchfells, der Mutterscheide u. s. w. sich eben so anschließt, wie denn andrer Seits auch die Gebärmutter-

*) So bey C. Wenzel von den Krankheiten des Uterus. Fol. 1816. S. 23.

entzündung auf jene Gebilde sich fortpflanzen kann. Endlich glauben wir auch unterscheiden zu müssen zwischen der acuten und chronischen Entzündung der Gebärmutter, unter denen die letztere besonders in einem Organ, welches so sehr zu Degenerationen seiner Substanz und Form geneigt ist, von großer Wichtigkeit erscheint und eine ausführlichere Berücksichtigung, als sie bisher in den Schriften über Frauenkrankheiten gefunden hat, verdient.

§. 332.

Die Symptome, welche als Kennzeichen theils die Metritis überhaupt, theils ihre einzelnen Gattungen begleiten, sind nun folgende: — Zuvörderst die acute Form betreffend, so tritt sie mit nach Grad und Ausbreitung der Entzündung bald mehr bald minder heftigem Fieber ein, welches durch Frost und nachfolgende Hitze, einen nach der Constitution der Kranken zwar verschiedenartigen, im Allgemeinen jedoch frequenten und gespannten Puls, heftigen Durst, verstimmtes Gemeingefühl u. s. w. charakterisirt wird. Ihre besondern Zufälle sind drückender stechender Schmerz im afficirten Organ, dessen Sitz gewöhnlich auf einen kleinen, nach dem Herde der Entzündung verschiedenen Ort beschränkt ist, und durch einen äußerlichen Druck über der Schambeinverbindung sowohl, als durch die innerliche Untersuchung auf das Aeußerste gesteigert wird. Ferner werden mehrere andere Organe in ihrer Function gestört und sonst schmerzhaft afficirt; so, wenn vorzüglich mehr die Rückwand des Uterus entzündet ist, werden die Schmerzen vorzüglich auf die Kreuz- und Lendengegend sich erstrecken, der Mastdarm leidet, es treten Stuhlverhaltungen, schmerzhafte Ausleerungen, und im Verfolg der Krankheit leicht heftige, zuweilen eiterartige Durchfälle ein. Ist dagegen mehr die vordere Gebärmutterfläche ergriffen, so wird dies theils durch den veränderten Sitz des Schmerzes, theils durch das Leiden der Harnblase (schmerzhaftes Uriniren, Urinverhaltung, späterhin eiterartige Sedimente im Urin und unwillkürlichen Ausfluß desselben) bezeichnet. Die Entzündung des Gebärmuttergrundes und

vorzüglich des hier ihn begleitenden Bauchfelles kommt mit den Zufällen der Peritonitis überhaupt sehr überein, und giebt sich durch stärkere Auftreibung des Unterleibes zu erkennen. Halbseitige Entzündung wirkt vorzüglich auf die seitlichen Beckenmuskeln und dadurch auf die Bewegung des Schenkels; Entzündung der Vaginalportion endlich ist besonders mit großer Empfindlichkeit beim Untersuchen, erhöhter Temperatur und Geschwulst des Muttermundes und gleichzeitigem Leiden des Scheidenkanals, wenigstens in seinem obern Theile (Trockenheit, brennender Schmerz, späterhin gern Abfluß von eiterartigem, oft mißfarbigem Schleim aus demselben) bezeichnet.

§. 333.

Die chronische Entzündung der Gebärmutter betreffend, so kann sie entweder an die acute, bey unvollkommen erfolgter Zertheilung, sich anschließen, und zwar wird sie vorzüglich bemerkt, wenn eine Metritis bey Wöchnerinnen in Folge heftiger Reizung oder wohl selbst Verletzung des Muttermundes unter der Geburt entstanden war, ohne sich rechts vollständig zu zertheilen, oder sie entwickelt sich in Folge specifischer, den Uterus in Anspruch nehmender Einwirkungen auch selbstständig. Ihre Zufälle aber sind weit weniger hervorstechend, als die der acuten Metritis, und sie wird daher öfters übersehen (z. B. als bloße Menstrualkolik betrachtet) oder mit andern Krankheiten verwechselt, welches doch um so übler ist, als gerade an diese Form sich vorzüglich die Degenerationen der Uterinsubstanz anzuknüpfen pflegen. Kranke dieser Art sind es vorzüglich, bey welchen die Menstruation fortwährend mit Schmerzen, allgemeinem Mißbehagen, Fieberbewegungen, gestörter Verdauung und Darmausleerung eintritt, indem durch die periodische Congestion gegen die Uteringefäße die chronische Entzündung dann oft der acuten näher gerückt wird; auch außer der Zeit der monatlichen Perioden bleibt indeß oft ein Gefühl von Schwere im Becken, unvollkommne Stuhlausleerung, oder beschwertes Urinlassen, bey Frauen schmerzhaftes Gefühl beym Coitus, große Empfindlichkeit bey der innern Untersuchung, so wie Aeußerung von Schmerz

bey tiefem Eingreifen der Hand über den Schambogen, Neigung zu Kreuzschmerzen, vermehrte oder zu sehr verminderte Schleimabsonderung aus der Vagina, gespannter Puls, öftere leichte Fieberbewegungen und belegte Zunge zurück, so wie denn die monatlichen Perioden leicht selbst in ihrer Ordnung gestört werden. — Zufälle, welche dann oft noch mit allgemeinen hysterischen Leiden sich verbinden oder gleichsam dadurch maskirt werden.

§. 334.

Verlauf und Ausgänge der Krankheit. Befällt die acute Gebärmutterentzündung junge kräftige Individuen, wird sie nicht durch allzugewaltsam einwirkende Ursachen bedingt und richtig geleitet, so bemerkt man zwar, daß Schmerz und Fieber oft bis gegen den siebenten oder neunten Tag anhalten, ja gesteigert werden, und dabey zugleich die Störungen des Gemeingefühls, Beängstigung, Uebelkeiten, Erbrechen, Durchfall, Angegriffenseyn des Kopfs, also Schwindel, Ohrenbrausen, Delirien u. s. w. zunehmen; allein am Ende dieser Periode, und zwar gewöhnlich nach reichlich ausbrechenden Schweißen, reichlichem Harnabgange, vermehrtem Abgange aus den Geburtstheilen, vorzüglich aber mit dem Wiedereintritt der vielleicht gehemmt gewesenen Menstruation, läßt der Schmerz nach, die Zeichen des Fiebers mäßigen sich, ruhiger Schlaf, reinere Zunge u. s. w. erfolgt, die Zertheilung der Entzündung und die Reconvalescenz hebt an. — Je robuster übrigens der Körper, um so heftiger und acuter pflegt dieser Krankheitsverlauf zu seyn, je schwächlicher und reizbarer, um so anhaltender, wobey zugleich der Uebergang in die chronische Entzündung sehr leicht erfolgt, indem bey weniger bemerklichen kritischen Erscheinungen zwar das Fieber allmählig abnimmt und der Schmerz nachläßt, allein dagegen die §. 333. erörterten Symptome eintreten.

§. 335.

Der Ausgang der Metritis in Eiterung wird wohl überhaupt nur sehr selten bemerkt, denn selbst in der Metritis der Wöchnerinnen gehören Eiteransammlungen in dem Gewebe

des Uterus zu den seltensten Erscheinungen, wie von H. Wenzel*) gewiß mit Recht behauptet wird, und wir können daher nur annehmen, daß, wo auch im nicht schwangern Körper diese Wendung der Krankheit vorkäme, sie auf gleiche Weise, wie andere innern Eiterungen, durch neu ansetzendes Fieber mit Frost, pulsirendem Schmerz, Spuren von Eiterabsetzung im Urin, Abendfieber u. s. w. bezeichnet werden dürfte. Der Ausgang in Brand hingegen, obgleich bey nicht Schwangern (schon wegen der Seltenheit der Metritis überhaupt) ebenfalls nur in wenigen Fällen beobachtet, kommt doch hier, so wie auch bey Wöchnerinnen, häufiger als die Eiterung vor. Er wird bedingt durch eine schlechte Constitution, ungünstige äußere Verhältnisse, epidemisch herrschende bösartige Fieber, und vorzüglich durch versäumtes, kräftig einwirkendes antiphlogistisches Verfahren in den ersten Stadien der Krankheit. Es giebt sich dieser Ausgang vorzüglich durch den veränderten Charakter des Fiebers zu erkennen, welches aus einer Synocha oder einem Synochus in den Charakter des Typhus übergeht und durch äußerst frequenten, oft intermittirenden Puls, klebrige profuse Schweiße, unwillkürliche Ausleerungen, trockne braune Zunge, Meteorismus, Sehnenhüpfen, Schluchzen und Kälte der Extremitäten sich erkennen läßt und gewöhnlich bald das Ende herbeyführt.

§. 336.

Dagegen kann dann auch die Entzündung ohne organische Zerstörung durch Ausscheidungen sich endigen, wodurch denn vorzüglich der Uebergang in andere Krankheiten und namentlich in Degenerationen bewirkt wird. Es gehört hierher die Ausschwitzung plastischer Lymphe in die Zellen der Uterinsubstanz und daran sich knüpfende gutartige oder skirrhöse Verhärtung, oder die Ausschwitzung ähnlicher Stoffe auf der Oberfläche, und die dadurch bewirkte Verwachsung des Uterus mit benachbarten Theilen, oder endlich die Ergießung seröser Flüssigkeit entweder in der Gebärmutterhöhle oder in

*) a. a. O. S. 52.

den Wänden derselben, welches zur Wassersucht der Gebärmutter führt. In allen diesen Fällen erfolgt die Zertheilung unvollkommen, der heftigere Schmerz, das Fieber und die sonstigen, dasselbe begleitenden Symptome mindern sich zwar, aber es treten an deren Stelle die Zeichen dieser Folgekrankheiten ein, von welchen die Geschichte der Wassersucht, der Verhärtung und des Skirrhus später ausführlicher betrachtet werden müssen, so daß wir hier nur über die Verwachsung bemerken, wie sie sich vorzüglich durch Störung der Funktion derjenigen Organe, mit welchen sie Statt gefunden hat, zu erkennen giebt. Haben sich daher bedeutende Verwachsungen mit den Windungen des Darmkanals oder dem Netze gebildet, so bleiben gewöhnlich Unordnungen in den Stuhlentleerungen, vorzüglich Obstruktionen, Neigung zu Congestionen u. s. w. im Pfortadersystem zurück; sind Verwachsungen zwischen Gebärmutterkörper und Grund und den gleichnamigen Theilen der Blase zugegen, so giebt sich dies durch beschwertes Urinlassen, Blasenkrämpfe, Ischurie u. s. w. zu erkennen. Endlich wirken aber diese Verwachsungen auch auf die Gebärmutter zurück, werden die Veranlassungen zu schiefen Lagen derselben, und bedingen endlich insbesondere, wie alle übrigen Degenerationen, solche Veränderungen der innern Strukturverhältnisse derselben, welche ihren weitern Thätigkeiten auf vielfache Weise hemmend werden müssen, wohin denn Störungen der Menstruation, Unfruchtbarkeit oder Disposition zu den heftigsten, zu lebensgefährlichen Beschwerden bey angehender Schwangerschaft gerechnet werden müssen.

§. 337.

Wir kommen nun zu den Ursachen der Gebärmutterentzündung, wohin wir jedoch hier bloß die disponirenden und Gelegenheitsursachen zählen, indem die Ansicht des Verfassers vom Wesen, oder wenn man will, von der nächsten Ursache der Entzündung überhaupt und folglich auch der Gebärmutterentzündung, schon oben (§. 328. 329.) ausgesprochen worden ist. — Zu den disponirenden Veranlassungen also muß zunächst die allgemeine, vollsaftige, robuste, zu Ent-

zündungskrankheiten im Allgemeinen neigende Constitution gezählt werden, welche namentlich die Entstehung der acuten Metritis begünstigt; ferner die reizbare schwächliche Constitution, welche insbesondre zur chronischen Form dieser Krankheit geneigt macht, außerdem die epidemische, der Entstehung von Entzündungskrankheiten günstige allgemeine Krankheits-Constitution und die Jahreszeit; endlich aber ganz vorzüglich die Zeit der herannahenden oder wirklich eingetretenen Menstruation, als der Zeitpunkt größter Gefäßthätigkeit in der nicht schwangern Gebärmutter, außerhalb welchem demnach auch, wie schon oben im Eingange bemerkt worden, diese Krankheit fast gar nicht beobachtet wird. Ob übrigens Jungfrauen oder Frauen, welche bereits geboren haben, häufiger an der Metritis leiden und größere Disposition dazu verrathen, ist wohl so leicht nicht zu bestimmen, demohnerachtet glauben wir annehmen zu dürfen, daß allerdings theils des jugendlichen Alters im Allgemeinen, theils der größeren Derbheit und Elasticität des Uterus im jungfräulichen Körper wegen, zur acuten Gebärmutterentzündung bey erstern die Neigung größer sey, wenn dagegen in dem schlaffern Uterus bey Frauen, welche bereits geboren, und vorzüglich oft durch vorausgegangene Geburten selbst bedingt, eine größere Neigung zur chronischen Entzündung und daran sich schließende Degeneration nicht geläugnet werden kann.

§. 338.

Die Gelegenheitsursachen betreffend, so muß zu diesen alles, was psychisch oder physisch das Geschlechtssystem heftig erregt, oder was den Uterus selbst mechanisch heftig reizt, gezählt werden. Also unglückliche Liebe in sinnlichen Individuen, auch andere heftige Gemüthsbewegungen, besonders während der Menstruation, Nymphomanie, unterdrückte Menstruation, erhitzende Arzneymittel, vorzüglich zur Unzeit angewendete Emmenagoga (z. B. bey der wegen überwiegender arteriellen Thätigkeit Statt findenden Verzögerung der Menstruation), drastische Abführmittel, Uebermaß geistiger Getränke oder stark gewürzter Speisen, Erhitzungen (z. B. durch

Tanz) und nachfolgende Erkältungen (besonders kalte Bäder, Injektionen oder Waschungen während der Menstruation), plötzlich gehemmte Blutflüsse oder Schleimflüsse der Geburtstheile, oder Hautausschläge; ferner: Druck des Uterus bey falschen Lagen, durch fremde Körper, z. B. Pessarien, Polypen, Reizung des Uterus durch unpassende Injektionen, zu häufigen, mit Rohheit vollzogenen Coitus, durch Onanie, endlich anderweitige Krankheiten, Syphilis, Metastasen, Entzündung benachbarter Organe, Geschwüre der Mutterscheide u. s. w.

§. 339.

Die Prognose der Gebärmutterentzündung ist zwar nach der Individualität der Körper, nach ihren verschiedenen Ursachen u. s. w. sehr verschieden, im Ganzen muß jedoch diese Krankheit, gleich andern innern Entzündungen, theils wegen der Wichtigkeit des Organs, theils wegen der Heftigkeit des damit sich verbindenden Fiebers stets zu den gefahrvollen gezählt werden, obwohl nicht zu läugnen ist, daß durch ein zu rechter Zeit eintretendes kräftiges antiphlogistisches Heilverfahren sehr wohl ein günstiger Ausgang, und zwar in der Mehrzahl der Fälle, herbeygeführt werden kann. Am ungünstigsten wird die Prognose bey der phlegmonösen Entzündung, namentlich unter innern und äußern Verhältnissen, welche zum typhösen Fieber und Brande führen können. Was das Alter betrifft, so erscheint zwar gewöhnlich bey jüngern Personen die Entzündung mit mehr Heftigkeit, entscheidet sich aber auch in der Regel vollkommner und geht weniger leicht in Nachkrankheiten über, als bey ältern. Vorzüglich aber wird der Arzt bey der acuten Metritis Ursache haben, die Prognose nach dem Zeitpunkte, in welchem die Krankheit, als er gerufen wurde, sich befand, zu bestimmen, indem hiervon außerordentlich viel abhängt. — Endlich die chronische Entzündung betreffend, so wird hierbey auf die Dauer der Krankheit, auf den Grad derselben, vorzüglich aber auf die etwa schon eingetretenen oder noch nicht vorhandenen Degenerationen, Verhärtungen, Verwachsungen,

Wassererglessungen u. s. w. Rücksicht genommen werden müssen, um den wahrscheinlichen fernern Gang der Krankheit, so wie die Heilbarkeit zu beurtheilen.

§. 340.

Die Behandlung der Metritis muß gleichfalls nach Ursachen, Grad und Charakter der Krankheit verschieden seyn. Zuvörderst aber gedenken wir des alten bewährten Ausspruchs: principiis obsta! und betrachten daher das Verfahren, welches sogleich im Beginn der Krankheit angewendet zu werden verdient, um den Keim derselben vor seiner weitern Verbreitung zu ersticken. — Entsteht aber nach Unterdrückung der Menstruation, nach Erkältung zur Zeit der herannahenden Menstruation oder ähnlichen Einwirkungen, und zwar vorzüglich bey sehr reizbaren Naturen, Schmerz im Uterus, Abspannung, vermehrter Durst und erhöhte Temperatur, so wähne man sogleich vollkommenste Ruhe an, sehe auf Entleerung der Harnblase und des Darmkanals, in welcher letztern Hinsicht einige erweichende Lavements sehr zweckmäßig sind, lasse ein laues Bad nehmen, warme Fomentationen über die regio hypogastrica und die Geburtstheile legen, oder auch ein Dampfbad bereiten; Injektionen in die Vagina sind bey jungfräulichen Individuen unpassend, machen Schmerz und heben durch ihren mechanischen Reiz den Nutzen auf, den sie in dynamischer Hinsicht gewähren könnten; bey Frauen, welche geboren haben, können sie hingegen unter diesen Verhältnissen ebenfalls mit Nutzen gebraucht werden, und werden dann aus dem Aufgusse der Hb. Hyoscyami, Cicutae, Flor. Chamomill., aus warmer Milch mit einigen Tropfen Laudanum liq. Sl und ähnlichen Mitteln bereitet. Innerlich läßt man, außer streng antiphlogistischer Diät, eine Mohnsamen-Emulsion, einen Tamarindenaufguß mit etwas Nitrum und ähnliche, den Eretismus des Gefäßsystems herabstimmende Mittel nehmen, sucht, namentlich wo Erkältungen vorausgegangen sind, die Hautthätigkeit zu befördern durch Anwendung des Fliederaufgusses, des Liq. Mindereri, des Liq. C.C., und trachtet endlich durch Be-

folgung der oben für Behandlung der unterdrückten Menstruation aufgestellten Regeln, diese Funktion wieder hervorzurufen.

§. 341.

In gar manchen Fällen nun wird allerdings, wo die Krankheit noch im Stadio irritationis verweilte, die gedachte Behandlung hinreichen, den Eintritt eines eigentlichen Stadii inflammationis gänzlich abzuwenden; ist jedoch beym Erscheinen des Arztes dieser erste Zeitraum bereits vorüber, oder die Krankheit mit solcher Heftigkeit eingetreten, daß ein solches vorbereitendes Stadium überhaupt nicht füglich unterschieden werden konnte, so muß dann sogleich eine stärker eingreifende Behandlung dem Weitergreifen des Uebels Schranken setzen. Allgemeine Blutentziehungen namentlich sind dann, vorzüglich bey jungen vollsaftigen Individuen, nicht zu entbehren; bey schwächlichen Körpern, bey geringerm Grade des Uebels, oder wenn, nachdem durch allgemeine Blutentleerung zwar der erste Anfall der Entzündung gemäßigt ist, nun bey Wiedererzeugung der Blutmasse auch der Schmerz wieder an Heftigkeit zunimmt, sind dann örtliche Blutentziehungen nöthig, welche mittelst Anlegung von 6 — 8 — 10 Blutigeln an die schmerzende Stelle am schicklichsten bewirkt werden, ja bey nochmaliger Wiederkehr und noch nicht hinlänglich beseitigten Schmerzen wohl abermals wiederholt werden müssen, wogegen Rücksicht auf anscheinende Entkräftung ja nicht zu hoch angeschlagen werden darf, indem das Gefühl von Schwäche Folge ist des Fiebers, das Fieber aber Folge der Entzündung, und gegen die Entzündung als abnorm gesteigerte Thätigkeit des Gefäßsystems die Herabstimmung dieses Systems durch Blutentziehung das wirksamste Mittel bleibt.

§. 342.

Die innern Mittel betreffend, so sind hier vorzüglich diejenigen angezeigt, welche theils als der produktiven organischen Kraft überhaupt entgegen wirkend erscheinen, theils

durch vermehrte Sekretionen des Darmkanals die Erregung anderer Organe vermindern, theils überhaupt beruhigend auf das Gefäßsystem wirken. Zu den erstern rechnen wir vorzüglich das Queckſilber, welches, gleich andern mineraliſchen Giften, vorzüglich der Reproduktion unmittelbar entgegengeſetzt iſt (eben dadurch in größern Gaben und in gewiſſen Verbindungen als eins der zerſtörendſten Gifte ſich darſtellt), daher als Beſchränkungsmittel abnorm aufgeregter Thätigkeit in den feinern Verzweigungen des Gefäßſyſtems (ſowohl bey Entzündung als Degeneration, in welcher letztern Hinſicht beſonders an die Wirkung des rothen Queckſilberpräcipitats bey ſchwammigen Auswüchſen erinnert werden kann), einer ſchon von H. Hegewiſch *) aufgeſtellten Anſicht zu Folge, ſo außerordentlich hülfreich ſich erweiſt. Auch in der Gebärmutterentzündung daher, und zwar vorzüglich der Neigung dieſes Organs zu Degenerationen wegen, zeigt das Queckſilber, und insbeſondere das Calomel, ſich von ausgezeichnetem Nutzen; nur muß die Gabe nach der Individualität des Kranken abgemeſſen werden, damit vorzüglich ſtärkere Doſen (2 — 4 Gran) nicht etwa zu ſchnell übermäßige Darmausleerungen hervorbringen, und ſo die weitere Anwendung verhindert wird. Beym Nachlaß der acuten Metritis und vorzüglich bey Symptomen, welche einen Uebergang in die chroniſche verrathen, iſt namentlich auch von den äußerlichen Einreibungen des Unguenti mercurial. in Verbindung mit dem Linimento volat. Gebrauch zu machen.

§. 343.

Was die den übrigen Heilanzeigen (ſ. vorigen §.) entſprechenden Mittel betrifft, ſo ſind von den den Darmkanal insbeſondere in Anſpruch nehmenden vorzüglich das Nitrum und die blanden Abführmittel zu erwähnen; erſteres kann zu 5 — 10 Gran pro dosi mit dem Calomel oder in Emulſionen aufgelöſt gegeben werden. Noch ſtärkere Doſen paſſen nur für die acuteſten Fälle, indem bey andern dadurch theils

*) Hufeland's Journal d. pr. Heilkunde. XXI. Bd. 3. St.

heftige Diarrhöen zu schnell erregt werden, theils selbst der Consensus zwischen Darm und Uterus diese heftigern Reizungen verbietet. Von den Abführungsmitteln müssen aber wegen letzterer Rücksicht nur die weniger reizenden, als Manna, Oleum Ricini, Pulpa Tamarindorum, Pulpa Cassiae, auch wohl bey größerer Unempfindlichkeit die Senna, ferner die leichtern Mittelsalze, als Tartarus tartarisatus u. s. w. in Anwendung gezogen werden. In der Regel pflegt es für die Milderung des Fiebers am zweckmäßigsten zu seyn, wenn täglich drei bis sechs mehr flüssige Ausleerungen erfolgen, welche zum Theil auch durch gegebene Lavements zu bewerkstelligen sind.

§. 344.

Allgemein beruhigende Mittel sind theils mittelbar schon die in den beiden vorigen §§. genannten im hohen Grade, theils können hierher noch einige besondere Mittel gerechnet werden, unter welchen dann das diätetische Verhalten mit Recht obenan gestellt wird. Man sorgt daher für den Aufenthalt der Kranken in reiner, mäßig erwärmter Luft und nicht zu erhitzender Bedeckung, erlaubt bloß schwach nährende, kühlende Speisen und Getränke, leichte Suppen, Kalkschalen von Wasser, Zitronensaft, Zucker und Zwieback, Flieder- und Kamillenthee, abgekochtes Wasser mit Himbeersaft, Zitronensaft u. s. w. zum Getränk, läßt zwischen den übrigen Mitteln die schon für das Stadium irritationis empfohlenen Mittel, vorzüglich die Emulsionen, fortgebrauchen, und wendet eben so auch die örtlich beruhigenden Mittel, Fomentationen, Cataplasmata, Dampfbäder und (unter der angegebenen Einschränkung) auch Injektionen noch fortwährend bis zur Linderung des Schmerzens an.

§. 345.

So wie nun unter solchem Verfahren die Zufälle der Krankheit sich mindern, geht man mit demselben gleichfalls zurück, und wenn endlich bey Eintritt des siebenten oder neunten Tages kritische Ausleerungen sich zeigen, treten die

stärker einwirkenden Mittel völlig zurück, und es bleibt nun die Hauptindication, diese Bestrebungen der Natur zu unterstützen. Bey erleichternden Schweißen giebt man deshalb gelind diaphoretische Mittel, z. B. Liquor Mind. mit dem Fliederblumenaufgusse; bey sich wieder zeigender Menstruation befördert man dieselbe durch Dampfbäder, Fußbäder, Melissenthee, Friktionen der Schenkel u. s. w. — stärkere Harnabsonderung unterstützt man durch verdünnende Getränke und läßt die obige antiphlogistische Diät dabey fortführen. — Geschieht indeß die Zertheilung unvollständig, so daß innerlicher Schmerz, Abendfieber, Durst, belegte Zunge zurückbleiben, so kann man dann mit Nutzen auch stärkere ableitende Mittel zu Hülfe nehmen, unter welchen ganz vorzüglich die Sinapismen auf die Waden, bey torpidern Subjekten auf die Regio hypogastrica selbst, empfohlen werden müssen. Vesikatorien und flüchtig reizende Einreibungen sind hier weniger passend, erstere wegen ihrer reizenden Einwirkung auf Nieren und Geschlechtssystem, letztere wegen des damit verbundenen mechanischen Reizes; dagegen ist hier die fortgesetzte Anwendung des Calomels, verbunden mit reizmindernden Mitteln, z. B. kleinen Dosen Opium, Extract. Hyoscyami oder Cicutae, Infusum Valerianae und ähnlichen Mitteln ganz zweckmäßig. Geht (was indeß selten der Fall ist) die Entzündung in Eiterung über, so muß durch erweichende Umschläge, schleimige Injektionen und Dampfbäder die Entleerung des Abscesses durch die Vagina befördert und sodann für Erhaltung gutartigen Eiters und allgemeinere kräftige Reproduktion durch mehr nährende Diät, China u. s. w. gesorgt werden.

§. 346.

Am wenigsten vermag die heilende Kunst, wo bey anfänglicher Vernachlässigung oder ganz irriger erregender Behandlung, oder auch typhöser, epidemisch herrschender Constitution die Entzündung zur Gangrän sich neigt, dem gemäß auch der Fiebercharakter sich ändert und die sogenannten nervösen Symptome bereits eingetreten sind. Es wird dann

vorzüglich die Aufgabe des Arztes, die organische Reaktion zu erhöhen und das Ueberwinden und Schrankensetzen örtlicher Absterbung durch das Lebendige zu befördern. Innerlich ist daher in diesen Fällen von den mineralischen Säuren, dem Elix. Halleri (vielleicht auch namentlich von der Phosphorsäure) in Verbindung mit der Valeriana, Serpentaria, dem Campher, dem Moschus, den Naphten u. s. w. Gebrauch zu machen. Das Calomel, welches hier leicht zu colliquativen Durchfällen Veranlassung giebt, muß gewöhnlich ausgesetzt und für hinlängliche Darmentleerung durch Lavements gesorgt werden. Die Diät erfordert nur in sofern einige Abänderung, als für Kranke dieser Art als Zumischung zu Kalteschalen und zum Getränk, der Wein ein vortreffliches Mittel wird. Aeußerlich sind gleichfalls die mehr erregenden Mittel in Anwendung zu ziehen, als Sinapismen über den Leib, Fomentationen von Aufgüssen der Hb. Menth. crisp., Meliss., Majoran. u. s. w., mit Wein vermischt, über die Geburtstheile, ja selbst bey sehr trockner brennender Haut allgemeine aromatische Bäder.

§. 347.

Was die Behandlung der chronischen Entzündung betrifft, so muß hier vorzüglich auf dem oben (Ende 345. §.) angezeigten Wege fortgegangen werden, und namentlich wenn die Krankheit nur in der Tiefe fortschleicht, nur durch periodisch eintretende Schmerzen, erhöhte Empfindlichkeit und allgemeine Beschwerden sich zu erkennen giebt, vorzüglich durch Abwendung aller Erregungen und fortdauernde Ableitungen gewirkt werden. — Solchen Personen daher, obwohl sie sich zu Zeiten recht wohl befinden, muß doch eine sehr genaue, mehr vegetabilische kühlende Diät, Vermeidung aller erhitzenden Bewegung, vorzüglich Vermeidung aller Reizungen des Geschlechtssystems zur Pflicht gemacht werden; man läßt dabey das Calomel mit dem Extrakt der Cicuta in kleineren Dosen fortnehmen, wendet Einreibungen mit dem Unguent. neapolit. an, läßt vom Infuso Hyoscyami, Cicutae und Valerianae vorsichtig Einspritzungen, oder durch den Weid-

lich'schen Badestuhl innere örtliche Bäder gebrauchen, einen Schwamm, mit solchen Aufgüssen getränkt, in die Geburtstheile legen, vorzüglich aber empfehlen sich dann auch Fontanelle an den Schenkeln, bey stärker erregten Schmerzen Blutigel an das Perinäum und öfters dargereichte blande Abführungen.

§. 348.

In allen Fällen endlich, wo die Metritis als sekundäre Krankheit erscheint, oder von besondern, noch fortwirkenden Gelegenheitsursachen erregt wird, muß hierauf auch die Behandlung noch besondere Rücksicht nehmen. Vorausgegangene Entzündungen benachbarter Organe müssen daher zwar im Allgemeinen gewöhnlich nach ähnlichen Rücksichten, wie die Entzündung der Gebärmutter, jedoch zugleich nach denjenigen Modificationen, welche die Natur des afficirten Organs fordert, behandelt werden, drückende Pessarien, Auswüchse am Muttermunde, Polypen müssen entfernt, fehlerhafte Lagen des Uterus nach unten anzugebenden Regeln beseitigt, und Unterdrückungen der Menstruation, der Leucorrhöe, der Hämorrhoiden gehoben, so wie syphilitische und andere Geschwüre der Geburtstheile geheilt werden. — Bleibt übrigens nach gehobener Metritis (welches vorzüglich bey typhösem oder chronischem Charakter der Fall zu seyn pflegt) allgemeine oder örtliche bedeutende Schwäche zurück, so fordert dies den bey den Regelwidrigkeiten der Menstruation mehr erwähnten roborirenden Heilplan, und was die zuweilen sich anschließenden Folgekrankheiten und Degenerationen betrifft, so wird von deren Behandlung noch später ausführlicher gehandelt werden.

2.

Blutfluß der nicht schwangern Gebärmutter (Haemorrhagia uteri, Metrorrhagia).

§. 349.

Ein Organ, gleich der Gebärmutter, zu dessen normaler Verrichtung so häufige Blutausscheidungen gehören, dessen Reichthum an Gefäßen so groß ist, dessen Gefäße vorzüglich in Venen bestehen, deren Ausdehnbarkeit noch überdies so außerordentlich ist, muß schon dadurch auch die Anlage zu bedeutenden krankhaften Blutergießungen erhalten. Vermehrt wird indeß diese Anlage, je mehr dieses Organ bereits an Aufnahme und Ausscheidung beträchtlicher Blutmassen gewöhnt ist, welches denn im Uterus um so mehr der Fall ist, je häufigere Schwangerschaften und Geburten Statt gehabt haben und je schlaffer dadurch seine Gefäße, ja sein ganzes Parenchyma, geworden sind. — Eben hierin liegt denn auch der Grund davon, daß namentlich zur Zeit der normal aufgeregten Gefäßthätigkeit selbst, also vorzüglich während der Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und Wochenperiode die heftigsten Blutergießungen vorkommen, nächst diesen Perioden aber dann, wenn durch krankhafte Bildung der Uterus vergrößert, aufgelockert und sonst verändert ist. Die Blutergießungen übrigens, welche den erstern Zuständen angehören, bleiben von den gegenwärtigen Betrachtungen natürlich ausgeschlossen.

§. 350.

Die Eintheilung der hier zu betrachtenden Metrorrhagie angehend, so ist diese Krankheit verschieden 1) der Quantität des Blutflusses nach, und zwar vom tropfenweisen Abgange (Stillicidum sanguinis) bis zum Blutsturz (Haemorrhagia), worüber jedoch zu bemerken ist, daß die Quantität an und für sich keineswegs ein Urtheil über die Wirkung des Blutflusses auf den Körper, welcher daran leidet, begründet, indem natürlich eine und dieselbe Blut-

menge für einen Körper höchst angreifend und beträchtlich, für einen andern gering seyn kann, wie dies schon bey dem normalen Blutflusse der Menstruation bemerkt worden ist. 2) Der Qualität nach, indem das abfließende Blut entweder hellrothes arterielles, oder dunkelgefärbtes, venöses, und ferner flüssiges und reines, oder coagulirtes und mißfarbiges, mit Lymphe oder Eiter gemischtes Blut ist.

Anmerkung. Was die Blutergießungen aus dem Uterus betrifft, so könnte man wohl die Frage aufwerfen, ob es überhaupt arterielle Blutungen in einem Organe geben könne, dessen natürliche Ausscheidungen (wie dies die Physiologie der Menstruation lehrte) doch höchst wahrscheinlich allein durch Venen bewerkstelligt werden? — und ob ich nun gleich ziemlich fest überzeugt bin, daß allerdings auch die Metrorrhagie außer der Menstruations- und Schwangerschaftszeit durch die an der innern Uterinfläche sich vorfindenden Venenmündungen geschehe, so halte ich doch jene Unterscheidung nicht für ganz überflüßig, indem es doch gewiß etwas Anderes ist, wenn das in die feinern Venenzweige ergossene arterielle Blut sogleich wieder aus diesen Venenzweigen ausströmt, oder wenn Blut, welches schon längere Zeit in den Venenstämmen verweilte, durch eine retrograde Bewegung (welche im Venensystem vielleicht häufiger als gemeinhin angenommen wird, vorkommt) sich ergießt.

§. 351.

Eine dritte Eintheilung bezieht sich auf das Verweilen oder Ausfließen des Blutes, nach welcher wir innern und äußern Gebärmutterblutfluß unterscheiden, und hier wird es denn noch erforderlich, der besondern Kennzeichen des erstern zu gedenken, indem für sämmtliche übrige Arten sich die charakteristischen Merkmale leicht von selbst darbieten. Ein Gebärmutterblutfluß also, wo das Blut in der Höhle des Uterus selbst sich anhäuft, wird erkannt: 1) aus den Zeichen des Blutverlustes und der Er-

schöpfung überhaupt, als: Sinken, und vermehrte Frequenz des Pulses, Mattigkeit, Schwindel, Ohrenbrausen, Kälte der Extremitäten, kalter Schweiß, eingefallene Gesichtszüge, Ueblichkeiten, Erbrechen, Zittern, Ohnmachten und Zuckungen. 2) Aus der Vergrößerung des Uterus, wobey der äußerlich durch die Bauchdecken fühlbar werdende Grund desselben weich, teigartig gefunden wird. 3) Aus vorhergegangenen oder noch einwirkenden Ursachen, welche eine Verschließung oder Verstopfung des Muttermundes zur Folge haben können. Uebrigens kann begreiflich ein wirklich bedeutender innerer Blutfluß außer der Schwangerschaft und Wochenperiode nur selten und nie ohne vorausgegangene krankhafte Metamorphose des Organs Statt finden.

§. 352.

4) Endlich unterscheiden wir, den Ursachen nach, zwischen aktivem und passivem Gebärmutterblutflusse, welches namentlich in Rücksicht der Behandlung wichtig ist. Der aktive Blutfluß ist Produkt örtlich erhöhter Gefäßthätigkeit, und wird gewöhnlich durch vorausgegangene Congestionen bedingt, weshalb ihm mancherley Vorboten: Schwere der Glieder, Ohrenbrausen, Kopfschmerz, Schwindel, vermehrte Wärme, Druck im Becken, Drängen zum Urinlassen u. s. w. häufig vorauszugehen pflegen. Diese aktiven Blutungen sind übrigens gewöhnlich mehr arterieller Beschaffenheit; das Blut wird gewöhnlich rein und flüssig ausgeleert, und sie sind mehr kräftigen, jüngern, sonst gesunden Körpern eigen. Der passive Blutfluß ist die Folge örtlich gesunkener Gefäßthätigkeit oder organischer Zerstörung der Gefäße selbst, wodurch sie außer Stand gesetzt werden, dem normalen, und noch weniger dem abnormen Andrängen der Blutmasse (bey Congestionen, welche allerdings auch dem passiven Blutflusse vorausgehen können) Widerstand zu leisten, obwohl hierbey auch auf die Verhältnisse der Blutmischung Rücksicht zu nehmen ist, und auch verminderte Gerinnbarkeit derselben, wie bey scorbutischen und typhösen Zuständen, passive Blutung bedingen kann.

§. 353.

Wesentlich ist demnach dieser Krankheitserscheinung im Allgemeinen: Mißverhältniß einer im Uterus Statt findenden Blutsekretion*) zu dem Stande allgemeiner Gefäßthatigkeit und der Reproduktion überhaupt, durch welche Bestimmung denn alle Arten normaler Blutergießungen dieses Organs am sichersten ausgeschlossen werden. Die entfernten Ursachen sind nach den verschiedenen Arten der Blutung verschieden. Für den aktiven Blutfluß sowohl als für den passiven geben 1) gewisse abnorme Erregungen der allgemeinen Gefäßthätigkeit (des einen Faktors der Krankheit) die Veranlassung. Sie werden bedingt durch: a) sehr reichliche Diät, besonders den Genuß stark nährender Getränke, z. B. starker Biere; b) sitzende Lebensweise; c) Nahrungs- oder Arzneymittel, welche die Nerven und Gefäße des Unterleibes und namentlich der Geschlechtsorgane, heftig anregen, als geistige oder überhaupt erhitzende Getränke, Wein, Chokolade, grüner Thee, stark gewürzte Speisen, drastische Abführmittel, zur Unzeit angewendete Emmenagoga u. s. w.; d) psychische Reize, als heftige Leidenschaften, Zorn, Schreck, Freude u. s. w., bey welchen die Blutbewegung entweder überhaupt ausnehmend gesteigert oder auch momentan gehemmt und Anhäufung in den Venen dadurch begünstigt wird; e) sehr heiße Temperatur der Luft und ähnliche Bäder.

§. 354.

2) Für den aktiven Blutfluß insbesondre wirken vorzüglich außer den genannten folgende, mehr örtliche Bedingungen erregend: a) ein hoher Grad von Reizbarkeit

*) Man darf bey den Ergießungen des Uterus diesen Namen wohl sehr mit Recht brauchen, da dieselben höchst wahrscheinlich zum Theil für das Weib mit wahren Sekretionen des männlichen Körpers gleichbedeutend sind, und wir H. Döllinger (s. Meckels Arch. für Phys. Bd. II.) ganz beytreten, wenn er sagt: das Weib zeuge namentlich durch Blut, wie der Mann durch Samen.

überhaupt, und besonders in den Nerven des Geschlechtssystems, welcher namentlich die Folge fehlerhafter physischer Erziehung, zeitiger und übermäßiger Geistesanstrengung, früher Ausschweifungen und des Mißbrauchs erhitzender Nahrungsmittel und Getränke zu seyn pflegt; b) Krankheiten benachbarter Unterleibsorgane, welche den Kreislauf des Pfortadersystems beeinträchtigen, und Andrang nach den Geschlechtsorganen veranlassen, eben so auch allgemeine Krankheiten, welche sich zuweilen sogar durch Metrorrhagien entscheiden, wo dann die Blutung allerdings sehr wohlthätig seyn kann; c) örtliche Reize von drückenden Pessarien, reizenden Injektionen u. s. w. 3) Für den passiven Blutfluß sind besondere Veranlassungen vorzüglich Krankheiten, welche entweder allgemeinen fehlerhaften Zustand der Sanguifikation bedingen (Skorbut, Faulfieber, Entmischung durch zu häufiges Aderlassen), oder in Verbildung der Uterinsubstanz sich darstellen, als Syphilis, schwammige Auftreibung des Uterus, Polypen, Skirrhus, Krebs, Steatomata, Leucorrhöe, sehr häufige vorausgegangene Wochenbetten, zurückgebliebene Nachgeburtsreste, Umstülpung, Vorfall des Uterus, so wie Einflüsse, welche entweder mechanisch den Uterus erschüttern, oder dynamisch die Auflockerung seiner Substanz vermehren, als Dampfbäder, Kohlentöpfe u. s. w. — Je mehr sich nun mit diesen örtlichen Veranlassungen die allgemeinen Abnormitäten der Gefäßthätigkeit (§. 353.) verknüpfen, um so stärker tritt der Blutfluß ein.

§. 355.

Der Gang, welchen diese Krankheit zu nehmen pflegt, die Folgen, welche sie herbeyführt, und die hieraus sich ergebende Prognose muß wieder theils nach den veranlassenden Ursachen, theils nach dem Grade der Krankheit sehr verschieden seyn. Was die aktiven Blutflüsse betrifft, welche aus der kräftigern Constitution der Kranken, der gewöhnlich mehr hellrothen Beschaffenheit des ausfließenden Blutes, der Abwesenheit bedeutender Verbildungen, dagegen oft durch die äußerst gesteigerte Reizbarkeit des Geschlechtssystems erkannt

werden, so sind sie gewöhnlich in ihrem Verlaufe mehr acut, und zwar um so mehr, je vollkommner sie der allgemeinen Gefäßthätigkeit angehören, je mehr sie aus einer wahren Plethora hervorgehen. Auch ergiebt es sich leicht, daß ein solcher Blutfluß gerade wie die unter ähnlichen Umständen gewöhnliche übermäßige Menstruation, für den Augenblick eher heilsam als gefährlich erscheinen werde, nur daß bey einer öftern Wiederkehr, oder bey langer Dauer, der Uebergang in einen passiven Blutfluß gefürchtet werden muß. Ist dagegen jene allgemeine Bedingung nicht vorhanden, und die aktive Metrorrhagie bloß durch unverhältnißmäßig gesteigerte Thätigkeit der Uteringefäße, namentlich bey einer im Allgemeinen schwächlichen Constitution, in Folge örtlicher Reize der Geschlechtsorgane, in Folge von Störungen des Kreislaufs im Pfortadersystem, etwa bey skrophulösen Individuen entstanden, so ist nicht nur der Blutverlust oft weit bedeutender und anhaltender, sondern seine Rückwirkungen auf das allgemeine Befinden sind zugleich weit eingreifender, die Zeichen der Verblutung (§. 351.) treten weit leichter ein, Wassersuchten, Gelbsuchten, Auszehrungen, Unfruchtbarkeit, unheilbarer weißer Fluß, folgen weit leichter nach, und die Prognose wird folglich weit ungünstiger.

§. 356.

Vorzüglich Gefahr drohend pflegen indeß die passiven Blutflüsse zu seyn, eines Theils, weil überhaupt Individuen, bey welchen Blutungen dieser Art vorkommen können, gemeiniglich schon sehr geschwächt sind, besonders die reproduktive Thätigkeit ihres Körpers gewöhnlich höchst zerrüttet ist, andern Theils, weil der Blutverlust selbst in der Regel bedeutender und anhaltender ist, als bey den übrigen Arten. — Der Gang und die Prognose der Krankheit im Einzelnen richtet sich übrigens nach den besondern abnormen Zuständen des Uterus, welche am häufigsten diese Blutungen zur Folge haben, und welche eben, in wiefern sie gewöhnlich langwierige, schwer oder gar nicht heilbare Zustände sind, vorzüglich habituell werdende, bey jeder stärkern Körper- oder Gemüths-

bewegung, oder sonstigen Veranlassung wiederkehrende Blutergießungen bedingen und somit die Prognose äußerst ungünstig machen. Wahre Verblutung und plötzlicher Tod, oder gefährliche Folgekrankheiten, Wassersucht, Auszehrung, heftige Schleimflüsse können daher hier sehr leicht eintreten.

§. 357.

Was die sonstigen besondern Formen der Metrorrhagie betrifft, so ist es, ob eine oder die andere derselben vorhanden, im Ganzen von geringerm Einfluß auf Krankheitsverlauf und Prognose, als die vorher erwähnten Momente; nur von dem Unterschiede zwischen innerem und äußerem Blutflusse ist zu bemerken, daß allerdings der erstere, theils wegen der schwierigen Erkenntniß, theils wegen der beträchtlichen Ausdehnung, so der Uterus dabey erleidet, und wodurch er zu neuen, vorzüglich passiven Blutungen immer mehr disponirt wird, gefährlicher sey als der äußere. — Daß endlich bey Stellung der Prognose auch ganz vorzüglich auf die Constitution der Kranken, so wie auf die Quantität des ausströmenden Blutes, auf minder oder heftiger einwirkende Gelegenheitsursachen, auf kürzere oder längere Dauer des Uebels und auf die äußern Verhältnisse der Kranken Rücksicht genommen werden müsse, ergiebt sich von selbst.

§. 358.

Von der Behandlung der Metrorrhagie. — In wiefern bey jedem Blutfluß immer die allgemeinen Zustände des Gefäßsystems von besonderer Wichtigkeit sind, und jeder Blutfluß, wenn auch durch ganz örtliche Veranlassungen hervorgerufen, doch wenigstens durch den Andrang vom allgemeinen Kreislaufe aus, fortwährend unterhalten wird, so muß es nothwendig als die erste und wichtigste Indication erscheinen, negativ zu verfahren, und alles abzuwenden, wodurch der Erethismus unterhalten oder vermehrt werden könnte, ein Grundsatz, worin denn auch alle, übrigens oft von sehr verschiedenen Gesichtspunkten ausgehenden Schriftsteller über diesen Gegenstand einstimmig sind. — Die hori-

zontale Lage wird daher zuvörderst der Kranken angewiesen, und wir stimmen Astruc bey,*) wenn er die Lage mit erhöhten Schenkeln hierbey nicht für zweckmäßig erklärt, indem dadurch zwar oft der Ausfluß des Blutes vermindert, aber Anhäufungen in den innern Geeurtstheilen (innere Blutungen) begünstigt werden. In dieser Lage ist ferner die vollkommenste Ruhe des Körpers, wie des Gemüths zu beobachten, und das Geschäft des Arztes wird es hierbey oft seyn, theils durch Entfernung aller beunruhigenden Personen und Gegenstände, theils durch freundliche Zusprache, das über den etwa plötzlich eingetretenen Blutfluß selbst gewöhnlich äußerst aufgeregte Gemüth der Kranken zu beruhigen. Zugleich achtet man darauf, alles zu entfernen, was eine gleichmäßige, ruhige Respiration (welche für Beruhigung der Blutbewegung so wichtig ist) unterbrechen könnte; man trägt Sorge, daß alle beengende Kleidungsstücke gelöst seyen und eine reine, sehr mäßig erwärmte Zimmerluft die Kranke umgebe.

§. 359.

Was dagegen die positive ärztliche Behandlung betrifft, so können hier durchaus keine so bestimmten und allgemein gültigen Heilregeln, wie rücksichtlich des Diätetischen, gegeben werden, und weder die schon von Hippokrates empfohlnen Brech- und Purgirmittel, noch die von Andern, z. B. von Astruc an die Spitze gestellten Blutentziehungen**), noch die einzelnen gerühmten Arzneymittel, vom Drachenblut bis zur Zimmttinktur, und neuerlich zur Ratanhia, dürfen als specifisch hülfreich betrachtet werden, sondern die verschiedenen Bedingungen der Krankheit sind ins Auge zu fassen,

*) Maladies des femmes. T. II. p. 115.

**) P. Frank Epitome d. hom. morb. cur. T. V. P. II. p. 110. sagt über die Venäsektion: saepe sanguis vel utrumque per ostium aufugit, vel imposito venae sauciatae spléniolo, ex viscere sponte cruorem frundente pergit fluere rebellis.

die innern und äußern entfernten Ursachen zu beseitigen, und daher in verschiedenen Fällen verschiedene Maaßregeln zu ergreifen.

§. 360.

Zuerst also die **Behandlung der aktiven Blutflüsse**: — Hier ist zu untersuchen, ob die örtliche Aufregung der Uteringefäße Produkt allgemeiner Zustände, namentlich des durch zu reichliche Ernährung und sitzende Lebensweise erzeugten allgemeinen Blutüberflusses sey, wobey dann der Puls voll und beschleunigt, das Gesicht röth, Kopfschmerz oder Kreuzschmerz vorhanden zu seyn pflegt, mehrere Vorboten gewöhnlich vorausgegangen sind, und die Blutung selbst in größerer Heftigkeit, aber auch in raschem Verlaufe erscheint. Diese Krankheitsform ist es alsdann, in welcher ein rein antiphlogistisches Verfahren indicirt ist, und wo das plötzliche Hemmen der (hier selbst als hülfreich, gleichsam kritisch erscheinenden) Blutung durch adstringirende Mittel den größten Nachtheil bringt. Hier also finden ganz besonders die Blutentziehungen selbst Statt, und es muß hierbey die Quantität des mittelst eines am Arm vorzunehmenden Aderlasses, so wie, ob vielleicht die Wiederholung des Aderlasses nöthig werde, vorzüglich durch die Umstände selbst bestimmt werden. Indeß kann man im Allgemeinen behaupten, daß es besser sey, etwas zu viel als zu wenig Blut wegzunehmen, indem der weibliche Körper überhaupt leicht Blutverluste ersetzt, und außerdem, bey nicht hinlänglicher Blutentleerung, die Metrorrhagie länger dauert, die Uteringefäße nachtheilig erweitert werden und die Blutung endlich zur habituellen wird.

§. 361.

Das übrige Heilverfahren wird ebenfalls vornehmlich auf Mäßigung des Orgasmus und Hinderung einer zu raschen Wiedererzeugung von Blut abzwecken müssen. Man läßt daher die Kranke nicht in warme Betten, sondern am besten auf eine Matraze unter leichte Wolldecken legen, ord-

net vegetabilische Säuren, Citronensaft, Himbeeressig u. s. w. unter das Getränk, läßt von Zeit zu Zeit etwas Himbeer- oder Citroneneis genießen, giebt Wasserkalteschalen zur Nahrung, wendet innerlich den Cremor tartari mit dem Nitrum an, und sobald die Heftigkeit der Blutung selbst gemäßigt ist, macht man mit Nutzen von kühlenden Abführmitteln aus Pulp. Tamarind., Manna, Tart. tartarisatus Gebrauch. Endlich ist auch nach gänzlich beseitigtem Anfalle darauf zu halten, daß die Lebensart angemessener eingerichtet und dadurch die Gelegenheit zu einer sonst leicht von neuem eintretenden Blutung gehoben werde. Die Reconvalescentin muß daher eine beschränktere, mehr vegetabilische Diät führen, ihre sitzende Lebensweise aufgeben und sich vor allen, das Geschlechtssystem insbesondre erregenden oder allgemeinen Erethismus veranlassenden Einflüssen hüten.

§. 362.

Ist aber zweytens die aktive Blutung nicht die Folge von wahrer Plethora, sondern von einer im Mißverhältniß zur allgemeinen Reproduktion aufgereizten Thätigkeit der Uteringefäße, so ist die Hauptindication zwar theils immer wieder Herabstimmung allgemeiner Blutbewegung, theils aber Verminderung der gesteigerten Sensibilität. Die besondern Mittel zur Erfüllung dieser Indication sind in verschiedenen Individuen verschieden. Bey übrigens wohlgenährten, blutreichen Naturen, wie man sie gerade bey gesteigerter Sensibilität, vorzüglich in den höheren Ständen, gar nicht selten findet, sind ebenfalls Blutentziehungen am Arme, wenn auch in etwas kleinern Quantitäten und mehr als Ableitungen betrachtet, sehr wohlthätig, und man kann damit wieder ziemlich das im vorigen Paragraph geschilderte weitere Heilverfahren verbinden, nur daß man nach zweckmäßiger Blutentleerung und Rücksicht auf Befreiung des Darmkanals mehr von den mineralischen Säuren, als Aqua Rabeliana oder Elixir acidum Halleri Gebrauch macht.

§. 363.

Bey einer mehr schwächlichen Constitution, oder wo der Blutfluß schon längere Zeit angehalten und durch seine Heftigkeit die Kräfte bereits sehr erschöpft hat, ist dann statt der Blutentziehungen von andern ableitenden Mitteln, von gelinder Hauterwärmung durch Friktion, von Beförderung allgemeiner Transpiration, von Aufsetzen trockner Schröpfköpfe auf den Unterleib oder auf die innere Schenkelfläche, oder auf die Brüste, Gebrauch zu machen, ja, wenn das sonst empfohlene Anlegen von Binden um Oberschenkel und Arme jemals einen wirklich wohlthätigen Einfluß gezeigt hat, so ist es ohne Zweifel namentlich in diesen Fällen gewesen. Aeußerlich wendet man aromatischen Essig als Fomentation auf die Geburtstheile, oder Aufgüsse von aromatischen Kräutern, mit Essig und Wein vermischt, zu ähnlichen Fomentationen oder zu Injektionen in die Vagina an, macht Einreibungen von Naphta auf den Unterleib, und von einigen (z. B. von Chanssier) sind auch die eiskalten Umschläge auf die Füße gerühmt worden. Innerlich sind wieder ganz vorzüglich die mineralischen Säuren zu empfehlen, und zwar wählt man bey anhaltendem Blutflusse, wo diese Mittel oft längere Zeit gegeben werden müssen, um die nachtheilige Wirkung derselben auf die Verdauungswerkzeuge zu vermeiden, vorzüglich ihre Verbindung mit bittern Extrakten, oder das an sich mit bittern und aromatischen Stoffen bereitete Elix. acidum Mynsichtii. Endlich sind aber auch die narkotischen und krampfwidrigen Mittel für diese Fälle von Blutungen hülfreich, und theils das Doversche Pulver, theils die Verbindung des Laudani liq. mit den mineralischen Säuren, vorzüglich auch das Opium in Klystiren angewendet, verdienen hier Empfehlung.

§. 364.

Die diätetischen Mittel betreffend, so muß bey dem §. 362. berührten Falle wieder eine ähnliche Lebensordnung, wie §. 361. vorgeschrieben ist, beobachtet werden, bey den-

jenigen Constitutionen hingegen, von welchen §. 363. die Rede war, ist es nothwendig, theils für etwas mehr äußere Wärme zu sorgen, theils durch das übrige Verhalten die Reproduktion mehr zu begünstigen, und einer zu beträchtlichen Schwächung des Nervensystems durch gelind erregende und stärkende Mittel vorzubeugen. Man reicht einer so erschöpften Kranken etwas Zimmt- oder Melissenthee mit Wein, späterhin Alaunmolken, erlaubt ihr eine kräftigere, obwohl leicht verdauliche, Nahrung, etwas Bouillon mit Ey, Hirschhorngallert, läßt bey Schwindel und Ohnmachten die Schläfengegend, vorzüglich aber den Unterleib, mit köllnischem Wasser waschen u. s. w. — Ganz besonders indeß muß bey diesen Zuständen die obwaltende Veranlassung, welche oft in andern Krankheitszuständen liegt, berücksichtigt und darnach denn oft die angegebene Behandlung noch modificirt werden. Sind daher Unregelmäßigkeiten in der Funktion der Unterleibsorgane, skrofulöse Zustände, Obstructionen u. s. w. vorhanden, so ist nicht eher eine vollkommne Heilung der, wenn auch vielleicht für kurze Zeit stehenden, aber immer von neuem wiederkehrenden Blutungen zu hoffen, bevor nicht durch die schon bey den Unregelmäßigkeiten der Menstruation erwähnte resolvirende und ausleerende Methode eine gründliche Beseitigung dieses gastrischen Zustandes Statt gehabt hat*); und hier ist es auch, wo bey nach oben turgescirenden Unreinigkeiten, bey einer durch Ueberladung erzeugten Verdorbenheit der Verdauungskräfte, bey der nach heftigen Gemüthsbewegungen oft Statt findenden Polycholie u. s. w. selbst die Brechmittel (Ipecacuanha) eine höchst wohlthätige Wirkung üben, indem sie nicht nur die Ausleerung bewerkstelligen, sondern auch durch ihre Wirkung auf das Nervensystem zur Verminderung der örtlich krankhaft erregten Sensibilität wesentlich beytragen.

*) Diese Form der Metrorrhagie ist es insbesondre, welche, wie Reil (Fieberlehre Bd. III. S. 309.) nach Stoll anführt, zuweilen epidemisch vorkommt.

§. 365.

Außerdem können diese von örtlich gesteigerter Erregung bedingten Blutflüsse mitunter durch äußere Reize unterhalten werden, z. B. durch Pessarien, welche sofort zu entfernen, und, wenn sie nicht ganz entbehrt werden können, mit einem in Infus. serpylli, mit etwas Wein vermischt, getauchten Schwamme zu vertauschen sind. Ferner ist Vermeidung alles Geschlechtsreizes, so lange noch die geringste Neigung zur wiederkehrenden Blutung vorhanden ist, zur strengsten Pflicht zu machen. Auch chronische Entzündungen, Geschwüre, scharfer weißer Fluß, Syphilis, Auswüchse der Mutterscheide u. s. w. können Veranlassung zur Entstehung oder Unterhaltung dieses Blutflusses seyn, und müssen dann nach den ihrer Natur angemessenen Regeln behandelt werden. — Daß endlich, wo dieser Blutfluß etwa an andere Krankheiten als eine kritische Ausleerung sich schließt, zu seiner Unterdrückung gar nichts geschehen dürfe, sondern bloß zweckmäßige Behandlung der zum Grunde liegenden Krankheit angezeigt sey, liegt am Tage.

§. 366.

Wir kommen nun zur Behandlung passiver Metrorrhagien. Auch hier ist außer den allgemeinen, §. 358. angegebenen Regeln zunächst das allgemeine Befinden ins Auge zu fassen und danach das Heilverfahren einzuleiten. Colliquative Blutungen, als Folge typhöser Zustände oder skorbutischer Auflösung der Blutmasse, erfordern daher den Apparat der analeptischen, Contraktion und Lebensthätigkeit überhaupt fördernden Mittel; oft jedoch müssen auch die Mittel, welche zur schnellen Stillung lebensgefährlicher Blutungen überhaupt empfohlen werden können und von welchen unten die Rede seyn wird, angewendet werden. Ist hingegen Erethismus des Adersystems vorhanden, welcher bey gesunkener Vitalität der Uteringefäße hier durch Blutergießung sich ausspricht, so muß dann zunächst wieder ein ähnliches allgemeines Verfahren, als oben bey den aktiven Blutungen empfohlen worden ist, auch hier Anwendung finden, besonders

sind die mineralischen Säuren, und noch mehr die hier ganz passende Phosphorsäure in Verbindung mit den §. 363. erwähnten ableitenden Mitteln in Gebrauch zu ziehen, und Veranlassungen, durch welche allgemeiner Erethismus unterhalten wird, wohin auch gastrische Zustände gehören, sind zu entfernen.

§. 367.

Vorzüglich aber verdient bey dieser Gattung der Metrorrhagie der örtliche Zustand des Uterus Berücksichtigung, und da auch in dieser Hinsicht oft besondere Gelegenheitsursachen einwirken können, so muß auf Entfernung derselben Bedacht genommen werden, obwohl auch hier oft vorher die schneller wirkenden blutstillenden Mittel in Anwendung zu ziehen sind, sobald der Blutfluß Gefahr droht und das erstere in kurzer Zeit sich nicht ausführen läßt. Zu jenen Gelegenheitsursachen gehören aber theils mechanische Ursachen, als Druck von Pessarien, welche sofort zu entfernen, oder durch einen in adstringirende, mit Branntwein vermischte Dekokte getauchten Schwamm zu ersetzen sind, falsche Lagen des Uterus, namentlich Vorfälle, welche zurückzubringen und durch das vorgenannte Mittel zurückzuhalten sind. Ferner vorzüglich Ausartungen der Uterinsubstanz, namentlich Gebärmutterpolypen, welche durch die unten zu beschreibende Operation entfernt werden müssen; eben dasselbe gilt auch von den Nachgeburtsresten. Krebshafte Zustände des Uterus hingegen lassen, in sofern sie Hämorrhagien erregen, gewöhnlich nur die theils oben erwähnte Rücksicht auf Hebung des Erethismus, theils die auf unmittelbare Sistirung der Blutung gerichtete Behandlung zu.

§. 368.

Wir gehen daher jetzt die Mittel insbesondre durch, welche zu schneller Hemmung lebensgefährlicher, vorzüglich auf Atonie gegründeter Mutterblutflüsse sich immer am hülfreichsten bewiesen haben. Wie man indeß am deutlichsten bey äußerlichen, durch Verletzung entstandenen Blutungen beob-

achten kann, wird eine solche Ergießung vorzüglich auf zweyerley Weise schnell gestillt, erstens durch mechanische Zusammenpressung der blutenden Gefäße, sey dies nun durch innere Muskularthätigkeit oder durch äußere Gewalt geschehen; zweytens durch aufgeregte Contraktilität der blutenden Gefäße selbst. Beobachten wir nun den Weg, welchen die Natur selbst einschlägt, um die normalen Blutergießungen aus den Uteringefäßen zu beendigen, so giebt dies wieder für die rechte Art der Behandlung krankhafter Ergießungen dieser Art einen wichtigen Fingerzeig ab. Der Monatsfluß nämlich, als eine wahre aktive Blutung, wird in seinem Aufhören bedingt durch Minderung des Andranges vom allgemeinen Gefäßsystem aus, der Wochenfluß hingegen, welcher mehr als eine durch Eröffnung der Venenzellen des Uterus vom Ablösen der Placenta bedingte passive Blutung betrachtet werden kann, hebt sich durch die Contraktion, durch die Verkleinerung des entleerten Fruchthälters und durch die auf diese Weise bewirkte Zusammendrückung der blutenden Gefäßmündungen.

§. 369.

Schon hieraus ergiebt sich nun wohl, daß gewiß auch so wie für die Hemmung krankhafter Blutergießung aktiver Art das oben erwähnte allgemeine Verfahren das zweckmäßigste ist, für die schnelle Stillung der passiven Blutflüsse hingegen, die auf Erregung allgemeiner Zusammenziehung des Fruchthälters abzweckenden Mittel am meisten angezeigt seyn werden. Wir unterscheiden von diesen Mitteln die innern und äußern, und betrachten die erstern zunächst: — a) die Zimmttinktur stellen wir wohl billig oben an, da kaum ein Arzt oder Geburtshelfer seyn wird, der nicht von ihren äußerst wohlthätigen Wirkungen Gebrauch gemacht und sie äußerst nützlich gefunden hätte. Man giebt sie zu 20—60 Tropfen, und es hat mir immer geschienen, als werde ihre Wirkung (vielleicht durch gleichzeitige Verminderung allgemeiner Sensibilität) sehr befördert, wenn man der angegebenen Dosis einige Tropfen TR. thebaica beyfüge. b) Das Mutterkorn (Secale cornutum), ein neuerlich von Olivier

Prescot, Arzt in Nordamerika, empfohlenes Mittel, um kräftige Contraktionen der Gebärmutter zu erregen.*) Er empfiehlt es in folgender Form:

℞. Secal. cornuti ℥I
Coq. c. Aqua font. q. s. ad Col. ℥IV.

S. Hiervon alle 12 Minuten den dritten Theil zu nehmen.

Der Nutzen desselben, theils in dieser Form, theils in Substanz, ist seitdem von mehreren Aerzten bestätigt worden**), und ich selbst habe von der geistigen Tinktur des Mutterkorns wohlthätige Wirkung bey unkräftigen Wehen beobachtet, und so dürfen wir es wohl als ein nicht zu übergehendes Mittel auch in Gebärmutterblutflüssen (gegen welche es schon von Prescot besonders mit empfohlen wurde) namhaft machen.

§. 370.

c) Die Cassia lignea, der Zimmtrinde nahe verwandt, und von Justi***) vorzüglich zu 10—20 Gran alle Stunden empfohlen. d) Die Phosphorsäure, welche als durchdringendes, erregendes Mittel in flüssiger Form zu 15—20 Tropfen in schleimigen Vehikeln allerdings kräftig zur Contraktion der blutenden Gefäße wirkt. — Mehr noch direkt die Contraktilität der blutenden Gefäßmündungen selbst in Anspruch nehmend, eben daher aber auch weniger zur schnellen Hebung heftiger Blutstürze, als vielmehr zur Heilung anhaltender Blutungen geeignet, sind die folgenden Mittel: — e) Alaun zu 8—10 Gran in Pulverform mit Zucker, ist ein wirksames Mittel, sobald gastrische Complicationen vorher gehörig beseitigt sind. f) Das Drachenblut, ein dem vorigen in seiner Wirkung sehr ver-

*) Hufeland's Journal f. d. pr. Heilk. 1815. Decbr. S. 342.

**) z. B. vom Medicinalr. Schneider in Fulda (s. Allgem. medic. Annalen. 1817. S. 90.

***) Stark's Archiv. Bd. III. St. 1. S. 93.

wandtes Mittel, und daher von den älteren Aerzten als Specificum Helvetii*), in Verbindung mit jenem, häufig angewendet und empfohlen. g) Das Kinogummi, ebenfalls als Pulvis stypticus mit dem Alaun verbunden, und die Japanische Erde, zwey dem Drachenblute ähnliche, indeß jetzt nicht eben häufig mehr angewendete Mittel.

§. 371.

h) Ferner wird von Reil**) nach Bishoprik ein Mittel aus gebranntem Kupfervitriol, Drachenblut und Weingeist empfohlen, dessen Wirkungen sehr günstig in ähnlichen Fällen gewesen seyn sollen. i) Auch den Bleyzucker hat man bey Metrorrhagien empfohlen, nur ist doch nicht zu übersehen, daß die anderweitige Wirkung dieses Mittels oft sehr nachtheilig werden könne und man daher es zweckmäßig mit andern, gewiß nicht minder wirksamen, vertauscht. Was k) das Kochsalz und den Salpeter betrifft, so können sie wohl nicht füglich anders, als durch Revulsion wirken, daher sie mehr bey heftigen aktiven Blutflüssen aus gesteigerter Reizbarkeit Anwendung finden, wo denn auch die, freilich wieder auf andere Weise, wirkende Digitalis purpurea mit Recht empfohlen werden könnte. — Endlich ist nicht ganz mit Stillschweigen zu übergehen, daß man früher oft Mittel gegen den Blutfluß empfohlen hat, denen man nicht füglich anders, als durch den Abscheu der Kranken gegen dieselben, eine hier vortheilhaft werdende Erregung des Nervensystems zuschreiben kann. Dahin gehört es, die Kranken etwas von ihrem eigenen Blute getrocknet nehmen zu lassen, die Anwendung der kalcinirten Menschenknochen, das Tragen einer getrockneten Kröte auf der Herzgrube, das Anrühren eines Todten und andere abergläubische

*) Es besteht aus zwey Theilen Alaun und einem Theile Drachenblute; s. Jahn prakt. Materia medica. Thl. I. S. 85.

**) Fieberlehre. Bd. III. S. 329.

Dinge mehr, von welchen man bey Astruc*) noch mehrere aufgeführt finden kann.

§. 372.

Wir haben ferner der wirksamsten äußern Mittel zu gedenken: — a) Eins der hülfreichsten derselben ist aber die äußere Einreibung des Leibes mit der flachen Hand, wobey sicher nicht allein die mechanische Reizung, sondern zugleich eine dynamische Einwirkung, welche man wohl mit Recht eine magnetische nennen kann, in Anschlag zu bringen ist. Verstärkt wird dieses Mittel, wenn man noch erregende Arzneystoffe damit verbindet, z. B. die Naphtha vitrioli auftröpfelt und einreibt, wobey auch der Reiz der durch das schnelle Verdunsten des Aethers erregten flüchtigen Kälte wohlthätig sich zeigt; ferner ist das Linimentum volatile, und bey sehr hohen Graden von Atonie selbst der reine Spirit. sal. ammon. zum Einreiben anwendbar. b) Die Injektionen sind, gleich dem vorigen Mittel, in allen Fällen beträchtlicher Erweiterung und Erschlaffung des Uterus, von ausnehmendem Nutzen. Auch sie hat man in zwey Klassen zu theilen, je nachdem sie entweder die Verstärkung der Contraktilität in den blutenden Gefäßmündungen überhaupt zum Zweck haben, oder auf Erregung von Contraktion im ganzen Organe hinwirken. Zu den erstern gehören die Einspritzungen von adstringirenden Dekokten (Cort. Quercus, Ulmi camp., Salicis u. s. w.) und vorzüglich der Alaunauflösung, zu den letztern die Aufgüsse aromatischer Kräuter (Hb. Serpilli, Meliss., Majoran., Rutae, Menth. crisp. u. s. w.), mit Wein oder Branntwein vermischt. Was die erstern betrifft, so sind sie vorzüglich in Fällen schwammiger Auflockerung der Fruchthälterwände ohne besondere Vergrößerung der Gebärmutterhöhle, was die letztern betrifft, so sind sie dagegen mehr bey Vergrößerung der Gebärmutterhöhle selbst, durch zurückgebliebene Nachgeburtsreste, Polypen, coagulirtes Blut u. s. w. angezeigt. Indeß wird es immer zweckmäßi-

*) Maladies des femmes T. II. p. 185.

ger seyn, bey den aromatischen Injektionen (welche im Ganzen in den meisten Fällen angezeigt sind) einen Zusatz zu machen, welcher auf Contraktion der blutenden Gefäße mit abzweckt, und hierzu taugt vorzüglich der Zusatz stark bitterer Kräuter und des Essigs. Die Einspritzungsmasse, von welcher ich daher immer die vorzüglichste Wirkung sah, bereitet man ohngefähr so, daß man eine Kanne vom Aufguß der Hb. Melissae, Serpilli und Absinthii mit einer reichlichen Tasse guten Weinessigs und einer Tasse Branntwein oder zwey Tassen Wein versetzt und dieses durch den wohl eingebrachten (für den nicht schwangern Uterus nicht zu großen) Knopf der Mutterspritze langsam in die Gebärmutterhöhle selbst leitet.

§. 373.

c) Das Tamponiren wirkt wieder nur auf die blutenden Gefäßmündungen unmittelbar, theils durch mechanischen Druck, theils durch die damit verbundenen styptischen Mittel, und kann folglich nur angezeigt seyn, wo die blutenden Gefäßmündungen selbst erreicht werden können. Es findet sonach Statt bey Blutungen in Folge von Geschwüren, carcinomatösen Erosionen, schwammiger Auflockerung der Vaginalportion u. s. w., und wird entweder nach Le Roux angewendet, indem man weiche Leinwand in Essig taucht und diese sodann in die Mutterscheide und zum Theil in den Uterus selbst einbringt, oder aber, indem man Wolle, Charpie oder Schwamm auf ähnliche Weise befeuchtet (wozu man sich der erwähnten adstringirenden Dekokte, oder bey großer Atonie auch des reinen Branntweins bedient) und diese sogenannten Mutterzapfen mit einem Pulver aus Alaun, arabischem Gummi, Drachenblut u. s. w. bestreut. — Daß übrigens, wo der Tampon die blutenden Gefäße nicht erreicht, sondern nur den Muttermund verstopft, seine Anwendung oft innere Blutungen herbeyführen und dadurch höchst nachtheilig, ja gefährlich werden könne, liegt am Tage.

§. 374.

d) Gürtel, mit adstringirenden Dingen, als gepulverte Eichenrinde, Galläpfel, China u. s. w. gefüllt, mit spirituösen Dingen besprengt und um den Unterleib getragen, können vorzüglich gegen lang dauernde geringere Metrorrhagien oft mit Nutzen gebraucht werden. e) Zusammendrücken des Uterus von Außen ist bey den Blutungen der Nichtschwangern in der Regel gar nicht thunlich, und überhaupt der Anwendung der übrigen blutstillenden Mittel gewiß nachzusetzen, da durch diesen Druck die Muskelkraft selbst gelähmt werden muß. f) Anwendung der Kälte. Man hat die deprimirende zusammenziehende Kraft, welche die Kälte auf den thierischen Organismus überhaupt äußert, bey Metrorrhagien insbesondere auf verschiedene Weise benutzt. Theils nämlich als Anspritzen des Unterleibes, oder Aufgießen von eiskaltem Wasser oder Auflegen sehr kalter, nasser Umschläge, theils als Einspritzung durch das Mutterrohr, oder Einbringung von Eis in die innern Geburtstheile. — Daß nun im Allgemeinen die Kälte hier wegen der nachtheiligen Einflüsse, welche sie auf andere Organe und den Uterus selbst leicht haben kann, immer ein zweydeutiges Mittel bleibe, ist wohl unläugbar, jedoch ist auch zuzugeben, daß die Erkältung, und in Folge dieser, Entzündung, Verhärtung u. s. w. um so weniger Statt haben werden, je flüchtiger die Wirkung der Kälte war. Wendet man daher die Kälte auf den Unterleib an, so ist es nöthig, gleich nach dem Aufspritzen, oder gleich nach Hinwegnahme der Umschläge, welche nur sehr kurze Zeit jedesmal liegen bleiben dürfen, den Leib sorgsam abzutrocknen und mit durchwärmten wollenen Tüchern zu bedecken; eben so ist das schnelle Abfließenlassen der kalten Injektion (also, indem man bey nicht zu sehr erhöhten Schenkeln der Kranken die Einspritzung macht) vortheilhaft.* — Unter dieser Vorsicht nun und namentlich bey wirklichen Vergrößerungen der Gebärmutterhöhle durch Polypen, innere Blutungen u. s. w. darf allerdings die Kälte bey Mutterblutflüssen nicht nur angewendet werden, sondern sie verdient auch gerade wegen der oft sehr schnellen Wirksamkeit, und

insbesondere, weil man die Gelegenheit zu ihrer Anwendung überall vorfindet, ein bedeutendes Mittel mit Recht genannt zu werden. — Erhöht kann übrigens die Wirkung der Kälte noch werden, wenn man statt des reinen Wassers eine Mischung aus Essig oder Branntwein und Wasser gebraucht.

§. 375.

Nachdem wir nun diese Mittel, auf welche wir auch bey den Blutungen der Schwangern und Wöchnerinnen zurückweisen werden, hier ausführlicher durchgegangen haben, kann nur über die Behandlung der verschiedenen Formen, so wie über die Nachkur des Gebärmutterblutflusses Einiges hinzugefügt werden. Die Formen betreffend, so ist rücksichtlich des plötzlichen heftigen Blutflusses und der langwierigen schwächern Blutungen schon im Vorhergehenden auf die entweder dem erstern oder den letztern angemessenen Mittel Rücksicht genommen worden. Was den äußern und innern Gebärmutterblutfluß hingegen betrifft, so kann ihre Behandlung nur in sofern verschieden seyn, als bey dem letztern erstens die Ursachen, welche gerade diese Form veranlassen, z. B. Blutklumpen im Muttermunde, Nachgeburtsreste u. s. w. beseitigt und dann vorzüglich (wegen der hier immer Statt findenden Vergrößerung der Gebärmutterhöhle) die genannten, auf Contraktion des gesammten Uterus abzweckenden Mittel angewendet werden müssen.

§. 376.

Die Nachkur der Metrorrhagien hat insbesondre zwey Indicationen, erstens, den Folgen des Blutflusses selbst zu begegnen; zweytens, die Ursachen, welche erneuerte Ergießungen veranlassen könnten, zu beseitigen. Die Folgen, welche namentlich bey den aktiven Blutungen durch örtliche Erregung, und noch mehr bey den passiven Blutungen sich zeigen, bestehen theils in örtlicher und allgemeiner Erschöpfung, theils in besondern Folgekrankheiten. Dem erstern Zustande ist durch ein zweckmäßig eingeleitetes, auf Hebung der Reproduktion abzweckendes Heilverfahren zu begegnen. Der Arzt

hat demnach zuvörderst sein Augenmerk auf den Zustand der Verdauungswerkzeuge, von welchen alle Reproduktion ausgehen muß, zu richten; denn es ist bekannt, wie schnell ein Säfteverlust dieser Art ersetzt wird, sobald die im weiblichen Körper überhaupt kräftigere Assimilation regelmäßig von Statten geht, und daß es thörigt sey, zu erwarten, daß ohne diese Rücksicht, durch bloße sogenannte roborirende Mittel eine größere Lebensthätigkeit erzwungen werden könne. Sind daher gastrische Zustände beseitigt, so ordnet man eine leicht verdauliche, nahrhafte Diät aus Eyern, Bouillon, Sago, Gries u. s. w. an, und empfiehlt den Gebrauch eines guten alten Weins; zugleich giebt man die China, welcher in diesen Fällen wohl kaum ein anderes Mittel von gleicher ausgezeichneter Wirksamkeit an die Seite gesetzt werden kann, läßt die eisenhaltigen Mineralwässer trinken, ähnliche Mineralbäder besuchen, empfiehlt überhaupt Landluft, mäßige Bewegung, Aufheiterung des Gemüths, und rücksichtlich der örtlichen, oft durch unordentliche Menstruation u. s. w. bezeichneten Schwäche der Geschlechtstheile bedient man sich der Einreibung, des Tragens der §. 374. erwähnten Gürtel, oder des Emplastr. aromatici, der Elektricität, der wollenen Bekleidung der Schenkel u. s. w. — Wahre allgemeine oder örtliche Folgekrankheiten (z. B. Wassersuchten, weißer Fluß) müssen ihrer besondern Natur nach behandelt werden. — Endlich ist vorzüglich nach passiven, oder überhaupt von örtlichen Krankheitszuständen des Uterus bedingten Blutflüssen darauf zu denken, daß die organischen Veranlassungen, als polypöse Auswüchse, Vorfälle, Schieflagen u. s. w. gründlich gehoben, erhitzende Bewegung, spirituöse Getränke, heftige Gemüthsbewegungen und vorzüglich Geschlechtsreize vermieden werden.

3.

Weißer Fluß, Schleimfluß der weiblichen Geburtstheile (Fluor albus, Leucorrhoea).

§. 377.

Wir reihen an die Betrachtung der Metrorrhagie sogleich die der Leukorrhöe, als einer sehr häufigen Folgekrankheit, an, obwohl sie keineswegs allein auf den Uterus eingeschränkt ist. Es ist nämlich unter der Benennung des weißen Flusses begriffen eine jede abnorm vermehrte Schleimabsonderung der die Vagina, den Uterus, die Harnröhre, ja selbst die äußern Genitalien auskleidenden und überziehenden Häute. Quantität und Qualität dieses Abflusses, Entstehung und Verlauf dieser Krankheit sind hierbey sehr großen Verschiedenheiten unterworfen, welches zu mehrfachen Eintheilungen derselben Veranlassung gegeben hat. Zuvörderst die Quantität betreffend, so ist sie zuweilen nur gering, und beschränkt sich auf seltnen, tropfenweisen Abgang, zuweilen aber auch so stark, daß der Schleim fast anhaltend ausfließt; überhaupt aber ist sie in verschiedenen Perioden ebenfalls verschieden, bey herannahender Menstruation, beginnender Schwangerschaft gewöhnlich beträchtlicher, ja selbst nach verschiedenen Tages- und Jahreszeiten bald stärker, bald schwächer.

§. 378.

Ferner der Qualität nach, ist der weiße Fluß zu unterscheiden in den wäßrigen, milchartigen, grünlichen oder mißfarbigen, geruchlosen oder riechenden, milden oder scharfen, die Geburtstheile und die innere Schenkelfläche wundmachenden Abgang: Unterschiede, welche jedoch wenig wesentlich sind und zum Theil nur von Unreinlichkeit, fremden Körpern in den Geburtstheilen, z. B. Pessarien oder Polypen, abhängen. — Rücksichtlich des Ganges ist die Krankheit entweder plötzlich nach Ansteckung und Entzündung, oder

langsam entstehend, entweder habituell und stets andauernd, oder intermittirend und periodisch, oder auch ohne Ordnung wiederkehrend. Weiter hat man überhaupt gutartigen und bösartigen weißen Fluß, venerischen und nicht venerischen, einfachen und complicirten unterschieden. Was indeß die Gutartigkeit oder Bösartigkeit der Krankheit betrifft, so ist dieser Unterschied nicht im Wesen derselben, sondern in der Constitution der Kranken und den äußern Verhältnissen begründet, und am wenigsten darf man annehmen, daß etwa der durch Ansteckung entstandene allein bösartig, der von selbst entstandene gutartig sey, indem oft allerdings gerade das Umgekehrte Statt findet. Der Unterschied zwischen venerischer und nicht venerischer Leukorrhöe endlich, wenn er andeuten soll, daß es wirklich einen wahrhaft syphilitischen weißen Fluß geben könne, ist unstatthaft, indem diese Schleimflüsse, obwohl sie contagiös werden können, wie dies auch von andern Schleimflüssen, z. B. dem der Nase (Schnupfen), anerkannt werden muß, doch mit der Syphilis an und für sich gar nichts gemein haben,*) (obwohl sie allerdings mit Syphilis verbunden vorkommen können) wovon sich demungeachtet manche Aerzte, und gewiß zum Nachtheil ihrer Kranken, nicht überzeugen können.

§. 379.

Die Entwicklung und die Symptome der Krankheit sind verschieden: wo sie ohne Ansteckung allmählig entsteht, beginnt sie in der Regel mit einem zur Zeit der herannahenden und der vorübergegangenen Menstruation sich zeigenden, nicht allzustarken, milden Schleimabgange aus den Geburtstheilen; übrigens ist der Körper gesund, und alle seine Thätigkeiten gehen regelmäßig von Statten. Nach und nach, vorzüglich wenn schwächende Einflüsse den Körper betroffen haben, nach schweren Krankheiten, bey zunehmenden Jahren u. s. w. nimmt der Abgang zu, es gesellen sich schwammige Auflockerung der Vaginalportion, rundwerdender

*) s. P. Frank Epit. T. V. P. I. p. 152.

Muttermund, Empfindlichkeit der Geschlechtsorgane, Urinbeschwerden, Störungen der Verdauung und allgemeine Abmagerung hinzu. Zugleich dehnt sich die Periode des Ausflusses vor und nach der Menstruation immer mehr aus, ja zuletzt ist, zu keiner Zeit die Kranke von diesem belästigenden Abflusse völlig frey. Endlich aber nimmt die Quantität des ausfließenden Schleims immer mehr überhand, die Qualität desselben wird immer mißfarbiger und verdorbener, die Menstruation verliert sich endlich vollkommen, die Excoriationen und Schmerzen der Geschlechtstheile nehmen zu und die Reproduction sinkt immer mehr.

§. 389.

Ist dagegen die Leucorrhöe Folge der Ansteckung, so ist ihr Verlauf gewöhnlich mehr acut, es entsteht am zweyten oder dritten Tage nach erfolgter Infektion Brennen in den Geburtstheilen, die Temperatur der Vagina ist erhöht, die äußern Genitalien sind wulstiger und mehr geröthet, der Geschlechtsreiz ist stärker, der Urinabfluß schmerzhaft oder auch etwas gehindert, selbst leichte Fieberbewegungen, vermehrter Durst u. s. w. gesellen sich oft hinzu, obwohl eben die geringere Reizbarkeit der innern Vaginalhäute, im Vergleich der weit größern Empfindlichkeit der innern Fläche der männlichen Harnröhre, die Zufälle, welche bey dem von Ansteckung erfolgten Schleimflusse (Tripper) der weiblichen Genitalien eintreten, weit geringer, als die, welchen das männliche Geschlecht hierbey ausgesetzt ist, zu seyn pflegen. — Nachdem dieses entzündliche Stadium einige Tage angehalten hat, tritt dann der Schleimfluß selbst ein, welcher hier gewöhnlich von mehr verdickter, dem Eiter sich nähernden Consistenz, selbst von ansteckender Beschaffenheit ist, und nun, je nachdem die Constitution der Kranken kräftiger oder minder kräftig ist, entweder kürzere oder längere Zeit anhält, ja selbst habituell und bleibend werden kann.

§. 381.

Eben so pflegt der Verlauf dieser Krankheit mehr acuter Natur zu seyn, wenn sie sich als kritische Ausleerung nach Fiebern, oder als Metastase von katarrhalischen, rheumatischen und gichtischen Zuständen, oder als Stellvertreter für andere gewohnte Ausleerungen eintritt, obwohl in den letztern Fällen wieder das Uebergehen in eine habituelle Leukorrhöe sehr leicht Statt finden kann. Die Ausleerungen, für welche die Leukorrhöe öfters vicariirt, sind theils Hämorrhoidalflüsse, theils schnell geheilte Geschwüre, oder chronische Hautausschläge; ferner tritt sie öfters ein bey Unterdrückungen der Menstruation, nach schnell verschwundenen Fußschweißen, unterlassenen gewohnten Blutentleerungen oder Abführungen, oder endlich auch veranlaßt durch andere Krankheiten und in Begleitung derselben (z. B. mit verschleimtem Zustande des Darmkanals, Würmern, falschen Lagen der Gebärmutter u. s. w.).

§. 382.

Das Vorkommen der Krankheit ist zwar am häufigsten bey Frauen, welche bereits ein oder mehrere Male geboren haben; indeß wird es auch bey Jungfrauen, in seltnen Fällen sogar vor der Pubertätsentwicklung bemerkt, und pflanzt sich desgleichen noch auf das höhere Alter häufig fort. Im Allgemeinen ist sie wohl eine der häufigsten Beschwerden des weiblichen Geschlechts zu nennen, und vorzüglich bey erschlaffender üppiger Lebensweise der obern Stände äußerst gewöhnlich. Mitunter hat man, unter atmosphärischen Einflüssen, welche überhaupt die Entstehung von Krankheiten der Schleimhäute begünstigen, z. B. in nasser Herbstzeit, die Leukorrhöe epidemisch, und in Klimaten, wo diese Stimmung der Atmosphäre vorherrschend ist, auch endemisch beobachtet, wovon Siebold*) mehrere Beyspiele angeführt hat.

*) Handbuch der Frauenzimmerkrankheiten. Thl. I. S. 454.

§. 383.

Aetiologie. Das Wesen oder die nächste Ursach der Leukorrhöe ist eine im Mißverhältniß zur allgemeinen Reproduction gesteigerte secernirende Thätigkeit in den Schleimhäuten der Geschlechtstheile. Die Schleimhäute überhaupt aber bilden ein auf den niedrigsten Stufen der Organisation verharrendes System, sie sind am meisten entwickelt und selbst über die gesammte äußere Körperfläche verbreitet, wo der Organismus am unvollkommensten ist, wie in den niedrigern Thiergattungen, und werden erst bey vollkommnerer Ausbildung auf das Innere und auf einzelne niedrigere Organe zurückgedrängt, einen Gegensatz bildend zu den höhern Thätigkeiten des Körpers. Eben daher kann nun die krankhaft gesteigerte Absonderung der Schleimhäute überhaupt, und insbesondere der Geschlechtstheile, vorzüglich auf doppeltem Wege entstehen; erstens, indem die höhern Systeme überhaupt, vorzüglich aber Spannkraft und Muskularthätigkeit, entweder an und für sich, oder nur relativ geschwächt erscheinen, und somit theils wuchernde allgemeine Reproduction, und in Folge deren übermäßige Ausscheidung in den Schleimhäuten bedingt wird, theils auch ohne abnorm erhöhte allgemeine reproduktive Thätigkeit bloß örtlich die wuchernde Thätigkeit der Schleimhäute, im Gegensatz der gesunkenen Irritabilität, hervortritt. — Zweytens, indem bey normalem Stande der Muskularthätigkeit (Irritabilität) und Reproduction, durch örtliche gewaltsame Aufregung eine abnorm vermehrte Ausscheidung der Schleimhäute Statt findet.

§. 384.

Wenn wir also bemerken, daß, wenn auch oft verbunden mit allgemeiner Schwäche, doch eigentlich der nächste Grund dieses Schleimflusses erhöhte ausscheidende Thätigkeit ist, so ergiebt sich hieraus, wie irrig es sey, wenn die meisten neuern medicinischen Schriften hierbey nur Asthenie sahen und dem zu Folge jedem Schleimfluß dieser Art mit stärkenden innern und äußern Mitteln zu begegnen riethen, welche

Ansicht gewiß nur zum Nachtheil der Kranken lange Zeit verfolgt wurde, gegen welche wir uns daher gleich im Eingange verwahren wollten, verhoffend, daß die oben angestellten Betrachtungen über nächsten Grund solcher Krankheitserscheinungen noch bey Erwägung der entfernten Ursachen sich immer mehr bestätigen werden. Zu diesen rechnen wir aber zuvörderst die Constitution. Gerade schwammige, phlegmatische Naturen aber, bey welchen im Allgemeinen schon die höhern Thätigkeiten unter der Last einer wuchernden Reproduction darnieder liegen, zeigen vorzügliche Disposition zur Leukorrhöe, und die Krankheit bildet sich um so leichter aus, je mehr die Sensibilität und Contraktilität der Geschlechtsorgane durch häufige Erregungen ihrer Reproduction, öftere Schwangerschaften, ausschweifende Lebensart, erlittene Blutflüsse u. s. w. niedergedrückt, oder auch, was die Sensibilität betrifft, theils durch ähnliche Einflüsse, theils durch Mißbrauch erhitzender Getränke und Speisen krankhaft erhöht ist. Eben so muß zu diesen Ursachen gezählt werden alles, was die Entwickelung einer solchen atonischen Constitution befördert, als üppige, unthätige Lebensweise, Aufenthalt in feuchter, warmer Luft u. s. w.

§. 385.

Durch örtliche Erregung des Geschlechtssystems entsteht ferner der weiße Fluß zuweilen bey jungen Mädchen in Folge der thätigern Reproduction dieses Systems in den Jahren eintretender Pubertät, ferner in der Schwangerschaft selbst; eben so, wo in Folge anderer Krankheitszustände, z. B. verhärteter Unterleibsdrüsen, Obstructionen größerer Eingeweide u. s. w., oder in Folge von Metastasen rheumatischer, exanthematischer und gichtischer Krankheitsstoffe, Congestionen gegen die Uteringefäße sich bilden, oder durch Mißbrauch drastischer Abführmittel, treibender, zur Wiederherstellung der Menstruation angewandter Arzneyen; durch schwerverdauliche, oder die Schleimhäute besonders anregende, gesalzene, eyweißstoffreiche Speisen (z. B. Fische, Krebse) verursacht werden. Ferner gehört hierher die Ansteckung selbst, oder auch, ohne dieselbe der zu

häufige Geschlechtsgenuß und die Onanie. Außerdem fremde Körper, als Pessarien, Polypen, reizende Injectionen, warme Bäder, Kohlenhäfen. Außerdem entsteht er leicht bey Reizungen benachbarter Organe, Steinen in den Harnwegen, Würmern; vorzüglich leicht endlich bey Verletzungen der Geburtstheile selbst, nach Einrissen des Mittelfleisches, Scheidenvorfällen und starken Einrissen des Muttermundes.

§. 386.

Uebrigens ist auch noch zu gedenken, daß der weiße Fluß, so leicht auch im Allgemeinen seine Erkenntniß ist, doch, wie schon Astruc bemerkt, vorzüglich unter zweyerley Umständen, Aehnlichkeit mit andern Krankheiten gewinnt, nämlich entweder, wo er ganz neu entstanden, oder wo er bereits inveterirt und dadurch die Qualität des Abflusses geändert ist. In beiden Fällen jedoch, vorzüglich im letztern, könnte er wohl mit einem Geschwüre am oder im Uterus verwechselt werden; allein die genaue Berücksichtigung der vorhergegangenen Zustände, Mangel stattgehabter Entzündung und Abwesenheit eines Fiebers, führen bald zur richtigen Erkenntniß. Auf ähnliche Weise, vorzüglich aber durch Abwesenheit der dieser Krankheit eigenen, unten zu beschreibenden Symptome, unterscheidet er sich von Skirrhus und Krebs, so wie durch den Mangel des regelmäßigen Typus von der mißfarbigen Menstruation, durch Berücksichtigung vorhergegangener Ereignisse vom Wochenflusse u. s. w.

§. 387.

Ueber Verlauf, Folgen und Prognose der Leukorrhöe haben wir zu bemerken, daß sie namentlich verschieden sind nach der Constitution der Kranken, nach der größern oder geringern Heftigkeit schädlicher Einwirkungen, und vorzüglich nach der Dauer, so daß dann vorzüglich, wenn die Krankheit als Folge unheilbarer Verbildungen der Geburtstheile, starker Gebärmutter- oder Scheidenvorfälle u. s. w. eingetreten ist und bey allgemeiner schwächlicher Constitution bereits lange angehalten hat, die Prognose am übelsten ist und Excoriationen, Verhärtungen und mancherley, nicht selten bey

Sectionen solcher Kranken bemerkte Ausartungen der innern Geburtstheile, Unfruchtbarkeit, allgemeine Abzehrung, Wassersucht u. s. w. am leichtesten herbeygeführt werden. Am günstigsten ist dagegen die Prognose, wo der weiße Fluß in Folge der starken Produktivität in den Entwickelungsjahren oder bey der Schwangerschaft eintritt, indem er hier gewöhnlich bald wieder und unter der Anwendung bloßer diätetischer Mittel sich verliert. — Besondere Erwähnung verdient es endlich, daß bey der Leukorrhöe eben so, fast wie bey der Menstruation, eine plötzliche Hemmung (Unterdrückung) Statt finden kann, welche dann oft ähnliche Zufälle, wie die Hemmung der Menstruation, Kopfschmerz, Kreuzschmerz, Fieber, Krämpfe, Durchfälle, Hämorrhoiden u. s. w. veranlaßt, sobald diese krankhafte Absonderung bereits dem Körper zur Gewohnheit geworden ist.

§. 388.

Wir kommen nun zur Behandlung der Leukorrhöe. Auch hier hat der einseitige Brownianismus, indem er bey dieser Krankheit, wie schon oben erwähnt, nichts als Schwäche im Sinne hatte, sich oft von hinlänglicher Berücksichtigung der wahren Natur der Krankheit und somit auch von der Wahl eines zweckmäßigen Heilverfahrens entfernt. Ein solches kann aber, da wir in obigem die sehr verschiedene Entwicklungsart der Krankheit verfolgt haben, ebenfalls für die einzelnen Fälle nur ein verschiedenes seyn. — Zuerst also von derjenigen Leukorrhöe, welche durch eine im Uebermaaß thätige Reproduction bewirkt wird. Hierbey kommen zwey Fälle in Betrachtung: entweder nämlich ist die Reproduction im Allgemeinen gesteigert und Mißverhältniß zur Irritabilität entstanden, oder es ist bey normalem Allgemeinbefinden die Produktivität der Schleimhäute abnorm erhöht. In beiden Fällen wird Beschränkung abnormer Produktivität erste Indication der Behandlung. Man erreicht dieses im erstern Falle zuvörderst durch zweckmäßige Regulirung täglicher Lebensordnung, durch hinlängliche Bewegung, durch Entziehung stark nährender Getränke und Speisen, Untersagung zu langen Schlafens,

Aufenthalt in mehr kühler Luft, Schlafen auf Matratzen und sorgfältige Vermeidung von allem, was Congestionen nach den Geschlechtsorganen veranlaßt, oder die Sensibilität derselben erhöht. Ferner durch strenge Sorgfalt für Reinhaltung der Geburtstheile, öfteres Waschen derselben mit mäßig kaltem Wasser oder einem Aufgusse der Hb. serpilli, Absinthii u. s. w., und vorzüglich der allgemeinen Bäder und im Sommer des Flußbades. Drittens nimmt man auf den Zustand des Darmkanals besondere Rücksicht, sucht nicht nur gastrische Zustände, Würmer u. dgl. zu beseitigen, sondern ordnet auch außerdem zuweilen leichte Abführungen aus der Pulp. Tamarind., Manna, einem Infus. sennae u. s. w., doch ohne viele Mittelsalze, an. — Unter dieser Behandlung verliert sich der weiße Fluß übrigens gesunder Körper, wenn er in den Entwickelungsjahren oder bey angehender Schwangerschaft eintritt, gewöhnlich bald, obwohl der letztere oft schon hartnäckiger zu seyn und erst nach der Niederkunft zu weichen pflegt.

§. 389.

Was die Leukorrhöe von bloß örtlicher Erregung betrifft, so muß man wieder unterscheiden, ob dabey noch wirklich eine vermehrte arterielle Thätigkeit Statt findet, wie vorzüglich in dem ersten Stadium der Krankheit, bald nachdem die krankhaften Reize eingewirkt haben, der Fall zu seyn pflegt; oder ob diese vermehrte Reaction bereits aufgehört und dem Zustande der Atonie, der krankhaft fortwuchernden Ausscheidung, Platz gemacht hat. So lange das erstere der Fall ist, wird wieder theils das im vorigen Paragr. geschilderte allgemeine Verfahren angewendet werden müssen, theils auf Entfernung der vielleicht noch einwirkenden örtlichen Reize und Ableitungen dieser krankhaft erregten Thätigkeit durch vermehrte Erregung in andern Theilen Bedacht genommen werden müssen. Ist demnach Ansteckung die Folge, und hat man sich überzeugt, daß nicht etwa zugleich syphilitische Infektion Statt gehabt habe, so wird vorzüglich durch öftere Bäder, Auswaschungen oder auch vorsichtig gemachte Injectionen die Reini-

gung der Genitalien bewerkstelligt, und man kann sich hierbey zu den letztern Mitteln vorzüglich der durch Kalchwasser verdünnten Milch mit Nutzen bedienen; ganz kalte Bäder oder Waschungen hingegen sind, um nicht Metastasen nach andern Organen zu veranlassen, hierbey unzweckmäßig. Innerlich giebt man einige Abführungen, zu denen hier auch mit Nutzen das Calomel gebraucht werden kann, und läßt damit, wenn die Entzündungszufälle beträchtlicher sind, den Gebrauch von etwas Nitrum verbinden. Uebrigens schränkt man die Diät ein, empfiehlt kühlende Getränke, besonders Emulsionen, und sucht die Hautausdünstung zu befördern.

§. 390.

Hängt diese neuentstandene Leukorrhöe dagegen ab von skrophulösen Zuständen, Stöhrungen des Pfortaderkreislaufs, Wurmbeschwerden u. s. w., so muß das Hauptaugenmerk des Arztes darauf gerichtet seyn, diesen primären Krankheiten zu begegnen, und auch hier darf man dreist anscheinend schwächende, d. i. ausleerende Heilmethoden in Anwendung bringen, sobald jene Zustände es fordern; örtlich bleibt auch hier die Anwendung starker adstringirender, leicht gefährliche Suppressionen herbeyführender Mittel unzweckmäßig und schädlich, sondern nur das im vorigen Paragraph angezeigte Verfahren passend. Haben unterdrückte Menstruation oder plötzliche Hemmungen anderer Krankheiten, z. B. von Hautausschlägen, die Leukorrhöe veranlaßt, so ist im erstern Falle das oben (§. 208.) gelehrte Heilverfahren passend, im letztern durch Ableitungsmittel, z. B. Fontanelle, der Ursache zu begegnen. Auf ähnliche Weise ist zu verfahren, wenn andere gewohnte, nun plötzlich gehemmte Ausleerungen, z. B. unterdrückte Fußschweiße (welche durch reizende Fußbäder, trockne Friktionen u. s. w. wo möglich wieder hergestellt werden müssen), oder versetzte rheumatische und arthritische Stoffe (welche dann die ihrer Individualität angemessene Behandlung fordern) dieser krankhaften Aussonderung zum Grunde liegen. Eben so endlich sind mechanische Reize, Pessarien, Polypen, Vorfälle,

zu beseitigen; beträchtliche Einrisse des Mittelfleisches erfordern die blutige Nath u. s. w.

§. 391.

Ist dagegen die arterielle Reaction gegen die einwirkende Erregung bereits vorüber, ein atonischer Zustand eingetreten, wo eben in Folge der gesunkenen Lebensthätigkeit überhaupt diese niedere Thätigkeit der Schleimhäute übermäßig hervortritt, so kann dieses wieder entweder nur die Folge der geschwächten animalen höhern Lebensthätigkeit im gesammten Organismus, oder die Folge eines örtlichen Schwächezustandes seyn. — Das erstere pflegt der Fall zu seyn nach schweren akuten oder chronischen Krankheiten, bey ungesunder Lebensweise, in kalter feuchter Luft, bey schlechter Nahrung, deprimirenden Gemüthszuständen, ja die anfänglich vielleicht bloß örtlich erregte Leukorrhöe selbst wird bey längerer Dauer diese Schwäche zur Folge haben. — Hier gilt es nun wieder, die Ursachen aufzusuchen, welche einen Schwächezustand dieser Art zur Folge gehabt haben, sie sodann zu beseitigen und gleichzeitig den Gebrauch roborirender Mittel damit zu verbinden. Ist daher auf die Freiheit der ersten Ernährungswege die gehörige Rücksicht genommen, so sucht man die Verdauungskraft durch bittere Mittel, Extr. Centaurii min., Gentianae, Trifol. fibr., bey mehr torpiden Subjekten in Verbindung mit geistigen Mitteln, Elix. Viscerale Hoffm., TR. Cort. Aurant., Balsam. vit. Hoffm., allmählig zu heben, und wendet dann die China (vorzüglich in Pulverform) und späterhin das Eisen, vorzüglich in Form der (wo möglich an der Quelle zu trinkenden) eisenhaltigen Mineralwässer an. Ferner empfiehlt man eine nährende, leicht verdauliche Diät, den mäßigen Genuß eines guten alten Weins, Landluft, Aufheiterung des Gemüths und besonders den Gebrauch stärkender, vorzüglich eisenhaltiger Bäder.

§. 392.

Die Leukorrhöe, wegen örtlich gesunkener Lebensthätigkeit und dadurch profus gewordener Absonderung der Schleimhäute,

tritt allmählig immer bey längerer Dauer des Uebels ein, wenn auch vielleicht anfänglich gleichzeitig erhöhte arterielle Thätigkeit bemerkt wurde, und zwar erfolgt der Uebergang in diese Art des weißen Flusses um so leichter, je mehr im allgemeinen Befinden die höhern Reactionen geschwächt sind, je mehr das Temperament phlegmatisch ist, je übler die äussern Verhältnisse der Kranken sind und je weniger eine strenge Reinlichkeit von der Kranken beobachtet wird. — Außerdem, daß nun hier wieder gilt, was bereits von mehreren frühern Formen gesagt ist, nämlich, daß die Entfernung von mechanischen Reizen und unterhaltenden Ursachen der Secretion (z. B. andern Krankheiten, Indurationen, Geschwüren u. s. w.), ferner strenge Reinlichkeit und Vermeidung aller Einflüsse, wodurch (wie etwa von erhitzenden warmen Getränken, treibenden Mitteln und besonders vom Geschlechtsreize gilt) Congestionen nach den Genitalien erregt werden, besonders die Aufmerksamkeit des Arztes fordern, so ist es hier ferner nothwendig, zugleich Mittel anzuwenden, welche theils direkt, theils indirekt die Secretion zu beschränken im Stande sind.

§. 393.

Zu den direkt die Secretion vermindernden Mitteln darf wohl zuvörderst die strenge Herabsetzung aller Stoffaufnahme auf das möglichst kleinste Maaß gerechnet werden, wie es in der sogenannten Hungerkur in Anwendung gebracht wird; welche wir daher nicht anstehen, für einen tief eingewurzelten, vorzüglich etwa früherhin mit Syphilis complicirt gewesenen weißen Fluß als ein nicht zu übergehendes, und selbst wo die andern Mittel ohne Erfolg angewendet worden sind, noch Hülfe versprechendes Mittel zu empfehlen, vornehmlich dann, wenn die Lebensthätigkeit in der Gesammtheit des Organismus noch nicht zu tief herabgestimmt ist. Ferner gehören hierher die der Reproduction überhaupt entgegenwirkenden, vorzüglich der Klasse der mineralischen und metallischen Arzneystoffe angehörigen Mittel, welche ebenfalls vorzüglich bey sehr langwieriger Leukorrhöe und nachdem man die nö-

thige Rücksicht genommen hat darauf, daß nicht etwa eine zu plötzliche Hemmung Statt finde, in Anwendung zu ziehen sind. Man wählt dazu entweder das reine, oder nur mit wenig Milch versetzte Kalchwasser, die ebenfalls mit etwas Milch oder mit einer Abkochung der Mohnköpfe vermischte Aqua vegeto-min. Goulardi, die Aqua phagadaenica, die Auflösungen des Alaums, des Zink-, Eisen-, so wie des Kupfervitriols oder Bleyzuckers, ohngefähr zu einem Quentchen auf ein Pfund Flüssigkeit, oder, in besonders hartnäckigen Fällen, vorzüglich wo vielleicht früher syphilitische Complicationen vorhanden gewesen sind, den Mercurius sublimatus corros. zu 2 bis 4 Gran in derselben Quantität Flüssigkeit aufgelöst.

§. 394.

Alle diese Mittel werden entweder als Injektionen oder als Waschungen der äußern Genitalien (vorzüglich wenn die Leukorrhöe, obwohl dies selten der Fall ist, sich mehr auf die äußern Geschlechtstheile beschränkte) angewendet, oder können endlich auch mittelst eines befeuchteten Schwammes in die Vagina gebracht werden. Immer ist es hierbey zweckmäßig, vor Anwendung dieser Mittel die Geburtstheile von anhaftendem Schleime reinigen und abtrocknen zu lassen, dann diese Mittel, sey es nun durch langsame Injection oder durch den Schwamm, 10 Minuten bis eine Viertelstunde mit der absondernden Fläche in Berührung zu lassen und nach dieser Zeit abermals durch ein Bidetbad, oder durch laues Wasser und Schwamm eine Reinigung und Austrocknung vornehmen zu lassen. — Zu diesen Mitteln ist ferner auch die Anwendung der Kälte zu ziehen, obwohl sie, sey es nun als sehr kalte Einspritzung oder Waschung (in der letztern Form allerdings noch am ersten), wegen der oft anderweitig nachtheilig werdenden Wirkung nicht allgemein empfohlen werden kann. — Endlich gehören auch die kalten Bäder, so wie die mit adstringirenden Mitteln (z. B. Eisenvitriol zu 1 — 2 Loth) versetzten, hierher, bey welchen Mitteln sämmtlich die im vorigen Paragraph erwähnte Vorsicht nicht zu übergehen ist.

§. 395.

Als indirekt die Secretion vermindernde Mittel betrachten wir diejenigen, welche, indem sie örtlich die Lebensthätigkeit überhaupt und insbesondere Arteriellität und Muskelkraft erhöhen, antagonistisch die wuchernde Produktivität der Schleimhäute herabstimmen. Hierher gehört nun zwar schon die §. 391. erörterte allgemeine Behandlung, allein noch mehr die Anwendung tonischer Mittel auf die leidenden Organe selbst. Dahin sind aber zu zählen die Abkochungen der Eichen-, Ulmen- oder Weidenrinde, so wie der Galläpfel, die Aufgüsse der Hb. Serpilli, Absinthii, bey mehr torpiden Körpern vermischt mit flüchtig reizenden Stoffen, mit rothem Wein oder etwas Branntwein, bey sehr sensibeln Körpern mit einem Aufgusse der Valeriana, des Hyoscyamus, mit einigen Tropfen der TR. thebaica, und wieder entweder als Einspritzungen oder als Waschungen, oder endlich auch als allgemeine Bäder (Lohbäder, Bäder von natürlichen oder künstlichen Eisenwässern, oder von den genannten bittern Kräuteraufgüssen). Ferner sind hierher zu zählen das Tragen von Gürteln*) mit Eichenrinde und aromatischen Kräutern gefüllt, das Emplastrum aromaticum über die regio hypogastrica, die geistigen Einreibungen daselbst und besonders auch die trocknen Räucherungen der Geburtstheile mit Mastix oder Bernstein.

§. 396.

Wird nun der weiße Fluß auf die angegebene Weise stets seiner besondern Entstehungsweise angemessen behandelt, so wird es vorzüglich, wenn das Uebel noch neu ist, in vielen Fällen gelingen, die vollständige Heilung zu bewerkstelligen, wobey nur noch zu erinnern ist, daß auch, wenn der

*) Denen jedoch H. Wenzel (Krankh. d. Uterus S. 106.) die in die Vagina gelegten, mit Eichenrindenpulver gefüllten und wohl auch mit etwas rothem Wein angefeuchteten Säckchen überhaupt, und ganz vorzüglich beygleichzeitigen falschen Lagen des Uterus, vorzieht.

Ausfluß aufgehört hat, gewöhnlich noch eine beträchtliche Erschlaffung der Genitalien und Neigung zu Wiedererzeugung der Krankheit zurückbleibt, weßhalb dann insbesondre theils noch für längere Zeit die in Obigem vorgeschriebene Lebensordnung pünktlich zu befolgen bleibt, theils mehrere der genannten Mittel, und besonders bey geschwächten Körpern die China und der innere und äußere Gebrauch eisenhaltiger Wässer längere Zeit fortgesetzt werden muß. Das, was indeß die Heilung dieser Krankheit gewöhnlich am meisten erschwert, ist, daß die Kranken in der frühern Zeit des Uebels theils aus Schamhaftigkeit, theils aus Unachtsamkeit die Hülfe des Arztes aufzusuchen verabsäumen, daß derselbe daher gewöhnlich die krankhafte Absonderung bereits tief eingewurzelt findet, und endlich seine Anordnungen selbst zum großen Theil in diätetischen Vorschriften bestehen müssen, auf deren genaue Befolgung man sich oft sehr wenig verlassen darf.

§. 397.

Noch wäre denn auch davon zu sprechen, was dem Arzte dann zu berücksichtigen bleibe, wenn durch irgend eine gewaltsame Ursache eine plötzliche Unterdrückung dieser dem Körper vielleicht längere Zeit schon zur Gewohnheit gewordenen Absonderung entstanden wäre. — Im Ganzen werden hierbey wieder ziemlich dieselben Regeln, welche oben (§. 208.) für die Behandlung der unterdrückten Menstruation gegeben worden sind, Anwendung finden, und vorzüglich in den Fällen, wo die Leukorrhöe Folge einer im ganzen Organismus abnorm hervortretenden produktiven Kraft war, stellvertretende allgemeine Ausleerungen (Venäsektionen, Abführungen, Beförderung der Transpiration u. s. w.), so wie, wenn Unordnungen im Drüsensystem, Obstructionen u. s. w. eingetreten sind, die resolvirenden, bey hysterischen Zufällen hingegen die beruhigenden Mittel (Bäder, Ableitungen u. s. w.) Anwendung finden. Auch kann durch Injectionen aus aromatischen Aufgüssen, Rubefacientia an die Schenkelflächen, Dampfbäder, gelinde Diuretica und Purgantia etwas zur erneuten Vermehrung der Secretion gethan werden, obwohl man,

wenn sich durch eine vielleicht für einige Zeit unterhaltene anderweitige Absonderung (z. B. ein Fontanell) diese krankhafte Secretion ersetzen und dem Organismus endlich ganz unnöthig machen läßt, diese Gelegenheit ergreifen wird, um die radicale Heilung zu bewerkstelligen.

4.

Wassersucht der nicht schwangern Gebärmutter (Hydrometra).

§. 399.

Theils in den zeugungsfähigen Jahren, und zwar vorzüglich bey Frauen, welche mehrere Male geboren haben, theils aber auch noch im spätern Alter und bey erlöschender Geschlechtsthätigkeit bilden sich zuweilen Wasseransammlungen in der Gebärmutter, welche man, je nachdem der Ort ist, an welchem die Anhäufung geschieht, in die Wassersucht der Gebärmutterhöhle, wenn das Wasser frey in der letztern stagnirt (Hydrometra ascitica), in die Wassersucht der Gebärmuttersubstanz (Hydrometra oedematosa), wo das Wasser das schwammige Gewebe der Gebärmutterwände erfüllt, und in Blasenwassersucht der Gebärmutter (Hydrometra hydatica) abtheilt. Bey der letztern Form ist das Wasser in kleinern oder größern Blasen eingeschlossen, und es wird sonach durch diese, hier wie an andern Theilen des Körpers, und zwar ohne Zeugung entstehenden Aftergebilde ein wahrer Uebergang hergestellt zu den durch Zeugung entstehenden falschen Früchten oder Molen, besonders den sogenannten Traubenmolen, von welchen im zweyten Theile die Rede seyn wird.*)

*) Daß aber Hydrometra hydatica nicht etwa bloße Molenschwangerschaft sey, beweisen die von Dreßig (Handb. d. Pathologie der chron. Krankh. Bd. 2. S. 484.) gesammelten Beyspiele derselben in Jungfrauen und bejahrten Frauen.

§. 400.

Die Wassersucht des Uterus ist aber eine ihrer Erkenntniß nach besonders schwierige Krankheit, welche theils mit Wassersucht der Bauchhöhle, Wassersucht der Ovarien, theils und zwar vorzüglich leicht mit wirklicher oder Molenschwangerschaft verwechselt werden kann, ja endlich (wie wir bey Betrachtung der Krankheiten der Schwangern finden werden) am allerschwersten auszumitteln ist, wenn sie zugleich mit wahrhafter Schwangerschaft vorkommt, weshalb denn ihre Diagnose eine ganz besondere Berücksichtigung erfordert. Kennzeichen derselben sind aber zu entnehmen aus folgenden Momenten: 1) allgemeine Körperconstitution und besondere vorausgegangene Krankheitsursachen oder sonstige schädliche Einflüsse. Vorzüglich diejenige Körperbildung also, welche überhaupt zu Wasseransammlungen disponirt, d. i. phlegmatischer, schwammiger Habitus, die spätern Lebensjahre, bestimmte Ueberzeugung, daß Schwängerung nicht Statt gehabt haben könne (etwa wegen bereits erloschenem Zeugungsvermögen); ferner vorausgegangene, nicht zur reinen Entscheidung gediehene Gebärmutterentzündung, unterdrückte Menstruation und Leukorrhöe. 2) Eintretende Geschwulst des Unterleibes, wobey indeß die vergrößerte Gebärmutter durch die äußere Untersuchung als Ursache der Ausdehnung sich ausmitteln läßt, so daß jedoch das Anwachsen der Gebärmutter weniger regelmäßig (häufig schneller) als bey der Schwangerschaft erfolgt, die Ausdehnung selbst höchst selten den Umfang der hochschwangern Gebärmutter erreicht, auch wohl periodisch ab- und zunimmt. 3) Ein von Zeit zu Zeit sich einstellender Abfluß von Wasser aus den Geburtstheilen, welches entweder rein oder mit Schleim, Blut oder Blasen vermischt ist (das entschiedendste Zeichen). 4) Die geburtshülfliche Untersuchung zeigt den Muttermund und Mutterhals schlaff, schwammig, oder bey der Hydrometra oedematosa teigartig anzufühlen, welches, so wie die gewöhnlich sehr gesunkene Temperatur, oft auch an dem äußern Umfange der Geschwulst sich entdecken laßt. Der Muttermund selbst pflegt außer bey, und kurz nach dem Abgange des Wassers geschlossen zu seyn.

Endlich zeigt auch entweder die äußere Untersuchung, oder die innere, oder beide Arten gleichzeitig angestellt, eine Fluctuation im Uterus, jedoch natürlich nur in den Fällen, wo das Wasser wirklich frey in der Gebärmutterhöhle stagnirt.

§. 401.

Weniger charakteristisch sind die nachstehenden Zufälle: 1) Störungen der Verdauung, durch verlorne Eßlust, Ekel, Erbrechen, Verstopfungen, Blähungsbeschwerden, Unterleibsschmerzen verschiedener Art; 2) Gefühl von Druck und Schwere im Becken; 3) nach und nach sich mindernder Abgang des Urins, welcher von trüber, molkiger Beschaffenheit ist, und bey beträchtlicher Vergrößerung der Gebärmutter oft auch in seiner Entleerung Schwierigkeit findet, da hingegen die übrigen Begleiter der Wassersuchten, als namentlich sehr vermehrter Durst, hier entweder ganz mangeln oder in weit geringerm Grade vorhanden sind. 4) Vorfälle der Mutterscheide oder der Gebärmutter selbst, als Folge der Atonie des Geschlechtssystems. 5) Oedematöser Zustand der äußern Geburtstheile und der untern Extremitäten; 6) schleichendes Fieber. — Es ergiebt sich demnach aus dem Vorhergehenden schon, wenn man es zusammenhält mit der im zweyten Theile zu gebenden Geschichte der natürlichen Schwangerschaft, wodurch diese Krankheit namentlich von der letztern sich unterscheiden lasse; indeß ist doch hier noch insbesondere zu bemerken, daß vorzüglich die kürzere Dauer der Wasseranhäufung (welche selten sechs Monate übersteigt), ganz besonders aber der Mangel aller fühlbaren Kindestheile oder Kindesbewegungen und der von Zeit zu Zeit Statt findende Wasserabgang, in Verbindung mit dem allgemeinen Uebelbefinden, zu diesem Endzweck berücksichtigt zu werden verdienen.

§. 402.

Aetiologie. Wie eine jede andere Wasseranhäufung kann die Gebärmutterwassersucht nur durch vermehrte Ausschei-

dung, oder durch verminderte Aufsaugung, oder durch beide Momente gleichzeitig ihrem Wesen nach begründet werden; betrachtet man indeß die Natur der Krankheit näher, so muß man wohl geneigt werden, sie vorzüglich in die vermehrte Ausscheidung zu setzen, eines Theils, weil eine gewisse Erregung des Organs schon erforderlich ist, um die Verschließung des Muttermundes (ohngefähr wie bey der Schwangerschaft) zu bewirken, ohne welche die Ansammlung überhaupt nicht Statt finden würde; andern Theils, weil wir sie vorzüglich häufig nach Einflüssen entstehen sehen, welche offenbar eine vermehrte Erregung der Uteringefäße bedingen, wie dieses sich noch näher bey Betrachtung der entfernten Ursachen ergeben wird. Hierhin gehören aber 1) die §. 400. erwähnte allgemeine Körperbildung; 2) vorausgegangene Gebärmutterentzündung; 3) Verbildungen derselben, als Eiterungen, Indurationen, Auswüchse; 4) hoher Grad von Atonie des gesammten Geschlechtssystems in Folge vorausgegangener Blutungen, Fehlgeburten, langwieriger Lenkorrhöe, häufig nach einander kommender Wochenbetten, sitzender Lebensweise, schlechter Kost, deprimirender Affekte, sehr warmer oder kalter feuchter Luft u. s. w.; 5) häufig einwirkender Geschlechtsreiz ohne wirklich erregte Schwangerschaft, oder wohl selbst bey bereits erloschener Zeugungsfähigkeit, und eben so bey disponirten Subjekten alles, wodurch Congestionen nach den Geschlechtsorganen veranlaßt werden, als geistige Getränke, erhitzende Speisen, treibende Mittel u. s. w.; 6) können auch Geschwülste benachbarter Organe durch ihren Druck die Resorption stören und Wasseranhäufungen herbeyführen, oder Verwachsungen des Muttermundes nach vorausgegangenen schwierigen Geburten, Verschließungen desselben durch Nachgeburtsreste, Schleimpfröpfe und coagulirtes Blut die Anhäufung von Flüssigkeiten innerhalb der Gebärmutterhöhle begünstigen.

§. 403.

Ausgänge und Folgen der Gebärmutterwassersucht nebst der daraus sich ergebenden Pro-

gnose. Gewöhnlich nimmt die Wassersucht der Gebärmutter einen dem Leben weit weniger gefährlichen Gang, als die übrigen Wassersuchten. Größtentheils entscheidet sie sich nämlich durch die Heilkräfte der Natur mittelst des Abflusses durch die Mutterscheide, obwohl die Anhäufung auch zuweilen von neuem sich bildete. Die Ursachen dieser Entleerung sind entweder wahre eintretende Contractionen des Uterus, oder auch wohl äußere mechanische Einflüsse, wie z. B. von Dreißig*) ein Fall mit angeführt wird, wo nach einem Sturz auf den Leib das Abfließen von Wasser erfolgte. Nach dem Abflusse selbst bleibt zwar gewöhnlich noch eine beträchtliche Erschlaffung der Geburtstheile längere Zeit zurück, so daß man zuweilen nachfolgende passive Blutungen entstehen, oder auch wohl Neigung zu Luftentwicklung im Uterus, und zu Gebärmutterblähungen gegeben sieht; ja selbst allgemeine und zwar die beträchtlichsten Abspannungen sah man nach diesen Entleerungen eintreten und Ohnmachten oder wohl gar den Tod veranlassen. Endlich hat man wohl auch Beyspiele von ungewöhnlichen Wegen der Wasserentleerung, wie durch Geschwüre, und zwar selbst durch die Bauchbedeckungen und durch verstärkt eintretende anderweitige Absonderungen, z. B. durch vermehrten Harnabgang, Schweiß, ja selbst durch Speichelfluß.

§. 404.

Wenn daher auch im Allgemeinen die Prognose nicht sehr ungünstig zu nennen ist, so muß sie doch besonders auf folgende Momente Rücksicht nehmen: 1) auf die gesammte Constitution, je weniger schlaff und phlegmatisch dieselbe ist, um so leichter und vollkommner ist die Heilung durch freywillige Entleerung zu erwarten; 2) auf die Dauer der Krankheit, je länger dieselbe ist, je öfter sich das Wasser von neuem angesammelt hat, um so schwieriger wird die gänzliche Genesung zu bewirken seyn; 3) auf die veranlassenden Ursachen,

*) Pathologie d. chron. Krankh. Thl. 2. S. 496.

je mehr wirkliche organische Verbildungen im Spiel sind, je mehr durch deren Druck die Aufsaugung gehindert, oder der Weg zur freywilligen Entleerung gehemmt ist, um so ungünstiger muß die Vorhersagung werden.

§. 405.

Die Behandlung der Gebärmutterwassersucht muß zunächst auf Entleerung des angesammelten Wassers gerichtet seyn. In den Fällen sonach, wo aus den oben erwähnten Zeichen mit Zuverlässigkeit die Natur der Krankheit, und zugleich das nicht etwa gleichzeitige Vorhandenseyn wirklicher Schwangerschaft erkannt worden ist; ferner da, wo das Wasser wirklich in der Gebärmutterhöhle stagnirt, sich dort durch Fluktuation zu erkennen giebt (wenn im Gegentheil der ödematöse Zustand des Uterus durch das teigartige Gefühl an seinen Wänden sich auszeichnet), wird die Entleerung durch den Muttermund zu befördern seyn. Es geschieht dies, wo keine Verwachsung Statt findet, am besten durch die Einführung einer geknöpften Sonde, entweder frey oder in einer Trockarröhre verborgen; wo hingegen der Muttermund verwachsen gefunden würde, durch Einbringung eines dünnen, etwas gebogenen und hinlänglich langen Trockars. Gleichzeitig sucht man hierbey die Zusammenziehung des Fruchthälters durch äußere und innere Mittel, als Einreibungen von Naphtha, Lin. vol., durch einige Gaben der Zimmttinktur u. s. w. zu befördern, läßt nach der Entleerung eine Bauchbinde mäßig fest um den Unterleib legen, und schreitet dann zur Anwendung der sonst indicirten innern Mittel, welche übrigens bey der Hydrometra oedematosa als die einzigen Hülfsmittel benutzt werden können.

§. 406.

Die innere Behandlung hat aber hierbey einen dreyfachen Zweck: 1) den Ursachen dieser Wasseranhäufung zu begegnen; 2) dem Abgange des Wassers, wenn er durch den Muttermund nicht Statt finden kann, andere Wege, durch Vermehrung sonstiger Excretionen, anzuweisen; 3) der er-

neuerten Wasseranhäufung durch Verbesserung der allgemeinen Constitution Schranken zu setzen. — Was das erstere betrifft, so wird die Behandlung nach den Umständen verschieden seyn, bey den schnell, etwa nach vorausgegangener Entzündung, oder in Folge von Congestionen sich bildenden Wasseransammlungen sind kühlende Abführmittel, säuerliche, verdünnende, den Harnabgang befördernde Getränke, Beförderung der Hautausdünstung durch Liq. Mindereri, Fliederblumen-Aufguß, trockne Frictionen angezeigt; sind dabey selbst Spuren noch andauernder chronischer Entzündung vorhanden, so muß damit das oben für diese Krankheitsform beschriebene Heilverfahren verbunden werden (s. §. 345. u. 348.). Sind dagegen krankhafte Zustände des lymphatischen Systems, Drüsenanschwellungen, Scirrhus uteri, unterdrückte chronische Hautausschläge, Reste unvollkommen geheilter Syphilis u. s. w. im Spiel, so müssen diese Krankheiten ihrer Natur gemäß behandelt, Antimonialien, resolvirende und ausleerende Mittel zu Hülfe genommen, oder das Queckfilber in Anwendung gezogen werden.

§. 407.

2) Zur mittelbaren Ausleerung des Wassers durch vermehrte anderweitige Absonderung sind ferner, wie bey andern Wassersuchten, die Diuretica, als Squilla, Senega, Digitalis, Abkochungen der Wacholderbeeren u. s. w. nützlich, verbunden nöthigen Falls mit reizenden Einreibungen und Epispasticis. 3) Der Rücksicht auf die Constitution wird Genüge geleistet durch zweckmäßige Anordnung der äußern Verhältnisse, Aufenthalt der Kranken in reiner Luft, Sorge für Herstellung einer guten Verdauung, ferner (nach bewirkter Entleerung des Uterus) durch Anwendung der bittern Extrakte, der China, der eisenhaltigen Mineralwässer und des Eisens in Substanz, durch Anordnung einer zweckmäßigen, leicht verdaulichen, nahrhaften Diät, den Genuß eines guten alten Weins, und wo insbesondre im Geschlechtssystem ein hoher Grad von Atonie zurückgeblieben ist, durch die Anwendung örtlicher roborirender Mittel, der tonischen Bidetbäder, der gei-

ſtigen Einreibungen in die Regio hypogastrica, der Kräutergürtel u. ſ. w.

5.

Von den verſchiedenen ſpeckigen, fleiſchigen oder knöchernen Ausartungen der nicht ſchwangern Gebärmutter.

(Steatoma, Sarcoma, Osteosteatoma uteri, Lithometra.)

§. 408.

Wenn an und für ſich ſchon der weibliche Körper durch vorherrſchende Produktivität ausgezeichnet iſt, ſo gilt dies doch in ganz vorzüglichem Grade von den weiblichen Geſchlechtsorganen und namentlich vom Uterus. Durchaus kein Organ im menſchlichen Körper, außer dieſem, beſitzt die Fähigkeit, ſich zu gewiſſer Zeit auf das zehn- bis zwölf- und mehrfache ſeiner Maße durch wirkliche Anwachſung zu vergrößern, und wieder auf den frühern Standpunkt zurückzukehren; nur die Ovarien, als die eigentlichen Heerde neuer Bildungen, ſind ihm der Produktivität nach vergleichbar. Dies äußert ſich nun auch in pathologiſcher Hinſicht, und die weiblichen Geſchlechtsorgane, vorzüglich aber der Uterus, werden zum Sitze für die mannichfaltigſten Desorganiſationen, ſowohl der Form als Miſchung nach; Ausartungen, welche ihrer Entſtehung, Erkenntniß und Folgen nach beſonders merkwürdig ſind, wenn ſie auch großentheils der heilenden Kunſt nur wenig Feld verſtatten.

§. 409.

Dieſe Ausartungen ſind nun ſowohl dem Umfange, als dem Sitze und der Subſtanz nach ſehr vielen Verſchiedenheiten unterworfen. In letzterer Hinſicht unterſcheidet man die ſpeckigen Auswüchſe (Steatomata), welche oft auch weichere

Massen, ja helle oder trübe Flüssigkeit in sich enthalten, ferner die seltner vorkommenden, mehr derben fleischartigen Massen (Sarcomata), und endlich die wahren Verknöcherungen oder Ablagerungen erdiger Massen an einzelnen Stellen des Uterus (Osteosteatomata), oder im ganzen Umfange des Organs (Lithometra). Ihrem Sitze nach betreffen sie entweder die obere oder untere, die vordere, hintere oder die Seitengegend des Uterus, die innere oder äußere Fläche, oder das eigentliche Parenchyma desselben. Der Umfang ist gleichfalls sehr verschieden; man findet sie von der Größe einer Hasel- oder welschen Nuß, bis zu solcher Masse, daß dadurch das Gewicht des nicht schwangern Uterus bis zu 40, ja wie H. Otto*) ein Beyspiel anführt, bis zu 40, ja 80 Pfund anwuchs. Der kleinern sind dann nicht selten mehrere vorhanden. Auch von den Verknöcherungen dieses Organs sind äußerst beträchtliche Fälle bekannt geworden. In einem derselben wog der verknöcherte Uterus $5\frac{1}{2}$ Pfund, und es wurden zwey Stunden zum Durchsägen der sehr festen Knochenmasse gebraucht.**)

Anmerkung. Was die Geschwülste und namentlich die Knochenmassen oder Steine betrifft, welche innerhalb der Gebärmutterhöhle gefunden werden, so gehören sie nicht hierher, indem sie als degenerirte Früchte anzusehen und daher unter den abnormen Schwangerschaften zu betrachten sind.

§. 410.

Die Erkenntniß dieser verschiedenen Ausartungen der Gebärmuttersubstanz ist oft mit den bedeutendsten Schwierigkeiten verbunden, zuweilen wird sie, da die Störungen des allgemeinen Wohlbefindens durch dieselben oft sehr gering sind, ein Arzt daher nicht leicht um Rath gefragt wird, gar nicht

*) Handbuch der pathol. Anat. S. 364 u. 365. vgl. auch F. Meckel Handb. d. patholog. Anat. Bd. 2. Thl. 2. S. 242 u. folg.

**) S. allgem. medicin. Annal. 1814. Annal. d. Heilkunst. S. 555.

zu erlangen versucht; zuweilen kann sie auch wohl bey einem Sitze solcher Geschwülste an der obern Gegend der Rückseite des Uterus unmöglich bleiben; auf alle Weise ist jedoch Hrn. Wenzel*) beyzustimmen, wenn er sagt, daß beym Leben der Kranken in der Mehrzahl der Fälle das Uebel verkannt worden sey. — Die Zustände, mit welchen diese Degenerationen vorzüglich verwechselt zu werden pflegen, sind aber, theils bey sehr beträchtlichem Umfange, die Schwangerschaft, worüber ein Beyspiel von H. v. Siebold **) angeführt ist, theils falsche Lagen der Gebärmutter, wie dies in einem Falle angenommen worden war, wo man früher die Zurückbeugung des im zweyten oder dritten Monat schwangern Uterus vermuthet hatte, bis ich bey meiner Untersuchung es als ein an der hintern Gebärmutterfläche (ein Ort, wo mir diese Mißbildungen schon mehrere Male aufgestoßen sind) sitzendes Steatom erkannte.

§. 411.

In wiefern nun aber diese Geschwülste selten von entzündlichen Zuständen bedingt werden, so geben sie sich auch namentlich im Beginn durch Störungen im Geschlechtssysteme fast gar nicht zu erkennen, sondern müssen oft eher durch Beeinträchtigung in den Verrichtungen benachbarter Organe wahrgenommen werden; überhaupt aber fallen ihre Kennzeichen theils in die Perceptionssphäre der Kranken und sprechen sich durch gewisse Krankheitsgefühle aus, theils sind sie aus der innern und äußern geburtshülflichen Untersuchung zu entlehnen. Die letztern sind vorzüglich wichtig und eigentlich allein im Stande, eine genaue Diagnose festzusetzen, indeß allerdings deutlich nur vorhanden, wenn das Uebel schon ziemlich vorgeschritten ist. — Zu den erstern Zeichen gehören Gefühl von Druck, Vollheit, Schwere im Becken, Schmerzen, welche sich auf die untern Extremitäten, Harnwerkzeuge

*) Ueber die Krankheiten des Uterus S. 67.

**) Handb. d. Frauenzimmerkrankh. Bd. I. S. 535.

und den Mastdarm fortpflanzen; ferner bey beträchtlicher Anschwellung des Uterus, Hemmungen in Stuhl- und Harnausleerungen, nach und nach eintretende Verdauungsleiden, kachektisches Ansehen, Wasseransammlungen in der Bauchhöhle und ödematöse Geschwulst der Füße. Endlich vorzüglich Störungen der Geschlechtsverrichtungen, unordentliche, zu starke und häufige, oder zu schwache und seltene Menstruation, Leukorrhöe, und in höherm Grade des Uebels Unfruchtbarkeit, obwohl bey kleinerm Umfange der Geschwülste Schwängerung sehr wohl eintreten kann, jedoch Schwangerschaften eines steatomatösen Uterus oft durch Fehlgeburten unterbrochen werden, überhaupt aber die Diagnose dann durch gleichzeitige Schwangerschaft ausnehmend erschwert wird.

§. 412.

Die geburtshülfliche Untersuchung gewährt folgende Merkmale: 1) die Brüste zeigen sich zuweilen ungleich angeschwollen und schmerzhaft; 2) der Unterleib ist nach der Größe der Geschwülste bald mehr, bald weniger ausgedehnt, namentlich ist jedoch die Härte über dem Schambogen oft wie bey einer Wöchnerin am vierten oder sechsten Tage nach der Entbindung charakteristisch, und wird als Uterus, namentlich durch gleichzeitig vorgenommene innere Untersuchung, erkannt und von andern krankhaften Geschwülsten der Bauchhöhle unterschieden. 3) Die innere Untersuchung durch die Vagina zeigt den Mutterhals und Muttermund gewöhnlich etwas geschwollen, übrigens aber, wenn das Aftergebilde höher sitzt, im natürlichen Zustande, allein ihrer Lage nach verändert. So fand ich sie bey steatomatösen Auswüchsen an der Rückseite des Fruchthälters hochstehend und ganz gegen den Schambogen gepreßt; so ist sie mitunter nach der dem Sitze der Geschwulst gleichnamigen Seite, zuweilen auch stark nach rückwärts gedrängt und schwer zu erreichen. Ist jedoch die ganze Gebärmuttersubstanz degenerirt, so zeigt auch die Vaginalportion beträchtliche Abweichungen, fühlt sich höckerig, vergrößert, verhärtet an.

§. 413.

Die Auswüchse selbst, wenn sie mehr dem mittlern und obern Theile des Uterus angehören, werden vorzüglich durch das Vaginalgewölbe entdeckt, durch welches sie als ungleiche, schwammige, bald größere, bald kleinere Massen in die Beckenhöhle hereinragen und oft dieselbe zum großen Theil ausfüllen, zum Theil auf ähnliche Weise, wie dies bey Schwangern in der letzten Zeit der Schwangerschaft durch vorliegende größere Kindestheile zu geschehen pflegt. Daß man nun aber diese Geschwülste nicht mit wirklichen Kindestheilen verwechsle, und überhaupt diesen pathologischen Zustand von dem physiologischen der Schwangerschaft unterscheide, dazu dient namentlich die Berücksichtigung des Ganges, welchen das Uebel nimmt und genommen hat, in wiefern es nur in Jahren sich ausbildet und nicht in der Regelmäßigkeit vorschreitet, wie die Schwangerschaft, ferner die Berücksichtigung des Alters und der sonstigen Lebensverhältnisse, indem diese Krankheiten oft erst in den Jahren bereits erloschener Zeugungsfähigkeit der Untersuchung des Arztes übergeben werden, und endlich die Beschaffenheit der Geschwulst selbst, indem theils die ungleiche schwammige Fläche sie von den Kindestheilen unterscheidet, theils das Verhältniß derselben zum Muttermunde charakteristisch ist, indem man theils erkennt, daß bey Einbringung der Fingerspitze in den Kanal des Mutterhalses der fremde Körper außerhalb dieser innern Räume liegt, theils die Lage und Ausdehnung desselben an sich schon schließen läßt, daß er nicht in dem innern Gebärmutterraume liegen könne.

§. 414.

4) Kann oft auch die Untersuchung durch den Mastdarm über diese Auswüchse besondern Aufschluß geben; ihr Umfang ist hier zuweilen vollkommner zu umgehen und die Art ihrer Textur sicherer auszumitteln. — Da übrigens auch bey dieser Art der Untersuchung die Verwechselung mit Rückwärtsbeugung des Uterus sehr wohl möglich ist, so ist auch über die Unterscheidung von dieser und ähnlichen falschen

Lagen, so wie von den krebsartigen Verhärtungen und dem Scheidenbruche (Colpocele) noch einiges zu erinnern. Von falschen Lagen, wo der Gebärmuttergrund in das Scheidengewölbe herabgesunken ist, unterscheidet man aber diese Geschwülste durch die Beachtung der Richtung des Mutterhalses (s. §. 412.) und vorzüglich des Kanales im Mutterhalse Wäre z. B. das Steatom an der Rückwand des Uterus, so wird, wenn es hoch ansitzt, der Mutterhals rückwärts, wenn es tief sitzt, gegen den Schambogen gepreßt seyn, und in letzterem Falle das ganze Verhalten der Zurückbeugung dem ersten Anscheine nach vollkommen gleichen; allein untersucht man genauer, so findet man den Gang des Mutterhalses, anstatt daß er bey zurückgebeugtem Uterus schräg rück- und abwärts steigen sollte, vielmehr, wie gewöhnlich, ziemlich senkrecht. — Von dem Skirrhus unterscheidet sich das Steatom durch seine beträchtlichere Größe und Hervorragung, und durch weit geringere oder ganz mangelnde Schmerzhaftigkeit. — Von dem Scheidenbruche endlich, wo ebenfalls oft eine weiche Geschwulst in das Scheidengewölbe hereinragt, unterscheiden sich diese Auswüchse durch größere Festigkeit und vorzüglich durch Unbeweglichkeit, da hingegen bey dem Scheidenbruche die Geschwulst bey einer horizontalen Lage der Kranken nach einem angebrachten Drucke leicht zurück weicht.

§. 415.

Ueber die eigentliche Entstehung dieser verschiedenen Ausartungen sind noch nähere Aufschlüsse, als bisherige Untersuchungen geliefert haben, zu wünschen, nur so viel scheint mit Sicherheit angenommen werden zu können, daß sie als Produkte eines örtlichen krankhaften Wachsthums überhaupt, und nicht etwa als bloße Produkte vorausgegangener Entzündung anzusehen sind, daß sie entstehen, indem von dem dem Uterus vielleicht im Uebermaaß zugeführten Blut und plastischen Stoff, rohe, wegen Mangel wahrer energischer Lebensthätigkeit nicht hinlänglich verarbeitete Massen sich ablagern, deren Substanz daher auch der Mischung nach unvollkommner bleibt (da der Mischung nach gewiß eben eine solche stufen-

weise Hervorbildung aus einem urſprünglichen Homogenen [aus Eyweißſtoff] Statt findet, als der Form nach), weshalb denn dieſe Ablagerung vorzüglich als eine zwiſchen geronnenem läſigtem Eyweißſtoff und Fett in der Mitte ſtehende Maſſe ſich darſtellt, in welcher in der Länge der Zeit oft auch Knochengebilde entſtehen,*) ja durch welche nach und nach die vollkommne Verknöcherung dieſes Organs zu Stande kommen kann.

§. 416.

Als entfernte Urſachen können zur Entſtehung dieſer krankhaften Metamorphoſen Einflüſſe ſehr verſchiedener Art wirken. Eines Theils giebt vorzüglich das höhere Lebensalter**) und ſchwammige, atoniſche, phlegmatiſche Conſtitution Veranlaſſung hierzu, indem gerade hier, wo der Einfluß des den Organismus zu geſetzmäßiger Einheit verbindenden Nervenſyſtems ſchwächer gefunden wird, ein zum Ganzen unverhältnißmäßiges und folglich abnormes Fortwachſen einzelner Theile am leichteſten Statt finden kann. Noch mehr wird der Körper indeß hierzu disponirt, wenn noch Krankheitsſtoffe, wie Syphilis, Gicht, unterdrückte Ausſchlagsſtoffe u. ſ. w. hinzutreten, und vorzüglich, wenn heftige oder wenigſtens anhaltende Erregungen des Geſchlechtsſyſtems hinzukommen. Wir rechnen hierzu Störungen der Menſtruation, wo bey gehemmter Blutergießung die Blutmaſſe im Parenchyma deſſelben ſich anhäuft, weshalb denn auch die Zeit, wo die Menſtruation wegen zunehmendem Alter verſchwindet, der Entſtehung ſowohl als weitern Ausbildung dieſer Geſchwülſte beſonders günſtig zu ſeyn pflegt, ja weßhalb namentlich die Ablagerungen von erdiger Maſſe (die Verknöcherungen) faſt nie eher, als im ſpätern Lebensalter zu Stande kommen. Ferner ſind hierher zu

*) Ueber die Entwickelung dieſer Geſchwülſte ſ. m. mehrere intereſſante Bemerkungen von Bayle (Journ. de Medicine an XI. Vendemaire) im Auszuge in d allgem. medicin. Annal. 1805. S. 806.

**) Bayle fand unter vielen Fällen keinen, wo das Uebel unter dem 36ſten Jahre ſich entwickelt hätte.

zählen die plötzlichen Hemmungen gewohnter Ausscheidungen der Geschlechtswege, die plötzliche Unterdrückung der Leukorrhöe. Eben so mechanische Schädlichkeiten, namentlich schwere, sowohl natürliche, als durch ein rohes Eingreifen ungeschickter Geburtshelfer oder Hebammen beendigte Geburten, Ausschweifungen in der physischen Liebe, aber auch (vorzüglich nach Bayle's Beobachtung häufig) die Ehelosigkeit, drückende Pessarien, treibende Arzneymittel, reizende Injectionen u. s. w.

§. 417.

Von dem Gange der Krankheit und der hieraus sich ergebenden Prognose. Der Gang der Krankheit ist in der Regel ein sehr langsamer; ich habe eine Person mit einem bedeutenden Steatom einige Jahre lang beobachtet, und immer nur eine sehr geringe Massenzunahme bemerkt; häufige Congestionen nach den Geschlechtstheilen können indeß wohl das Wachsthum beschleunigen. Die Beschwerden, welche sich diesen Ausartungen anknüpfen, sind vorzüglich nach der Ausdehnung der Geschwulst verschieden, daher auch gewöhnlich nur langsam sich steigernd, im Ganzen jedoch von der Art, wie sie §. 411. geschildert worden sind, von leichtem Druck und erschwertem Harnlassen oder Stuhlgange bis zur allgemeinen Wassersucht. — Was sonach die Prognose, und zwar zunächst rücksichtlich des Gefahrdrohenden der Zufälle, betrifft, so ist sie vorzüglich dem Grade und der Dauer des Uebels nach sehr verschieden. Bey geringerem Umfange werden oft selbst die Geschlechtsfunctionen so wenig gestört, daß Menstruation, Schwangerschaft und Geburt ohne bedeutende Hindernisse verlaufen können; späterhin leiden immer diese Functionen zunächst, Abortus und Unfruchtbarkeit treten ein, und Leiden der allgemeinen Reproduction folgen nach. Im Ganzen wird jedoch diese Steigerung des Uebels weniger zu fürchten seyn, wo alle fernere Einwirkung der im vorigen Paragraph genannten Ursachen sorgfältig vermieden wird, und dann bleibt zuweilen das Uebel zeitlebens auf einer Stufe, wo das allgemeine Wohlbefinden wenig beeinträchtigt wird, so wie im Gegentheil die lebensgefährlichen Folgen des Ue-

bels um so rascher eintreten können. Rücksichtlich der Heilbarkeit ist die Prognose stets mißlich, da vollkommene Rückbildungen in den Normalzustand fast nie gelingen, operative Kunsthülfe selten Statt finden kann, und selbst dem Fortschreiten des Uebels oft schwer Gränzen zu stellen sind.

§. 418.

Von der Behandlung dieser Degenerationen. Der Zweck dieser Behandlung ist theils vollkommene Beseitigung des Uebels, theils, wo diese nicht möglich, Verhütung der Fortschritte desselben und Milderung der durch dasselbe veranlaßten Beschwerden. — Die eigentliche Heilung nun ist zu erlangen durch Operation, oder durch Anwendung innerer und äußerer Arzneymittel. Die Operation ist nur möglich und rathsam, wenn die Geschwülste in der Gegend der Vaginalportion sitzen, oder der Uterus tief in das Becken herabgesunken ist; sie ist auf ähnliche Weise, wie an äußerer Körperfläche die Exstirpation von Balggeschwülsten bewerkstelligt wird, vorzunehmen, ja selbst die Exstirpation des gesammten Uterus kann hier unter gewissen Umständen, namentlich vollkommner Degeneration seiner Substanz, anwendbar werden, nach Art und Weise, von welcher bey Betrachtung skirrhöser und carcinomatöser Ausartung dieses Organs das Nähere bemerkt werden soll. Bey Geschwülsten, welche eine weiche, halbflüssige Masse enthalten, kann, wenn Fluctuation durch das Scheidengewölbe gefühlt wird, auch die bloße Eröffnung derselben, etwa durch das Osiander'sche Hysterotom*) (T. I. f. VII.), hinreichen, um nach Entleerung der Geschwulst unter sorgfältiger Erhaltung gutartiger Eiterung, mittelst öfterer Injection aromatischer Aufgüsse, der Auflösungen des Myrrhenextrakts, der innerlich gegebenen oder auch äußerlich benutzten China und zweckmäßiger, leicht verdaulicher, nahrhafter Diät die Heilung zu bewerkstelligen. Aehnliche Behand-

*) Zwey in einer Scheide bewegliche Messer (eins spitzig, eins abgerundet): s. Osiander's neuere Denkwürdigk. Bd. I. Heft 1.

lung wird indeß auch nach den übrigen Operationsweisen sich nöthig machen.

§. 419.

Die Heilung durch innere oder äußere Arzneymittel ist höchstens nur da zu erwarten, wo die Ursachen des Uebels in heilbaren allgemeinen Krankheitszuständen beruhen und der Grad des Uebels nur gering ist. Namentlich ist daher bey syphilitisch Gewesenen oder noch daran Erkrankten von den Merkurialien Gebrauch zu machen; bey gichtischen Krankheiten ist der Gebrauch warmer Mineralbäder zu empfehlen, und außerdem verdienen überhaupt noch diejenigen Mittel Anwendung, welche die örtlich abnorm gesteigerte Produktivität herabstimmen, wohin sonach der äußerliche Gebrauch der Sabina, des Kirschlorbeers, der Cicuta, namentlich im Aufguß als Injection, gerechnet werden muß. Außerdem ist darauf zu sehen, daß die allgemeine Produktivität gehoben und geregelt werde, wobey die Stimmung des Nervensystems vorzüglich in sofern Berücksichtigung verdient, als bey lebendiger und kräftiger Einwirkung desselben auch alle ähnliche Afterorganisationen um so weniger entstehen und um so leichter verschwinden können. Man empfiehlt daher Bewegung in freyer reiner Luft, fleißige Bäder, Erheiterung des Gemüths, mäßigen Gebrauch eines guten alten Weins, bey sorgfältiger Vermeidung von allem, was Verstopfungen und Congestionen nach den innern Genitalien erregen oder unterhalten könnte.

§. 420.

Ganz auf ähnliche Weise haben wir ferner zu verfahren, wo, obwohl die völlige Heilung den Umständen nach nicht mehr erwartet werden kann, es bloß darauf ankommt, das Fortschreiten des Uebels zu hindern, und es bleibt daher nur noch übrig, von der Milderung der unerläßlich mit größern Geschwülsten dieser Art verbundenen Beschwerden zu sprechen. Auch hier vermag indeß die Kunst nur wenig. Anordnung einer sehr mäßigen, durchaus nicht beschwerenden Diät, Vermeidung heftiger Anstrengungen und starken Pres-

sens beym Stuhlgange, wobey diese Geschwülste sich oft noch fester in das kleine Becken hereinsenken, von Zeit zu Zeit gereichte blande Abführmittel, dieses habe ich immer bey Kranken dieser Art am zweckmäßigsten gefunden, um ihre Leiden wenigstens in etwas zu mäßigen.

6.

Von den polypösen Auswüchsen an der innern Fläche der Gebärmutter.

§. 421.

Die Schleimhaut, welche die verschiedenen Gegenden des Fruchtganges (Fallopische Röhren, Uterus und Mutterscheide) überzieht, ist namentlich im Uterus ihrer Natur nach zu einem hohen Grade der Produktivität bestimmt,*) indem aus ihr sich die sogenannte Flockenhaut zur Befestigung der Frucht entwikkelt, ja bey vielen Säugethieren (namentlich den Wiederkäuern) die Kotyledonen aus ihr sich bilden, welche als vollkommen pilzförmige Erhabenheiten oft zollang an dünnern Stielen über die Gebärmutterfläche sich erheben. Es ist daher sehr natürlich, daß bey abnorm angeregter Bildungsthätigkeit dieser Organe, eben so wie in der gesammten Substanz, auch in dieser Haut Afterorganisationen entstehen, welche dann ihrer Form nach oft auffallende Aehnlichkeit mit jenen Kotyledonen haben und mit dem Namen der Polypen belegt werden.

§. 422.

Aeußeres und Inneres dieser Auswüchse zeigt vielfache Verschiedenheiten; gemeiniglich stellen sie sich in birnförmiger

*) Aehnliche Produktivität zeigen ja auch die Schleimhäute in andern Organen, z. B. der Nasenhöhlen und Rachenhöhle, ja selbst die Eingeweidewürmer des Darmkanals scheinen Erzeugungen seiner innern Fläche zu seyn.

Gestalt dar, mit dem dicken, abgerundeten Ende abwärts gerichtet, mit dem dünnern Stiele aufwärts aufsitzend; zuweilen sind sie auch mehr abgerundet, einem Apfel oder einer Zwiebel ähnlich und mit einer breitern Basis aufsitzend. Ihr Inneres ist aus schwammigem Zellgewebe gebildet, welches reichlich von Blut durchdrungen ist, dessen Eintritt man sich wohl aus den Venenzellen des Uterus, und zwar ohne besondere Gefäße, durch Gänge in diesem schwammigen Zellgewebe zu denken hat, welche Gänge öfters (wie ich an zwey beträchtlichen Polypen, so ich in meiner Sammlung bewahre, deutlich bemerken kann) an der Oberfläche durch Poren sich öffnen, woraus zum Theil das häufige Aussikern von Blut aus denselben zu erklären ist. — Hr. v. Siebold*) erwähnt indeß auch eines mehr hornartigen Polypen, welcher aus einzelnen Schichten, gleich der Hornhaut, im Auge zusammengesetzt war. Eben so findet man in ihnen zuweilen starke sehnigte Fäden, Ablagerungen von geronnenem käsigtem Eyweißstoffe u. s. w.

§. 423.

Der Ort, wo die Gebärmutterpolypen entstehen, ist ebenfalls verschieden, theils nämlich bilden sie sich in dem Grunde der Gebärmutterhöhle, theils im Kanale des Mutterhalses, theils am Muttermunde; sie liegen daher zuweilen ganz von den Gebärmutterwänden umschlossen, und sind dann immer vorzüglich schwer zu entdecken, zuweilen ragen sie in den Muttermund und in die Mutterscheide herab. Das Letztere geschieht immer, wenn der Polyp sich beträchtlich zu vergrößern beginnt; sein Wachsthum nämlich ist ziemlich dem der vorher beschriebenen Auswüchse vergleichbar, anfänglich ist er klein, und wenn er durch gefühlte Beschwerden zuerst entdeckt wird, oft nur von der Größe eines Taubeneyes, späterhin aber gewinnt er immer mehr Umfang, und man hat deren von mehreren Pfunden Schwere und im Umfange eines

*) Handb. über d. Frauenzimmerkrankh. Thl. I. S. 509.

Kinderkopfs gefunden. Daß wir als eigentlichen Sitz der Polypen die Schleimhaut der innern Uterinfläche betrachten, sie in sofern der Placenta uterina (s. d. 2ten Theil) gleichstellen und sie daher nicht mit andern Schriftstellern aus der Mittelsubstanz des Uterus ableiten können, ist schon oben (§. 421 u. 422.) erwähnt worden.

§. 424.

Von der Erkenntniß des Gebärmutterpolypen. Wie bey den im vorigen Abschnitt betrachteten Degenerationen ist auch hier die Erkenntniß oft mit bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft, und wieder wird zu dieser Erkenntniß theils die Beachtung der Krankheitsgefühle der Leidenden, theils die geburtshülfliche Untersuchung führen können. Die erstern, welche ziemlich den einzigen Leitfaden abgeben, so lange der Polyp noch völlig in der Gebärmutterhöhle eingeschlossen ist, sind nun gemeiniglich den Beschwerden einer angehenden Schwangerschaft äußerst ähnlich, ein schwacher Druck in der Beckengegend, öftere Kreuzschmerzen, prickelnde Empfindungen in den Brüsten, Außenbleiben oder Unregelmäßigkeit der Menstruation, zuweilen stärkerer Blutabgang, Beschwerden im Uriniren, gestörte Verdauung, Ueblichkeit und Erbrechen lassen hier leicht Verwechselungen mit wirklicher Schwangerschaft zu. Unterscheidung von diesem Zustande wird einigermaßen möglich: erstens durch Berücksichtigung des Alters, indem Polypen zuweilen auch bey nicht mehr zeugungsfähigen Individuen sich bilden; ferner durch Berücksichtigung des Ganges, welchen die Zufälle nehmen, indem kein so regelmäßiges Fortschreiten, keine solche stufenweis erfolgende Veränderung im Umfange des Leibes, kein solches Vermindern anderweitiger Beschwerden, kein so regelmäßiges Wiederkehren und allmähliges Abnehmen der allerdings zuweilen auch bey Schwangern bemerkbaren Menstruation, wie bey wahrer Schwangerschaft bemerkt wird, sondern der Zustand oft halbe Jahre und länger auf der gleichen Stufe verweilt.

§. 425.

Nimmt der Polyp an Größe zu, so werden die Zeichen desselben immer deutlicher, und vorzüglich vermag dann die geburtshülfliche Untersuchung bestimmtere Aufschlüsse zu geben. Die Vaginalportion nämlich zeigt sich gewöhnlich härter und stärker, den Muttermund rundlich, und so wie der Polyp sich gegen und in denselben herabsenkt, wird er geöffnet, der Mutterhals verkürzt sich, und in dem Muttermunde wird eine derbe kuglichte Geschwulst, welche bey der Berührung unschmerzhaft ist, aber leicht blutet, fühlbar (noch leichter freylich wird er durch die Untersuchung entdeckt, wo er ganz am Muttermunde entstanden war). Zugleich nimmt die Ausdehnung des Uterus zu, der Mastdarm und Blasenhals werden gedrückt, öftere Ergießungen entweder von reinem venösem Blute oder von wässerigtem, schleimigtem, mit Fasern des Polypen vermischtem, übel riechendem Blute stellen sich ein, der Körper magert ab, Entkräftung, Schwindel, bey den Blutungen nicht selten Ohnmachten, Schwere der Glieder und schleichendes Fieber treten ein.

§. 426.

In diesem Grade ist nun schon das Uebel mit wahrer Schwangerschaft fast gar nicht mehr zu verwechseln, indem namentlich der sich gleich bleibende geöffnete Muttermund, so wie die Art der Ausflüsse, die Dauer des Uebels, der Mangel fühlbarer Kindestheile oder Bewegungen zu sichere Zeichen sind; dagegen kann jetzt das Uebel leichter mit andern krankhaften Zuständen des Uterus, namentlich mit Vorfall und Umstülpung desselben, verwechselt werden. Dem Vorfalle wird der Polyp ähnlicher, wenn er beträchtlich in die Vagina herabgesunken ist und an seiner untern Fläche etwa eine Vertiefung zeigt, ist jedoch von ersterem bald zu unterscheiden, weil er unempfindlich ist, weil man durch Sondiren keine wahre Muttermundsöffnung entdeckt, weil er unten breiter als oben zu seyn pflegt und oben vom Ringe des Muttermundes umgeben ist. Schwerer ist die Unterscheidung des

Polypen von der unvollkommnen Umstülpung der Gebärmutter. Hier sind vorzüglich die vorausgegangenen Zustände zu berücksichtigen, der Polyp entsteht nur allmählig und ohne daß nothwendigerweise eine Geburt vorausgegangen seyn müßte, die Umstülpung ist immer die Folge einer regelwidrigen oder vernachlässigten Geburt, sonst kann die unvollkommne Umstülpung den Polypen oft äußerst täuschend nachbilden,*) so daß nur theils der doch gewöhnlich bey Polypen verdünnte Stiel, theils und hauptsächlich aber die Empfindlichkeit des umgestülpten Uterus gegen Druck, Kneipen oder gar gegen die umgelegte Ligatur, Gelegenheit geben, diesen Zustand vom Polypen, welcher sich an und für sich stets unempfindlich zeigt, zu unterscheiden. Uebrigens läßt sich allerdings auch der Polyp nicht reponiren, was aber von einer langdauernden Inversion ebenfalls gilt.

§. 427.

Nimmt nun der Gebärmutterpolyp noch mehr zu, so drängt er sich in die Mutterscheide herein, ja tritt wohl selbst vor dieselbe hervor, erregt heftige Spannung und Schmerzen im Becken, zieht den Grund des Uterus herab, bewirkt Vorfall oder theilweise Umstülpung, es entstehen die hartnäckigsten Obstructionen und Harnverhaltungen, durch den Druck auf Blut- und Lymphgefäße bilden sich Wassersuchten aus, und so kann, verbunden mit Zehrfieber, äußerster Entkräftung und öftern Blutungen, der Tod eintreten. Höchst selten ist es, daß, nachdem der Polyp eine bedeutende Größe erreicht hat, er sich selbst ablöst und ausgestoßen wird, und wenigstens gereicht diese Naturhülfe nicht leicht zum Vortheil der Kranken, da, wie auch Hr. v. Siebold erwähnt, hierbey stets das Uebel schon auf eine zu hohe Stufe gediehen ist, und auch die Ablösung selbst gewöhnlich mit starken Blu-

*) S. d. interessanten Aufsatz von Hauk über die bisherigen Ausrottungsmethoden der Gebärmutterpolypen in Rust Magaz. f. d. ges. Heilk. Bd. IV. Heft 3.

tungen erfolgt. — Auch in diesem höchsten Grade ist das Uebel zwar noch manchen andern Krankheiten ähnlich, aber doch leicht genug von ihnen zu unterscheiden. Von der gänzlich vorgefallenen Gebärmutter unterscheidet es sich nämlich durch den fehlenden Muttermund, von der vollkommen umgestülpten Gebärmutter durch die Entstehung, durch die Derbheit des Stiels, da bey letzterer das obere dünnere Ende der vorhängenden Geschwulst weicher ist wegen der Höhlung, und durch die Unempfindlichkeit.

§. 428.

Aetiologie. Daß wir das Wesentliche dieses Uebels in einen krankhaften Bildungsprozeß der innern Gebärmutterhaut glauben setzen zu müssen, ist oben bemerkt worden, und es ist daher jetzt nur noch von den verschiedenen innern und äußern Momenten, welche diese Degenerationen begünstigen, einiges zu erwähnen, obwohl das Meiste dem gleich lauten wird, was wir im vorigen Kapitel über die Entstehung der Steatome u. s. w. aufgeführt haben. Auch diese polypösen Auswüchse nämlich kommen häufiger bey Personen vor, welche schon geboren haben, bey schlaffer torpider Constitution, und in solchen Jahren, wo schon die wahre Produktivität des Uterus abnimmt, und eben deshalb die Neigung zu krankhaften Produktionen, vorzüglich bey öfterem Geschlechtsreiz, zunimmt. Bestimmtere Veranlassung zu diesen Auswüchsen wird ferner gegeben durch schwere Geburten, welche nicht gehörig behandelt, sondern durch rohes Eingreifen der Kunst beendigt worden sind, besonders üble Behandlung der Nachgeburtsperiode, wo, wenn wir auch nicht annehmen, daß Reste der Placenta zu Polypen sich umbilden, doch namentlich die innere Fläche des Uterus so gereizt wird, daß eben dadurch ähnliche Degenerationen der innern Haut nur um so leichter eintreten. Ferner unvollkommen geheilte Syphilis, sehr ausschweifende Lebensart, Mißbrauch geistiger Getränke und anderer erhitzender Dinge u. s. w.

§. 429.

Von dem Verlaufe, welchen dieses Uebel zu nehmen pflegt, ist bereits in den vorigen §§ bey der Kennzeichenlehre die Rede gewesen, woraus sich denn auch schon die hier zu stellende Prognose fast von selbst ergiebt, über welche wir daher nur noch Folgendes erinnern. Nothwendig nämlich äußert sich der Nachtheil derselben zuerst in den Functionen des Geschlechtssystems, in Unordnungen der Menstruation und entweder in völliger Hinderung der Empfängniß oder öfterer Veranlassung unzeitiger Geburten, in Veranlassung abnormer Lagen der Gebärmutter, Veranlassung zu Metrorrhagien, Leukorrhöe, ja selbst durch anhaltenden Druck des Polypen auf die Muttermundsränder zu skirrhösen Indurationen derselben. Späterhin droht das Uebel eben so der allgemeinen Lebensthätigkeit Gefahr. Die Prognose wird daher Rücksicht nehmen zunächst auf die Dauer des Uebels und auf den Grad, welchen dasselbe erreicht hat; ferner auf den Sitz des Polypen, in wiefern dieser für die Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Operation wichtig ist, dann auf die übrigen, durch den Polypen bereits veranlaßten örtlichen Leiden, als Vorfälle der Gebärmutter u. s. w., endlich aber insbesondre auf den Zustand der allgemeinen Reproduction und Lebenskraft. Daß übrigens selbst sehr große Polypen nicht nur glücklich beseitigt werden können, sondern selbst Schwangerschaften zuweilen bald nachher wieder eintreten und regelmäßig verlaufen, beweist eine von Sauter erzählte Beobachtung.*)

§. 430.

Behandlung. Das Wesentlichste derselben ist natürlich die Entfernung dieser Aftergebilde selbst, da dieselbe hier weit mehr als in den früher betrachteten Degenerationen erleichtert ist. Zu diesem Endzwecke nun stehen vorzüglich zwey Wege offen, erstens die Unterbindung, zweytens die

*) S. B. v. Siebold's Chiron. Bd. II. St. 2. S. 427.

Ausrottung durch schneidende Werkzeuge; denn das bloße Ausreißen, Abdrehen und Abkneipen entweder mit der Hand oder durch Polypenzangen ist wegen der Reizung oder Verletzung der Uterinsubstanz gar nicht, noch weniger aber die Ausrottung durch erregte Eiterung mittelst des Glüheisens oder der Aetzmittel zu empfehlen, indem für letztere Mittel diese Auswüchse theils ihres Orts wegen nicht geeignet sind, theils diese Ausrottung langwierig, schmerzhaft seyn und meistens nur unvollkommen gelingen würde. — Wir sprechen zuerst von den verschiedenen Methoden der Unterbindung der Gebärmutterpolypen.

§. 431.

Man kann aber die Unterbindung dieser Polypen entweder durch einen mit bloßer Hand, oder durch den mit Instrumenten umgelegten Faden bewerkstelligen. Die Unterbindung mit bloßer Hand ist vorzüglich zweckmäßig, wo der Polyp entweder äußerlich am oder im Muttermunde ansitzt, oder zugleich Vorfall oder Umstülpung des Uterus Statt findet. Man bedarf sodann bloß eines hinreichend starken seidenen oder hanfenen gewächsten Fadens, in welchen man eine Schleife macht, diese, nachdem die Kranke nach gehabter Darm- und Harnausleerung halbsitzend und halbliegend quer auf ein Bett gebracht worden ist (ohngefähr so wie im zweyten Theile das Lager zum Unternehmen der Wendung beschrieben werden wird), mit einer in die Mutterscheide gebrachten Hand bis an die Wurzel des Polypen herauf leitet, sie dort mit der Hand fixirt und alsdann durch einen Gehülfen zuziehen läßt, bis der Zug von der Kranken schmerzhaft empfunden wird. Hierauf befestigt man den Faden äußerlich an einer Leibbinde, und zieht denselben, immer bey eingebrachter Hand, in den nächsten Tagen täglich einigemal fester zu. — Indem nun aber eben dieses Zuziehen des Fadens oft ohne weitere Hülfsmittel etwas schwieriger ist, verdienen doch zweckmäßig eingerichtete Instrumente, vorzüglich die einfacher construirten, namentlich für alle die Fälle empfohlen zu werden, wo der Sitz des Polypen etwas höher ist.

§. 432.

Unter den verschiedenen Instrumenten aber nennen wir zuerst als eins der einfachsten den von Sauter *) empfohlnen und dem Boucher'schen Instrumente nachgebildeten, aus einer Reihe von Paternosterkügelchen und zwey Führungsstäbchen von Fischbein bestehenden Polypenunterbinder. Hier hat unteres und oberes Kügelchen zwey Oeffnungen, ein ähnlicher Faden wird mit beiden Enden durch die Oeffnungen des obersten Kügelchens gesteckt, beide Enden werden durch den einfachen Kanal der einigen dreyßig Paternosterkügelchen, und unten wieder einzeln durch die zwey Oeffnungen des untersten Kügelchens geführt; die Krayke wird ebenfalls in die im vorigen Paragr. beschriebene Lage gebracht, die aus dem obersten Kügelchen hervorragende Schlinge wird mittelst der beiden fischbeinernen Führungsstäbchen gefaßt, bis zur Wurzel desselben auf der hintern Seite heraufgeschoben, woselbst dann die beiden Stäbchen um die Polypenwurzel herumgeführt werden, bis die Kügelchenreihe vor dem Polypen liegt, dann zieht man die aus dem untern Kügelchen hervorhängenden Enden an, drängt die Kügelchen nach aufwärts, damit sich die Schlinge fest um die Wurzel des Polypen legt, und schlingt dann die heraushangenden Fäden zu einem Knoten zusammen, welcher ebenfalls nach und nach fester angezogen wird.**)

§. 433.

Anderer Art sind der Levret'sche, Nissen'sche und Jörg'sche Polypenunterbinder. Bey diesen nämlich laufen die Enden des Fadens, welcher die Schlinge bildet, in Röhren. Bey dem von Levret empfohlnen***) sind zwey silberne,

*) a. a. O. S. 420. (s. T. I. f. VIII.)

**) Aehnlich dem Sauter'schen ist auch der von Ribke, dessen Abbildung man in Kust's Magaz. Bd. III. Heft I. nachsehen kann.

***) S. d. Abbild. bey Richter Anfangsgründe der Wundarzneyk. Thl. I. S. 414.

etwas auswärts gebogene Röhren durch ein Gewinde mit einander, gleich einer Zange, vereinigt. Das Instrument soll geschlossen neben dem Polypen bis zur Wurzel eingebracht, dann geöffnet werden, wo man dann den Polypen durch dessen Arme hindurchdrängt, die Arme wieder schließt und die unten heraushängenden Fadenenden durch einen Knoten vereinigt. Dieses Instrument hat indeß, wie schon von Richter *) bemerkt worden, mancherley Unzweckmäßiges, vorzüglich weil die Größe und Krümmung des Instruments verschieden seyn muß, für verschiedene Fälle, weshalb dasselbe von Nissen **) dergestalt verbessert worden ist, daß die zwey Röhren frey und nach der Beckenkrümmung gebogen sind, und nur, wenn sie wie die Führungsstäbchen des Sauterschen Instruments, den Faden um die Wurzel des Polypen gelegt haben, durch eine doppelt angeschobene Zwinge vereinigt werden. Eine Einrichtung, welche endlich von H. Jörg ***) noch dahin abgeändert worden ist, daß an der untern angeschobenen Zwinge eine Schraube angebracht wurde, durch welche die Enden des Fadens aufgewickelt werden, und die Polypenwurzel ganz allmählig zusammen zu schnüren ist.

§. 434.

Außer diesen giebt es noch eine nicht unbeträchtliche Anzahl ähnlicher Instrumente; so empfiehlt Bell †), zum Behuf dieser Unterbindungen, bloß einen stählernen Führer mit zwey Ringen, durch welche der Faden gezogen wird, so daß die Schlinge aus dem obersten Ringe hervorragt.

---

*) Ebendas. S. 415.

**) Nissen de polypis uteri et vaginae novoque ad eorum ligaturam instrumento. Götting. 1789., und in Richter's Anfangsgr. der Wundarzneyk. Thl. I. S. 416.

***) Handb. d. Krankheiten des menschl. Weibes, s. d. Kupfert.

†) A system of operative Anatomy by Charles Bell. Lond. 1814. nach der Anzeige desselben in d. Götting. gelehrten Anz. Nr. 145. und 146. Septb. 1818.

Diese wird dann um die Wurzel des Polypen gelegt, die Enden des Fadens werden durch den untern Ring angezogen und geknüpft. Ferner gehören hierher die von Stark, von Löffler, von Desault und Andern angegebenen Instrumente, welche wir indeß um so eher übergehen können, da unter den hier bereits beschriebenen schon eine genügende Auswahl für verschiedene Fälle frey steht und namentlich das ganz einfache Sauter'sche Instrument gewiß nicht leicht seine Dienste versagen wird.

§. 435.

Es ist daher jetzt nur noch von einigen Zufällen zu sprechen, welche während der Abbindung eines Polypen sich zuweilen äußern können, so wie von der Behandlung, welche nach Statt gehabter Ablösung desselben nöthig wird. Oefters nämlich entsteht bald nach angelegter Unterbindung heftiger Schmerz, mit andern Nervenzufällen gepaart, es entsteht Fieber und entzündlicher Zustand der Gebärmutter. Man hat sodann gleich zu untersuchen, ob etwa die Ligatur gleich anfänglich zu stark angezogen sey, oder ob sie einen Theil des Uterus mit gefaßt habe, welches dann abzuändern ist, oder endlich, wenn vorher vielleicht die Diagnose noch nicht zur vollkommensten Gewißheit gediehen war, so müssen Zufälle dieser Art sogleich auf völlige Lösung der Ligatur dringen, da selbst von erfahrnen Geburtshelfern zuweilen unvollkommne Umstülpungen des Uterus mit Polypen verwechselt wurden. Außerdem kann zur Linderung der bey reizbaren Personen doch zuweilen, auch bey der vorsichtigsten Unterbindung, eintretenden Zufälle innerlich eine kühlende Emulsion, bey eintretenden Krämpfen etwas Opium u. s. w., äußerlich Injectionen von Kamillen-, Valeriana-, Bilsenkraut-Aufguß u. s. w. mit Nutzen Anwendung finden; Stuhl- und Urinverhaltungen werden durch Klystiere und den Catheter beseitigt. Die Kranke muß dabey übrigens ruhig liegen und nur dünne und leichte Speisen genießen.

§. 436.

Fängt der Polyp an sich abzulösen, so treibt er sich oft auf, einzelne Theile platzen und ergießen faulichte schleimigte Flüssigkeiten; dann werden aromatische Aufgüsse, von Serpillum u. dgl. nothwendig. Hat er sich endlich am vierten bis sechsten oder neunten Tage abgelöst, so kann er mit dem Unterbindungsfaden selbst (wenn er nicht allzugroß ist) herausgenommen werden, außerdem entfernt man ihn mit der Polypenzange, mit der Hand, oder (wenn er sehr groß ist, wie bey einem 2½ Pfund schweren, von Sauter operirten) mittelst der eingebrachten Geburtszange. Erfolgt bey dem Abfallen etwas stärkere Blutung, so macht man von gelind reizenden und zusammenziehenden Injectionen Gebrauch, giebt innerlich etwas Zimmttinktur und verfährt nach Maaßgabe der Blutung eben so, wie oben bey den passiven Blutungen gelehrt wurde.

§. 437.

Ist nun aber der Polyp völlig beseitigt, und sind die ersten dringendsten Zufälle beruhigt, so erfolgt gewöhnlich noch das völlige Absterben und Ausrotten der Wurzel durch eine mäßige Eiterung. Es ist hierbey noch das Geschäft des Arztes, theils auf Unterhaltung eines gutartigen Eiters zu sehen, welches nach den Umständen bey sehr geschwächten Personen durch Injektionen von Chinadekokt mit Kalchwasser, Serpillumaufguß, Myrrhenessenz, oder bey stärkern, vollblütigern und irritablern Subjekten durch Injektionen von Flieder- oder Kamillenaufgusse geschieht; theils auf Besserung der allgemeinen Reproduction und Hebung der Kräfte Rücksicht zu nehmen. Man ordnet zu diesem Behuf den Gebrauch der China innerlich an, giebt eine leicht verdauliche, nährhafte Diät, und läßt spätterhin, zur völligen Wiederherstellung der Gesundheit, eisenhaltige Bäder besuchen, oder auch wohl ähnliche Mineralwässer innerlich gebrauchen.

§. 438.

Wir haben nun noch von der zweyten Art der Behandlung, nämlich von dem Ausschneiden der Polypen zu sprechen. Früher hat man diese Methode wenig angewendet, und sie auf die Fälle eingeschränkt,*) wo der Polyp einen schmalen Stiel hat, oder in der Mutterscheide sitzt, oder wenigstens tief in dieselbe herabgetreten ist, obwohl man auch für diese Fälle vor dem Ausschneiden das Anlegen einer Unterbindung empfahl. Neuerlich hat man hingegen die Ausrottungen durch schneidende Instrumente weit allgemeiner sowohl empfohlen, als wirklich ausgeführt. H. Osiander namentlich stimmte zunächst für diese Operationsweise, und ihm hat sich auch H. v. Siebold angeschlossen. Man verrichtet das Ausschneiden aber, wie schon von Richter bemerkt worden ist, am schicklichsten mittelst einer langen, vorn abgerundeten und stumpfen Scheere, mit etwas auf der breiten Seite aufwärts gekrümmten Blättern, oder (obwohl weniger passend, wegen leicht möglicher Verletzung der Geburtstheile) mittelst eines schneidenden Hakens, wie man deren sich früher zur Zerstückung des Kindes bediente; und dafern man wirklich sicher seyn kann, daß solche Afterorganisationen sich nach dem Ausschneiden nicht leicht von neuem wiedererzeugen, so verdient allerdings diese Methode, ihrer Sicherheit, Schnelligkeit und Schmerzlosigkeit wegen, alle Empfehlung, wobey auch die vielleicht anfänglich etwas stärkere Blutung eben nicht sehr zu scheuen seyn würde. — Die Behandlung auch nach dieser Art der Ausrottung wird übrigens ziemlich wieder dieselbe seyn können, welche wir empfohlen haben für die Ausrottung durch die Unterbindung (die indeß doch für manche Fälle, vorzüglich größerer Polypen, oder wo die Diagnose noch nicht ganz fest steht, stets ihre Vorzüge behalten dürfte).

*) S. Richter Anfangsgr. d. W. Th. I. S. 419.

7.

Von der bösartigen Verhärtung und dem offenen Krebse der Gebärmutter (Scirrhus et Carcinoma uteri).

§. 439.

Mit diesen Namen belegen wir diejenigen höchst gefährlichen und leider in diesen Tagen nicht allzuseltnen Metamorphosen der Gebärmuttersubstanz, wo dieselbe von einer harten, schmerzhaften, vorzüglich vom Muttermunde ausgehenden Geschwulst, namentlich in der zweyten Hälfte der zeugungsfähigen Lebensperiode, befallen wird, welche nach und nach an Umfang, Empfindlichkeit und Derbheit zunimmt, und endlich, oft angeregt durch die Revolution, welche der Körper in den klimakterischen Jahren erleidet, übergeht in geschwürige Auflösung der Substanz, mit immer zunehmenden Schmerzen, Ausfließen einer höchst übelriechenden Jauche, wobey denn häufig, unter immer zunehmender Entkräftung, bey öfterm Blutverlust und völliger Zerstörung eines großen Theils des Uterus, nur der Tod diesen Leiden das erwünschte Ende giebt.

§. 440.

In wiefern nun dieses Uebel oft einen sehr kleinen und verborgenen Anfang nimmt, oft Jahre lang von den Kranken ohne bedeutende Beschwerden getragen, oder wenigstens leicht mit andern Zufällen verwechselt wird, dann aber, wenn es mit voller Heftigkeit hervorbricht, auch oft schon einen Grad erreicht hat, wo es der Heilung bereits unübersteigliche Hindernisse entgegensetzt, muß es hier von größter Wichtigkeit seyn, die Kennzeichen dieser Krankheit möglichst genau festzustellen.

§. 441.

Wir unterscheiden auch hier wieder solche Merkmale, welche in die Perceptionssphäre der Kranken fallen, und solche,

welche durch äußere und innere ärztliche und geburtshülfliche Untersuchung ausgemittelt werden. Was die erstern betrifft, so bemerken die Kranken anfänglich leichtere schmerzhafte Empfindungen in der Tiefe des Beckens, welche nicht andauernd sind, sondern durch den Coitus, oder während des Eintritts der monatlichen Periode, beym Urinlassen, beym Stuhlgange, bey stärkerer Betastung des Unterleibes oder inneren Untersuchungen, zuweilen auch bey Witterungsveränderungen hervortreten. Nach und nach werden diese Empfindungen stärker, anhaltender, und verrathen sich besonders durch das Gefühl von Stechen oder Brennen, welches immer von einem Punkte ausgeht und oft die ganze Tiefe des Beckens durchdringt. Hierzu gesellt sich oft Schwere, ziehender Schmerz oder Lähmung eines oder beider Schenkel, und variköse Anschwellungen an denselben; die Kranken bemerken schmerzhafte, oft ebenfalls skirrhös verhärtete Stellen in den Brüsten, sie bemerken, daß die Menstruation weniger regelmäßig erscheint, alle Zufälle um diese Zeit bedeutend zunehmen, daß das monatliche Blut selbst unregelmäßig gemischt ist, wässerig, riechend und mißfarbig erscheint, und ähnliche Ausflüsse allmählig auch außer der Monatszeit sich einstellen; ferner treten Störungen der Verdauung, Magendrücken, falscher Geschmack, belegte Zunge, Ueblichkeit, Erbrechen hinzu, der Schlaf wird unruhig, und durch die öftern vorzüglich Abends häufiger wiederkehrenden Schmerzen und Fieberbewegungen unterbrochen, die Kräfte sinken, und die Kranken, welche oft schon anfänglich eine auffallend graue gelbliche Hautfarbe haben, bekommen dieses kacheltische Ansehen immer mehr.

§. 442.

Geht nun das Uebel in Krebsgeschwür über, so werden alle vorhergenannten Zufälle immer heftiger. Die Schmerzen pflegen oft in der Nacht mit unausstehlicher Heftigkeit sich einzustellen, die Functionen der benachbarten Theile des Darmkanals und der Harnwege werden immer mehr gestört, die Kranke vermag das Bett nicht mehr zu verlassen, ein häßlich riechender Ausfluß ist fortwährend vorhanden und veranlaßt

häufig Excoriationen der äußern Geburtstheile, ein schleichendes Fieber und immer stärkere Abzehrung des Körpers stellen sich ein, und unter der abfließenden Jauche werden nicht selten kleinere oder größere abgelöste schwammige faulige Stücke der verdorbenen Gebärmuttersubstanz bemerkt.

§. 443.

Die Zeichen betreffend, welche durch äußere und innere geburtshülfliche Untersuchung aufgefunden werden, so gehören dahin verhärtete schmerzhafte Knoten in den Brüsten, der Unterleib ist, wenigstens durch den Uterus, selten aufgetrieben, allein bey der äußern Berührung, oder vielmehr bey dem tiefern Eingreifen der Hand über den Schambogen schmerzhaft; die äußern Geburtstheile sind zuweilen ödematös, zuweilen, ohngefähr wie bey einer Wöchnerin, mehr kühl und schlaff anzufühlen. Bey der innern Untersuchung durch die Mutterscheide (welche für die Diagnose hier überhaupt die wichtigste und entscheidenste ist) zeigt sich namentlich der Muttermund und Mutterhals, so lange das Uebel noch auf einer frühern Stufe verweilt, in begränzten Stellen verhärtet und höchst empfindlich; wenn die Krankheit bereits weiter um sich gegriffen hat, ist die Vaginalportion zugleich aufgetrieben, die Muttermundslippen sind ungleich, höckerig und hart anzufühlen, die Mutterscheide ist schlaff und an ihren Wänden mit riechendem, mißfarbigem Schleim überzogen, die Kranke klagt bey der Untersuchung über heftige Schmerzen.

§. 444.

Bey völlig ausgebrochenem Carcinom werden die Ränder des Muttermundes noch unebner und wie ausgenagt sich darstellen, ein bedeutender Theil, ja oft die ganze Vaginalportion, ist verschwunden, die ausfließende Jauche ist von dem unerträglichsten Geruche begleitet, oft ist ein Theil der Vagina selbst mit ergriffen und mit höckerigten Geschwüren bedeckt, ja selbst die Harnwege werden mit davon ergriffen gefunden. Geht man etwas in den Kanal des Mutterhalses ein, so findet man diesen voll schwammiger, leicht blutender Exereſcenzen, und durch das Scheidengewölbe, oft noch deutlicher bey der Untersuchung durch

den Mastdarm entdeckt man auch den Gebärmutterkörper aufgetrieben und verhärtet, ja zuweilen selbst die Wände des Rectums angegriffen; wie denn die Zerstörungen dieser Krankheit sich nicht nur auf die Muttertrompeten, Ovarien und Mutterscheide, sondern auf die ganzen Beckeneingeweide fortsetzen können.

§. 445.

Wenn nun auch aus den angegebenen Zeichen sich ergiebt, daß das völlig entwickelte Uebel nicht leicht zu verkennen sey, und im letzten Grade schwer eine Verwechselung mit andern gedacht werden könne, so ist dagegen eine solche Verwechselung in frühern Perioden um so leichter möglich, und zwar zunächst mit gutartigen Verhärtungen, welche öfters, wie auch H. Wenzel*) bemerkte, nach lang dauernden Unterdrückungen der Monatsreinigung in Folge anderweitiger Krankheiten eintreten und wobey der Muttermund ungewöhnlich hart, aufgeschwollen, mitunter wohl auch ungleich und empfindlich gefühlt wird, welches indeß dann gewöhnlich rein von Stockungen und Venenerweiterungen in der Substanz des Uterus abhängig ist und sich daher bey wieder eintretender Menstruation wieder verliert. Aehnliche Auftreibungen bleiben, wie ich ebenfalls mehrmals bemerkte und auch von H. v. Siebold**), einstimmend mit H. Osiander, angeführt wird, öfters nach schweren natürlichen oder künstlichen Geburten zurück, sind wohl mit wahren Hämorrhoidalzufällen verknüpft, und zertheilen sich demohnerachtet unter zweckmäßiger Leitung oft vollkommen, ohne alle Neigung zum Uebergange in offenes Krebsgeschwür. — Die Beachtung der Entstehungsweise, die bessere allgemeine Constitution, das weniger lebhafte Umsichgreifen des Uebels, die mindere Schmerzhaftigkeit lassen indeß den Unterschied bald erkennen.

*) Krankheiten des Uterus. S. 117.

**) Handbuch der Frauenzimmerkrankheiten. Thl. I. S. 438.

§. 446.

Weniger leicht können die Zufälle der skirrhösen Verhärtung des Uterus für bloße schmerzhafte oder unordentliche Menstruation aus Ursache allgemeinen krankhaften Zustandes des Nerven- oder Gefäßsystems genommen werden, obwohl früher schon (§. 178. u. 191.) bemerkt worden ist, daß gar nicht selten Verbildungen der Geschlechtsorgane und namentlich selbst skirrhöse Verhärtungen diesen Regelwidrigkeiten der Menstruation zum Grunde liegen. — Die geburtshülfliche innere Untersuchung kann hier die Diagnose bald berichtigen. Eben so wenig ist bey genauerer Untersuchung die Verwechselung mit zu starker Menstruation möglich, da, wenn die Zufälle des Gebärmutterkrebses bis dahin gediehen sind, daß passive Blutungen sich einstellen, auch die innere Exploration schon bedeutende Zerstörungen stets wahrnehmen lassen wird. — Eher wäre, wegen der oft während des Krebses im Mutterhalse sich bildenden fungösen Auswüchse eine Verwechselung mit dem Gebärmutterpolypen denkbar, obwohl auch hier die Geschichte der Krankheit und namentlich die weit mindere Schmerzhaftigkeit des Polypen Aufschluß giebt.

§. 447.

Endlich ist es wohl auch zuweilen der Fall gewesen, und auch mir vorgekommen, daß unwissende Land- und Wundärzte, oder Hebammen, den Gebärmutterkrebs mit angehender Schwangerschaft oder mit einem Vorfalle der Gebärmutter verwechselt haben; allein von beiden Zuständen ist der Unterschied deutlich aufzufinden, nur wenn, was allerdings selten der Fall, aber doch mehrmals wirklich beobachtet worden ist, mit Skirrhus oder Carcinom die Schwangerschaft sich verbindet, wird die Diagnose sowohl des Uebels als der Schwangerschaft beträchtlich erschwert, indem es dann oft ungewiß bleibt, welche Zufälle dem Uebel und welche den physiologischen und gesunden Veränderungen durch Schwangerschaft zuzuschreiben sind. — Besonders ist hier das Vergleichen der Resultate innerer und äußerer Untersuchung wichtig;

bey der Schwangerschaft nämlich schwillt der Leib nach und nach, und zwar in regelmäßiger Aufeinanderfolge an, späterhin sind wohl bey genauer Untersuchung, zumal da hier der Körper abgemagert zu seyn pflegt, äußerlich Kindestheile oder die Fluctuation des Fruchtwassers zu fühlen, da hingegen beym bloßen Carcinom der Uterus selbst gar nicht bedeutend anzuschwellen und über das Becken sich zu erheben pflegt, wodurch denn namentlich auch Erkenntniß der Verbindung dieser Zustände möglich wird. Innerlich ist die Verkürzung der Vaginalportion durch Erosion, und der harte, ungleiche, oft mehr runde Muttermund beym Carcinom, wenn beide Zustände gesondert vorkommen, leicht von dem natürlich verstreichenden Mutterhals und dem turgescirenden runden Muttermunde bey Schwangern zu unterscheiden. Uebrigens verlieren sich gewöhnlich die Beschwerden der Schwangerschaft und die vielleicht anfänglich noch fließende Menstruation späterhin mehr und mehr, bey dem Krebs nehmen diese Zufälle, je länger das Uebel dauert, um so mehr zu; charakteristisch aber vorzüglich sind die große Empfindlichkeit und die heftigen Schmerzen des Uterus.

§. 448.

Aetiologie. Worin besteht das Wesentliche der skirrhösen Verhärtung und des Krebsgeschwürs? — Diese Frage hat die Pathologen von jeher vielfach beschäftigt; ist es ein specifisches, an einem Punkte ausgesondertes und entstehendes Gift, ist es eine bloße Abart der Entzündung, ist es örtliches Offenbaren einer allgemeinen fehlerhaften Constitution und Säftemischung, ist es eine rein örtliche Degeneration der Substanz? darüber wünschte man ins Klare zu kommen. — Wir wollen versuchen, ob eine ganz einfache Betrachtung des Ganges dieser Krankheit hierüber einigen Aufschluß gewähren kann. — So wie aber das Leben überhaupt, so kann auch die Krankheit nur unter Zusammenwirkung eines innern und äußern Moments entstehen und bestehen, und es ist eine rein örtliche Krankheit ohne Beywirkung des Allgemeinen nicht denkbar, da ja jedes Einzelne nur eben stets durch das Ganze,

und in wiefern es im Ganzen ist, besteht und lebt. — An diese Sätze glauben wir erinnern zu müssen, insbesondre wenn man in das Wesen einer so viel Eigenthümliches darbietenden Krankheit, wie Skirrhus und Krebs, einzudringen hofft.

§. 449.

So viel ist nun aber hierbey sicher, die Wurzel des Uebels ist krankhafte Verdichtung einer organischen Substanz. Diese Verdichtung selbst entsteht aber offenbar auf mehrfache Weise, theils durch vorausgegangene Entzündung und erfolgte Ausschwitzung, theils durch eine ohne wahre Entzündungszufälle eintretende krankhafte Metamorphose, durch Degeneration (s. §. 328.), theils wohl auch durch anhaltenden Druck, durch Zusammenpressung und mechanische Verdichtung der Substanz unmittelbar, welches der Fall zu seyn scheint, wenn durch drückende Schnürbrüste sich Krebsknoten in den Brüsten, und zwar den Kranken oft völlig unbemerkt, bis sie dieselben zufällig entdecken, bilden, wenn durch Druck von falsch gelegten oder unpassenden Mutterkränzen, oder durch Druck von in den Muttermund gedrängten Polypen nach und nach Scirrhus uteri entsteht. — Durch eine bedeutende krankhafte Verdichtung organischer Masse muß dieselbe nothwendig dem lebendigen Stoffwechsel mit der Gesammtheit des Organismus entzogen werden; es wird eine solche Stelle für den übrigen Körper oft ein wahrhaft fremder Theil. Ein solcher fremder Körper aber innerhalb der Gränzen des Organismus ist dem Wesen desselben, wo alles ineinander greifen, alles durch und in einander bestehen soll, zuwider; es wird daher die Reaktion des Allgemeinen gegen dieses Besondere angeregt, es vermehrt sich der Zudrang von Säften, um diese Stelle entweder wieder aufzulösen oder durch irgend einen andern Weg auszusondern, ja zu zerstören.

§. 450.

Ist nun die allgemeine Reproduction kräftig und nicht durch anderweitige Krankheitsspuren gestört, so gelingt wohl

auch unter schicklicher Leitung diese Auflösung vollkommen; da indeß dieses seltner der Fall ist, eben weil in solchen gesunden Körpern das Uebel weniger leicht sich entwickelt, so entsteht nun am gewöhnlichsten im Umkreise der Verhärtung und selbst in den Gefäßen, welche noch in die verhärtete Stelle eindringen, ein Entzündungszustand, welcher durch den Reiz dieses Körpers stets unterhalten wird, durch Brennen, Stechen, große Empfindlichkeit, ja selbst Fieberbewegungen sich zu erkennen giebt, und wobey denn eben bey diesem stärkern Zudrangen plastischer Stoffe die Dichtigkeit, so wie die Größe der verhärteten Stelle, immer mehr zunehmen muß (indem ein solcher Punkt gleich einem Punctum ossificationis durch stete Anlegung neuer Schichten von außen wächst), zugleich aber das allgemeine Befinden durch diesen steten gereizten Zustand des Gefäßsystems gestört und endlich zerrüttet wird, woher das kachektische Ansehen solcher Kranken, ihr Mangel an Eßlust u. s. w. sich erklären.

§. 451.

Hat nun das Uebel auf dieser Stufe längere Zeit bestanden, so kann durch innere oder äußere Momente, welche den Zufluß von Säften plötzlich noch mehr steigern, der Uebergang der Entzündung in Eiterung, d. i. in Auflösung der festen Substanz in flüssige, leicht befördert werden. †) Allein die Auflösung eines Theils, welcher schon in dem Maaße, wie der Skirrhus, von reiner organischer Struktur abgewichen und von dem Gesunden gleichsam abgesondert ist, eine Auflösung ferner, welche Statt findet in einer schon halbzerrütteten, gewöhnlich schon vor Entstehung des Skirrhus kachektischen und durch die chronische Entzündung noch mehr

†) Die sonderbare Ansicht Bayle's, daß diese Krebsgeschwüre des Uterus die Ursache des Skirrhus benachbarter Theile seyen (s. d. Auszug von dessen im Journal de Medicine gegebenen Abhandlung im Jahrg. 1805. der allgem. medic. Annal. S. 809.), erwähnen wir hierbey nur historisch, da eine ausführliche Widerlegung derselben wohl überflüssig ist.

geschwächten Constitution, kann unmöglich eine gutartige seyn, sie wird im Gegentheil der faulichten Auflösung nahe kommen; daher denn das Eigenthümliche der abgesonderten Krebsjauche, welche, wenn auch durch Alibert's*) Inoculationsversuche völlig dargethan seyn sollte, daß sie für den gesunden Körper keine Ansteckungskraft besitzt, und wir auch, wie bereits H. Wenzel**) bemerkt hat, an keine wirklich chemisch auflösende und corrodirende Eigenschaft derselben zu glauben Ursache haben, doch gewiß für die benachbarten Flächen des kranken Theils selbst, d. i. für die Wände des Geschwürs als Reiz wirkt, wodurch die Entzündung immer mehr unterhalten, die skirrhöse Verhärtung immer weiter ausgebreitet, und, in Folge derselben, die Zerstörung und Auflösung immer weiter fortgepflanzt wird, wobey denn nicht selten ganze Partien des Uterus, auch ohne vorher wahrhaft aufgelöst zu seyn, sich absondern und im eigentlichen Sinne abfaulen.

§. 452.

Wenn nun sonach das Wesentliche dieser Krankheit nicht sowohl in einem Moment allein, als vielmehr in dem Zusammentreffen mehrerer verschiedenartiger allgemeiner und besonderer auf einem Punkte, zu beruhen scheint (woraus sich denn auch die Antworten auf mehrere der genannten Fragen §. 448. ergeben), so bleiben hiernächst noch die einzeln entfernter und veranlassend wirkenden Ursachen etwas näher zu erwägen übrig. — Zustände, welche namentlich zur Entstehung der skirrhösen Verhärtung und des Krebsgeschwürs beytragen, sind aber theils allgemeine skrophulöse Constitution, deprimirende Gemüthszustände, Unordnungen im Pfortadersystem, syphilitische Ansteckung, hysterische Zustände, ganz unbefriedig-

*) Salzburg. med. chirurg. Zeit. 1809. Februar.

**) S. dessen Werk über die Krankheiten d. Uterus (S. 119.) und über die Induration und das Geschwür in indurirten Theilen. Mainz 1815. 8.

ter Geschlechtstrieb, Unterdrückungen der Menstruation, des Hämorrhoidal- oder weißen Flusses; ferner wird noch bestimmtere Veranlassung dazu gegeben durch schwere Geburten, besonders durch gewaltsame, mit Instrumenten verrichtete künstliche Eröffnung des Muttermundes, roh ausgeführte Zangenentbindungen bey nicht sattsam erweitertem Muttermunde, gewaltsame Lostrennung der Nachgeburt; durch ausschweifende Lebensart, stark zusammenziehende, kalte oder reizende Injectionen oder Tampons. Alles Dinge, welche vorzüglich den Muttermund und die Vaginalportion heftig reizen, wodurch, zumal da gerade diese Gegend die nervenreichste am Uterus ist (in sofern man diesen Ausdruck von einem überhaupt so nervenarmen Gebilde brauchen kann), Congestionen, Entzündungen und Degenerationen so leicht verursacht werden, und wodurch es erklärlich wird, warum, wenn unter Begünstigung der allgemeinen Constitution Krebs entsteht, dieser fast immer vom Muttermunde beginnt.

§. 453.

Noch nähere Veranlassung zu Entstehung skirrhöser Verhärtungen geben ferner oft unvollkommen zertheilte Entzündungen bey vernachlässigten Puerperalfiebern oder nach Unterdrückungen gewohnter Secretionen entstanden, Mißbrauch erhitzender Abführ- oder treibender Mittel; ferner das unterlassene Selbststillen bey Personen, welche doch ihrem Allgemeinbefinden nach recht wohl hätten stillen können (eine in unsern Tagen gewiß nebst dem Uebermaaße im Geschlechtsgenusse nicht selten Statt findende Ursache); eben so die Ausschweifungen im Genuß spirituöser, gewürzhafter Dinge, das unter den Damen nicht selten herrschende übermäßige Kaffee- und Theetrinken, der Genuß von Liqueur, Chokolade u. s. w. — Endlich auch die Periode des weiblichen Lebens selbst, in welcher die Menstruation naturgemäß cessirt, namentlich wenn auch hier fruchtlose Geschlechtsreizungen und sonst ungeordnete Lebensweise andauern. — Von welchen Einflüssen denn sämmtlich noch zu bemerken ist, daß so wie sie eines Theils im Stande sind, die skirrhöse Verhärtung zunächst zu erzeugen,

sie andern Theils auch, wenn sie bey schon entwickeltem Skirrhus einwirken, den Uebergang in offenes Krebsgeschwür befördern.

§. 454.

Von dem Verlaufe, welchen diese Krankheit zu nehmen pflegt, hat bereits die vorhergegangene Beschreibung ihrer Kennzeichen ein Bild gegeben; und eben so wird sich daraus leicht, was über die Prognose bey derselben zu sagen ist, abnehmen lassen. Im Ganzen nämlich ist allerdings die Vorhersagung äußerst ungünstig, denn selbst kleine Skirrhen vergrößern sich oft schnell und unaufhaltsam, werden oft der ärztlichen Untersuchung erst auf einer Stufe beträchtlicher Ausbildung unterworfen, lassen bey ihrer versteckten Lage weit schwerer völlige Ausrottung zu, und eben so wenig Erfolg ist oft von den wirksamsten innern oder äußern Arzneymitteln zu erwarten. — Etwas besser wird demohnerachtet immer noch die Prognose gestellt werden können, so lange das Uebel noch neu ist, so lange noch die allgemeine Constitution weniger angegriffen und zerrüttet ist, so lange die benachbarten Theile noch ganz frey sind und das Uebel auf die Vaginalportion allein eingeschränkt ist, sobald die Ursachen des Uebels vollkommen klar und heilbarer Art (z. B. syphilitisch) sind, vorzüglich aber sobald das Uebel noch bloß als Verhärtung erscheint und der Uebergang in offenes Krebsgeschwür noch nicht eingetreten ist; in welchem letztern Falle, sobald namentlich der größere Theil bereits zerstört ist, Heilung fast immer unmöglich bleibt, außer zuweilen durch eine Operation, für welche dann die Ausführung sowohl als der Ausgang noch günstiger seyn wird, wenn mit der Induration und dem Geschwür des Uterus eine beträchtliche Herabsenkung in das kleine Becken verbunden ist.

§. 455.

Behandlung. Zuvörderst ist hier zu betrachten, was durch Arzneymittel für Linderung und Heilung eines so bösartigen Uebels geschehen kann, sodann von der operativen

tigkeit der Verdauungsorgane, durch den Aufenthalt in freyer gesunder Luft, durch Aufheiterung des Gemüths und mäßige Bewegung hingewirkt werden muß. Stärkende Arzneymittel, wie China, Wein, Eisen u. dgl., sind jedoch immer nur höchst sparsam oder gar nicht anzuwenden, indem gewöhnlich auf der einen Seite hierbey mehr geschadet wird (nämlich in Erhöhung des örtlichen Entzündungszustandes), als im Allgemeinen (durch Erhöhung der Lebensthätigkeit) genützt werden kann. Wichtiger sind daher vorzüglich bey scrophulösem Habitus, die Mittel, welche das Lymphsystem in Anspruch nehmen und eben dadurch, unterstützt von den Bädern, Injectionen, Einreibungen u. s. w., das Zurückbilden jener Verhärtungen und die Auflösung derselben begünstigen, zu welchem Behufe denn, außer den oben schon in anderer Hinsicht empfohlnen Merkurialien, der Cicuta und Belladona, noch die frischen bittern und seifenhaften ausgepreßten Kräutersäfte gehören.

§. 459.

Ist nun aber schon, selbst bey geringern Graden des Skirrhus, die ärztliche Behandlung oft keineswegs von gewünschtem Erfolg, und zwar eben weil die verbildeten Stellen zu sehr aus der Gemeinschaft mit dem gesammten Organismus herausgetreten sind und sich dadurch zugleich der Einwirkung dynamischer Mittel zu sehr entziehen, so ist nun, wie schon bemerkt, noch weniger auf diese Weise bey wirklichem aufgebrochenem Krebsgeschwür zu thun möglich, weshalb wir hier nur noch einiger Mittel gedenken, von welchen man selbst noch auf dieser Stufe des Uebels hülfreiche Wirkung gesehen haben will. — Hierher gehört zunächst, nach Westring's,*) wie nach ältern Beobachtungen, die Ringelblume (Calendula officinalis), deren Extrakt nach Westring

*) J. P. Westring's, Königl. Schwed. Leibarztes, Erfahrungen über die Heilung der Krebsgeschwüre. Aus d. Schwed. übers. mit Zusätzen von C. Sprengel. Halle 1817.

in Pillen zu 2 Gran, von 6 bis 16 Stück Morgens und Abends, gegeben werden soll, wobey zugleich $\frac{1}{8}$ Gran von dem Goldsalz (Gold, in Salpetersäure aufgelöst, mit salzsaurem Ammonium gesättigt und mit kohlensaurem Kali niedergeschlagen) theils in die Schamlefzen, theils in das Zahnfleisch einzureiben ist, und Einspritzungen von einer Auflösung des Extract. Chaerophylli sylvestris in dem Aufgusse desselben Krautes, oder Auflösung des Extrakts der Ringelblume in ihrem Aufgusse gemacht werden sollen. Da indeß bey den von Westring erzählten Fällen die Untersuchung der Kranken nicht von ihm selbst, sondern nur durch Hebammen vorgenommen worden war, so bleibt denn freilich, ob das durch dieses Mittel geheilte Uebel wirklich Krebs gewesen sey, sehr im Zweifel.

§. 460.

Eben so hat man zu mehreren Malen von dem frisch ausgepreßten Safte des Mauerpfeffers (Sedum acre) bey Krebsgeschwüren vortheilhafte Wirkungen bemerkt. Ferner werden von Richard Carmichael die kohlensauren und phosphorsauren Eisenmittel gegen den Krebs besonders empfohlen, und in ziemlich starken Dosen, zu 30 bis 40 Gran täglich, gereicht. Wir haben zwar oben schon ein Bedenken wegen Anwendung der tonischen Mittel bey Zuständen, welche mit steter chronischer Entzündung verbunden sind, geäußert, und möchten daher auch das Eisen, wenn nicht vielleicht die Säuren in den genannten Präparaten als corrigirend wirken, nur unter besonderer Vorsicht anrathen; demungeachtet wollen H. Rust und Völker*) neuerlich von diesen Mitteln, so wie von dem Safte des Mauerpfeffers günstige Wirkungen bemerkt haben. — Endlich erwähnt H. Wenzel**) des Gebrauchs des Arseniks (in der Fowlerischen Solution) als ein bedeutendes Erleichterungs-, wenn auch

*) Rust's Magaz. f. d. ges. Heilk. Bd. I. Heft 2.

**) Krankheiten des Uterus S. 187.

nicht Heilmittel, bey den stechenden Schmerzen, welche den Uebergang in Carcinom bezeichnen, verwirft dagegen den von Andern ebenfalls empfohlnen Gebrauch der Sabina als zu reizend.

§. 461.

Außer der Anwendung solcher Mittel, welche eigentliche Heilung des Uebels bewirken sollen, und wohin wir denn auch noch die im Folgenden zu betrachtende Operation rechnen, hat indeß der Arzt noch theils auf die häufigen Blutungen, theils auf die oft so heftigen Schmerzen und die dadurch erregte äußerste Schlaflosigkeit und Entkräftung Rücksicht zu nehmen. Was zunächst die Blutungen betrifft, welche durch die immer fortschreitenden Zerstörungen des Uterus veranlaßt werden, so muß erstlich sorgfältige Ruhe, Vermeidung aller aufregenden Gemüthsbewegungen, Speisen und Getränke prophylaktisch beobachtet, und allgemeiner Erethismus oder Congestionen müssen durch kühlende Getränke, verdünnte mineralische Säuren und ähnliche Mittel beseitigt werden, dahingegen die eingetretenen Blutungen selbst durch Anwendung adstringirender Mittel, durch Tampons von Schwämmen in das Decoctum cort. salicis, quercus, ulmi camp. getaucht und mit rothem Wein besprengt oder mit einem styptischen Pulver bestreut, baldigst zu stillen, jedoch auch stärkere Blutungen bey der Entzündung, welche noch den bloßen Skirrhus begleitet, durchaus nicht zu schnell zu unterdrücken sind. — Was die Schmerzen betrifft, so sind sie theils Folgen erhöhter Entzündung und werden durch antiphlogistisches Regimen gemildert, theils Folgen des Nervenreizes, und werden dann narkotische Mittel, Opiate, Lavements mit Laudanum u. s. w. erfordern, obwohl sich die Kranken bald an diese Mittel gewöhnen und dann zu beträchtlichen Dosen steigen müssen, um nur einige Wirkung zu empfinden. Bey heftigem zuweilen hierbey sich zeigendem Erbrechen ist oft bloß die nicht genugsame Berücksichtigung regelmäßiger Stuhlentleerungen die Ursache; wo es Nervenleiden ist, verdienten Narcotica und die von Siebold em-

pfohlene Belladonna zu einem halben bis 1 Gran Anwendung.

§. 462.

Wir kommen endlich zur Erwägung der, einer dynamisch so schwer zu heilenden Krankheit noch durch unmittelbare Abtrennung des Krankhaften von dem Gesunden, Hülfe versprechenden Operation, und müssen hierbey zuerst die Frage aufwerfen, ob überhaupt man berechtigt sey, von der Operation hier wahrhafte Heilung zu erwarten, welches, so lange man den örtlich kranken Zustand als bloßes Produkt allgemeiner Abnormität ansieht, wohl verneint werden müßte. Aus den Untersuchungen über die Entstehung des Krebsgeschwürs hatte sich indeß ergeben, daß, wenn dieselbe auch allerdings zum Theil durch das Allgemeine bedingt werde, doch auch eine bedeutende Reaction auf das Allgemeine Statt finde, und wir können hieraus folgern, daß, wenn auch das bloße Hinwegschaffen der krankhaft umgeänderten Partie nicht als vollkommen die Heilung bewerkstelligend zu betrachten sey, doch diese dadurch in einem wesentlichen Theile vollbracht und das gesammte Heilungsgeschäft ausnehmend begünstigt werden könne.

§. 463.

Im Allgemeinen wird sonach die Operation um so mehr leisten, a) je lokaler die Entstehung des Uebels ist (z. B. wo sie bloß von Druck eines Mutterkranzes abhing); b) je weniger dasselbe sich bereits ausgebreitet hat, und jemehr es auf einen oder einige Punkte der Vaginalportion eingeschränkt ist; c) je mehr die Krankheit noch auf der Stufe bloßer skirrhöser Induration verweilt, je neuer folglich ihre Entstehung ist; d) je besser die allgemeine körperliche Constitution ist, und je weniger von dieser Seite aus, etwa durch langwierige Störungen im Lymphsystem u. s. w. zur Entstehung der örtlichen Abnormität beygetragen worden war; e) je günstiger die äußern Verhältnisse einer weitern zweckmäßigen Einrichtung von Diät und Lebensordnung sind, um auf diesem

Wege und unter Zuziehung zweckmäßiger Arzneymittel die Herstellung eines allgemeinen Normalzustandes zu erlangen.

§. 464.

Findet das Gegentheil von den im vorigen Paragraph namhaft gemachten Punkten Statt, ist namentlich das Krebsgeschwür bereits ausgebrochen, so wird der Erfolg der Operation um so unsicherer; ja man darf behaupten, daß sie gar nicht mehr vorzunehmen sey, sobald a) bereits die dem Uterus benachbarten Organe von der geschwürigen Zerstörung mit befallen sind; b) bey offenem Krebsgeschwür die allgemeinen organischen Systeme dergestalt erkrankt sind, daß theils Wiedereintritt der krankhaften örtlichen Metamorphose (als Produkt allgemeinen Krankseyns) zu befürchten steht, theils selbst die Heilung und Regeneration der operirten Stelle nicht zu erwarten ist.

§. 465.

Die Operationsmethoden selbst lassen sich eintheilen in diejenigen, welche die Abtrennung der erkrankten Stelle allein, und in diejenigen, welche die Ausrottung des ganzen Organs zum Zweck haben. — Zu den erstern gehören die beiden Methoden des Hrn. Hofrath Osiander, welchem das Verdienst zukommt, in neuerer Zeit zuerst darauf, daß bey diesem fürchterlichen Uebel durch die Operation doch zuweilen Hülfe möglich bleibe, aufmerksam gemacht und seine Empfehlung durch die That bewiesen zu haben. — Die Schwierigkeit der Operation wird nämlich hierbey vorzüglich durch die Verborgenheit des Ortes, an welchem operirt werden muß, gebildet, und fällt daher größtentheils hinweg unter den Umständen, wo der Uterus bereits tief in das kleine Becken, oder vor die äußern Geburtstheile herabgetreten ist, so daß daher auch in diesem Falle wenig anders bey der Exstirpation eines Gebärmutterskirrhus zu verfahren seyn würde, als den Regeln der Chirurgie gemäß bey Ausrottung krebshafter Stellen in andern Körpertheilen zu verfahren ist. Die Osiander'sche Methode bezieht sich daher vornehmlich darauf, die

Schwierigkeit der Exstirpation des Krankhaften bey nicht vorgefallenem Uterus zu überwinden, und die deßhalb von ihm vorgeschlagenen und ausgeführten Operationsmethoden sind nachstehende, welche wir hier der Vollständigkeit wegen ganz so, wie sie zuerst bekannt gemacht wurden,*) mittheilen wollen:

Erste Operationsart.

„Die zu operirende Person wird auf einen hohen Geburtsstuhl oder auf einen Tisch wie in eine Entbindungs- oder Steinschnittslage gebracht und festgehalten. Die Genitalien werden durch Ausspritzen gereiniget und mit Salben erweicht. Das Fungöse wird mit den Fingern oder einem Exstirpations-Instrumente weggenommen. Ist die Blutung darauf stark, so wird sie mit einem eingebrachten Schwamme, in Essig und styptisches Pulver getaucht, gestillt; wo nicht, so wird gleich mit der Operation fortgefahren. Zu dem Durchstechen des Uterus bedient sich Hr. Hofr. D. kleiner gebogener Nadeln von nicht gehärtetem Stahl, deren Spitzen sich leicht biegen lassen. Gehärtete Nadeln setzen in die Gefahr, daß sie abbrechen, und die abgebrochenen Spitzen alsdann in den verborgenen Theilen vielleicht nie wieder aufgefunden werden, aber den größten Schaden anrichten könnten. Das Durchstechen der Nadeln durch den Uterus macht, bis man sich durch Uebung die nöthige Fertigkeit erworben hat, die größte Schwierigkeit; wie weit man es aber darin bringen kann, beweiset unter andern der Umstand, daß, als im verwichenen Jahre bey einer öffentlichen Operation in dem hiesigen Accouchier-Hospital sich der Fall ereignete, daß die durchgezogenen Faden aus der bereits im Uterus steckenden Nadel ausgezogen wurden, der Hr. Hofr. D. die Nadel stecken ließ und die Faden innerhalb der Vagina durch das Nadelöhr führte, ohne sich eines Lichtleiters zu bedienen. Der sehende Operateur kann und muß in solchen Fällen eben die Präcision und Geschicklichkeit durch Uebung bekommen, welche sich viele Blinde erwerben, da er ohnehin ganz wie ein Blinder handeln muß. Ein Nadelhalter kommt nur bey dem Einführen der Nadeln, sonst nicht, zu statten; das übrige Durchstechen müssen die Finger allein, so wie alles Uebrige, nach dem Gefühl unterscheiden. Die Stiche gehen sowohl von hinten nach vorn, als von vorn nach hinten und von der Seite.

*) S. Salzburg. medicin. chirurg. Zeitung. 1813. Nro. 88.

Die gröſte Vorſicht iſt nothwendig, daß die Nadeln nicht zu weit gehen, ſich in dem Muttergang anhaken, oder in eins von den arteriöſen oder groſsen venöſen Gefäſsen hinter der Vaginalhaut kommen. Dies zu verhüten, muß der Operateur ſeine Finger Preis geben, die Spitzen der hervorſtechenden Nadel ſogleich mit der Fingerſpitze umbiegen, und mit einer kleinen Zange faſſen und anziehen. Ohne Nadelſtiche in die Finger geht es dabey nicht ab, und man ſollte glauben, da nachher die Finger noch lange in der ſcharfen Jauche arbeiten müſſen, eine gefährliche Anſteckung ſey unvermeidlich. Der Hr. Hofr. O. iſt aber davon immer frey geblieben, indem er gleich nach geendigter Operation die Hände wiederholt mit Seife wäſcht, dann die Stichwunden mit verdünntem Laugenſalze auswäſcht und zuletzt anhaltend ausſaugt, ohne nachher auf die Wunden etwas Eitermachendes zu legen. Nach vier bis ſechs Tagen ſind die Stichwunden ohne alle weitere Folgen heil. Durch die Nadeln wird vierfacher gewichster Zwirn gezogen. Manchmal ſind zwey durchgezogene Fäden hinreichend, die Gebärmutter in den Muttergang herabzuziehen; ein ander Mal erfodert der Umfang vier Fäden. Eine irrige Vorſtellung haben manche Aerzte von dieſer Operation, welche glauben, die Gebärmutter müſſe vor den Leib herausgezogen und zum gänzlichen Vorfallen gebracht werden. Eben ſo irrig iſt diejenige Vorſtellung, nach welcher einige glauben, die ganze Gebärmutter werde ausgeſchnitten, und deßwegen die Operation des Mutterkrebſes als unmöglich läugneten oder verwarfen. Durch die Fäden wird nun der ganze Uterus in der Tiefe der Vagina zum Abſchneiden fixirt. Das tiefe Herabziehen wird aber zuweilen durch das Verwachſen des äußern Muttergrundes mit dem Netze ſehr erſchwert. — Als neulich, aus gleicher Urſache der Uterus nicht in die Tiefe herab dem Ziehen an den Fäden folgen wollte, die Fäden ſelbſt aber bey dem Einführen des Biſtouri aus Verſehen durchſchnitten wurden, ſo ergriff der Hr. Hofr. O. geſchwind eine Blaſenſteinzange, faßte den Uterus am Orificio damit und ſchnitt den Cervix ab. Das Krebshafte und Skirrhöſe braucht nur bis auf das Geſunde ausgeſchnitten zu werden. Das Geſunde unterſcheidet man nach dem Gefühl durch die glattere Oberfläche und elaſtiſche Feſtigkeit von den rauhen und holzartigen Skirrhoſitäten. Das gebogene Biſtouri muß ſchmal und ſtark, ſcharfſchneidend, vorn abgerundet ſeyn, dicht auf den Cervix und ſo hoch wie möglich geführt werden, während ein Gehülfe die Lefzen der Geſchlechtstheile von einander hält. — Der Schnitt wird im Bogen geführt: erſt kräftig, dann langſam, um die Vagina nicht zu verletzen.

Die zweyte Operationsart ist folgende: Wenn der Cervix bereits größtentheils vom Krebsschwamme zernichtet, weit ausgedehnt, und die Höhle voll höckerichten carcinomatösen Schwammes ist, die Gebärmutter sich nicht mehr mit der Nadel fassen und herabziehen läßt: so bringt er die zu operirende Kranke in eine horizontale Lage, läßt einen Gehülfen mit der Faust, auf die Gegend des Fundi uteri gelegt, die Gebärmutter herabdrücken, fixirt den Muttergrund in der Aushöhlung des Ossis sacri mit dem Zeigefinger der linken Hand; den Mittelfinger und Goldfinger steckt er in die die Gebärmutter und schneidet nun, während diese Finger die Scheerenschnitte leiten, mit einer aufs Blatt gebogenen Scheere und seinem Exstirpations-Instrumente alles Schwammige, Unebne und Stirrhöse in kleinen Stücken aus. Sobald dies geschehen ist, füllt er die Höhle mit Badeschwamm, welcher in Wein und das gemeldete styptische Pulver getaucht worden, aus, und verfährt bey der Heilung auf die bereits erwähnte Weise. Diese Operation ist, nach der Aussage aller Frauen, welche sie ausdielten, lange nicht so schmerzhaft, als man sich vorstellt, und die Heilung geht über alle Erwartung schnell vor sich. Die Natur scheint bey keinem Theile des menschlichen Körpers in Reproduction des Verlornen und Heilung des Verletzten thätiger zu seyn, als bey den Zeugungstheilen beyderley Geschlechts. Mit Erstaunen sieht man z. B. in vier Wochen ein durch Brand verlornes Scrotum wieder ersetzt, und mit Verwunderung den völlig abgeschnittenen Cervix zu einem Quasi-Muttermund in wenigen Wochen regenerirt, und aus dem restirenden halben Uterus nach wenigen Wochen die Menstruation wieder regelmäßig hervorfließen. Die Dauer der Heilung ist sehr verschieden, so wie sie es bey allen Krebs-Operationen zu seyn pflegt. — Ein Umstand und Erfahrungs-Resultat ist schon von großer Wichtigkeit, nämlich daß bey dieser mit so großer Schwierigkeit im Verborgenen zu unternehmenden Operation bis jetzt nicht eine Operirte während der Operation oder in und während der Heilung gestorben ist. Alle heilten erst, und einige starben nach Jahr und Tag an ganz andern Zufällen, wie Nervenschlag, Wassersucht u. dergl., oder das Uebel erneuerte sich bey neuer Ursache plötzlich wieder, und nahm schnell und unheilbar überhand; andere blieben drey und mehrere Jahre lang gesund."

§. 466.

Als Gegner dieser Methode, partielle Ausrottungen des Krankhaften im Uterus vorzunehmen, zeigte sich nun vorzüg-

lich Hr. Geheimerrath v. Wenzel,*) indem er der Meynung ist, daß eine so vollkommen örtliche skirrhöse oder carcinomatöse Metamorphose einer Uterinpartie überhaupt wohl nie vorkomme, ohne daß nicht wenigstens die benachbarten Gefäße und Nerven desselben Organs zum Theil schon mit afficirt wären, so daß, selbst wenn ja das Skirrhöse wirklich ausgerottet worden, doch von dem Zustande der übrigen Partien wegen nicht regelmäßig zu erwartender Entzündung und Eiterung **) keine günstige Heilung zu hoffen sey. Derselbe dringt daher, so lange überhaupt nur der Uterus der Sitz der Krankheit ist, auf die Ausrottung des ganzen Organs, und zwar zugleich mit den Muttertrompeten und Ovarien, und zwar so, daß erst ein künstlicher Vorfall des Uterus, durch Herabziehen mittelst einer Polypenzange etwa, bewerkstelligt werde, dann aber der vorgefallene Uterus, oberhalb seines Grundes, durch eine angelegte und nach und nach zugezogene Ligatur so abgebunden werde, wie wir die Ausrottung polypöser Geschwülste vornehmen. — Diese Operation ist indeß von H. v. Wenzel selbst noch nicht unternommen worden, und jeder, der die mit einer Abhiudung so wichtiger Theile nothwendig verknüpfte bedeutende Gefahr erwägen will, möchte wohl etwas zögern, der erste zu seyn, welcher seine Kranke einer so heroischen Behandlung unterwirft. — Zu erinnern ist indeß noch, daß auch Hr. v. Siebold ***) nach Struve bereits den Vorschlag gethan hat, den vorgefallenen, bereits zu sehr von krankhafter Metamorphose ergriffenen Uterus entweder nach und nach aus dem Scheidengewölbe heraus zu präpariren und dieses zu heften, oder auch oberhalb des vorgefallenen Uterus eine Ligatur anzulegen und dann den ganzen Uterus mit dem Pott'schen Bistouri oder einem ähnlichen Instrumente abzuschneiden.

---

*) M. s. hierüber den ganzen XXV. Abschn. d. Werkes über d. Krankheiten des Uterus.

**) Das. S. 150.

***) Handb. der Frauenzimmerkrankheiten. Bd. I. S. 504.

§. 467.

Ferner gehört zu den Vorschlägen zur Exstirpation der ganzen Gebärmutter, welche aus der freilich durch sehr Vieles begründeten Ansicht hervorgehen, daß theilweise Ausrottung keine entschiedene Hülfe gewähren könne, die Methode des Dr. Gutberlet,*) welche indeß ebenfalls noch in der Wirklichkeit nicht ausgeführt worden ist, und auch wohl ihrer offenbar noch größern Gefahr wegen noch weniger ausgeführt werden möchte und dürfte. Hier nämlich soll zuerst der Bauchschnitt gemacht, die Gebärmutter sodann durch eine von dem Erfinder sogenannte elliptische Hohlsonde aufgehoben und auf dieser Sonde von oben herab aus ihren Verbindungen getrennt werden, wobey denn die Arteriae iliacae durch einen Gehülfen zusammengedrückt werden sollen, um erst nach und nach die größern Gefäße unterbinden zu können. Die Gebärmutter selbst wird sonach durch die Bauchwunde entfernt und dann ein mit styptischen Mitteln befeuchteter Schwamm durch die Mutterscheide eingebracht.

§. 468.

Bey so verschiedenen, bloß vorgeschlagenen Operationsmethoden muß sonach ein Fall besondere Bemerkung verdienen, wo der gesammte carcinomatöse Uterus auf eine von den oben erwähnten vorgeschlagenen Methoden verschiedene Weise neuerlich wirklich ausgerottet worden ist, und ich füge daher die kurze Erzählung dieses Falles, welchen wir Hrn. Hofr. Langenbeck**) verdanken, hier bey, um für künftige ähnliche Fälle doch einen sichern Fingerzeig zu geben:

---

*) S. v. Siebold's Journal für Geburtshülfe u. s. w. Bd. I. St. 2. S. 228.

**) Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie v. C. J. M. Langenbeck, Bd. I. St. 3. S. 461.

„Vor vier Jahren (erzählt Hr. Langenbeck) bekam ich Nachricht von dem Hrn. General-Chirurgus Kirchmeyer in Cassel, daß eine Frau in Cassel am Carcinoma uteri leide, und der ganze degenerirte Uterus vorgefallen sey, deßwegen er glaube, daß die Exstirpation sich gut machen lasse. Die Frau O., einige 50 Jahr alt, hatte schon lange an Schmerzen, Brennen und Stechen in der Gebärmutter gelitten; nach und nach war diese herunter getreten; es zeigte sich nun ein Abfluß übel riechender Jauche, wovon die Haut der benachbarten Theile wund ward. Die beym Carcinom charakteristischen, brennenden, stechenden Schmerzen nahmen so sehr zu, daß die Frau sehnlichst wünschte, durch eine Operation von ihrem Leiden befreyt zu werden. Bey meiner Untersuchung fand ich alles bestätigt. Die Portio vaginalis ragte etwas über die Labia maiora hinaus. Die Labia orificii uteri waren steinhart, das Orificium roth und ulcerirt; aus dem Orificio floß Jauche; an den Labiis orificii zeigten sich Ulcerationen; durch die innere Wand der Vagina fühlte ich den Uterus steinhart, höckericht und sehr vergrößert. Das allgemeine Befinden war noch ziemlich gut, so daß ich die Exstirpation unternehmen konnte. Ich stimmte daher sogleich mit dem Hrn. General-Chirurgus Kirchmeyer für die Exstirpation, die ich am folgenden Tage auf folgende Weise vornahm: Die Frau ward auf den Rand des Bettes gelegt, und beyde Füße auf Stühle gestellt. Ich setzte mich zwischen beyde Schenkel, präparirte mit einem Scalpell, mit Beyhülfe der Pincette, die hervorgetriebene Vagina von ihrer Verbindung mit dem Uterus ab, ohne jedoch die Vagina zu durchschneiden. Nun kam ich zu dem Theile des Uterus, der gleichsam, von vorn betrachtet, in das Peritonäum wie in ein Tuch hineingesteckt ist. Ich trennte ebenfalls sehr genau von der Substanz der Gebärmutter das Peritonäum, ohne es zu durchschneiden, weil sonst Gedärme hätten herausfallen können, und zog den Uterus immer weiter heraus. Diese Trennung setzte ich fort bis an den obern abgerundeten Rand des Fundus uteri, und schnitt nun den Uterus vom Peritonäo ab, welches mit ganz gesund zu seyn schien. Es war dies folglich eine wahre Ausschälung des Uterus aus dem Bauchfelle, so daß dasselbe in Verbindung mit der Vagina, einen leeren Beutel bildete. Die Blutung war sehr stark, und mußte durch Unterbindung gestillt werden. Dies war das schwerste Geschäft, da der Hr. Gen. Chirurg. K., welcher zwar bey der Operation gegenwärtig war, mir dabey nicht helfen konnte, weil er am Podagra litt. Ich hielt daher die blutende Fläche mit der linken Hand fest, umstach sie mit Nadel und Faden, schlug mit den Fingern der rechten Hand die Schlinge,

zog mit der rechten Hand das eine Ende des Fadens an und das andere mit den Zähnen. Auf diese Weise wurden vier Ligaturen angelegt, worauf die Blutung stand. Nach der Operation war die Operirte sehr schwach, erholte sich aber bald wieder. Das Cavum ward mit Charpie ausgefüllt. Die Heilung ging rasch von Statten, und die Kranke ist bis auf diesen Augenblick vollkommen gesund. Das Peritonaeum und die Vagina haben sich so stark contrahirt, daß, wenn man die Labia majora auseinander zieht, man nicht den Finger hinaufbringen kann, sondern man sieht eine fest benarbte Haut, als wäre es eine Imperforatio vulvae. Mit dem herausgenommenen Uterus waren in Verbindung die Ovaria und die abgeschnittenen Ligamenta rotunda.

§. 469.

Noch wäre nun die Frage aufzuwerfen, ob außer und nach der Operation, einem Mittel, welches bey dem Gebärmutterkrebs, gleich allen andern, nur selten helfen kann und noch seltener wirklich geholfen hat, noch etwas durch innere oder äußere dynamische Mittel zu wirken sey? — H. Osiander empfiehlt nämlich die, nach der auf seine Weise verrichteten Operation rückbleibenden Verhärtungen nach und nach durch den Gebrauch resolvirender Mittel, vorzüglich der Aqua laurocerasi, wo möglich zu erweichen und so die Heilung zu beendigen; allein mit Recht zweifelt man wohl an dem Gelingen dieser Behandlung, wenn man erwägt, wie wenig bey andern äußerlichen und folglich genauer zu beobachtenden Krebsschäden die bloß partielle Ausrottung nützt; und man darf folglich wohl den Satz aufstellen, daß überhaupt die Operation nur dann gründliche Heilung hoffen lassen werde, wenn alles Krankhafte wirklich ausgerottet worden ist, daß aber auch nach einer solchen vollständig verrichteten Operation ein weiteres Heilverfahren überflüssig werde, außer daß man sich bemühe, die Ursachen, welche, vom allgemeinen Befinden ausgehend, die Heilung erschweren (als Fehler des Lymphsystems u. s. w.) zu beseitigen und die Reproduction immer regelmäßiger und vollkommner wiederherzustellen.

B. Abnorme Lagen der nicht schwangern Gebärmutter.

I.

Vorfall der nicht schwangern Gebärmutter (Prolapsus, Procidentia, Descensus uteri).

§. 470.

Wenn die Gebärmutter, deren normale Lage zwischen die Gegend des Beckeneinganges und die eingebildete Fläche, in welcher wir die Beckenhöhle messen, und zwar mit ihrer Längenachse in die Führungslinie fällt, merklich tiefer in das kleine Becken herabgetreten ist, so bezeichnen wir diese Regelwidrigkeit mit dem Namen des Gebärmuttervorfalls.

§. 471.

Der Gebärmuttervorfall wird, je nachdem die Lage des Uterus mehr oder weniger von der Norm abweicht, in verschiedene Grade eingetheilt. Bleibt nämlich die Gebärmutter zwischen der mittlern Fläche der Beckenhöhle und dem Ausgange derselben, so ist es ein unvollkommner Gebärmuttervorfall (Descensus s. Prolapsus uteri incompletus); tritt dagegen der Uterus aus der Beckenhöhle hervor und zwischen die äußern Geburtstheile herein oder durch sie hindurch, so ist es ein vollkommner Vorfall (Prolapsus completus s. Procidentia uteri). — Bey einem jeden bedeutenden Gebärmuttervorfall ist übrigens zugleich die Lage der Mutterscheide verändert, sie ist zum Theil oder vollkommen umgestülpt, und sobald sie auf diese Weise, gleichsam als äußere Decke des Gebärmutterkörpers, beträchtlich mit aus den Geburtstheilen hervorragt, erleidet gewöhnlich die Struktur ihrer innern Wand selbst eine ganz merkwürdige Veränderung, indem die Schleimhaut derselben mit einer wahren Epidermis sich

überzieht, und Muttermund und umgestülpte Scheide, welche dann zuweilen fast das Ansehen eines männlichen Gliedes erhalten, alsbald völlig die Farbe der innern Schenkelfläche annehmen. Eine Erscheinung, welche für die Bildungsgeschichte der Oberhaut, von welcher späterhin die Rede seyn wird, nicht unwichtig ist.

§. 472.

Hat ein bedeutender Vorfall der Gebärmutter längere Zeit Statt gehabt, so ist gewöhnlich auch die Substanz des Uterus verändert, aufgeschwollen und oft leicht blutend. Uebrigens ist der Vorfall des Uterus entweder beweglich und leicht zurückzubringen, oder nicht. Das Letztere tritt gewöhnlich nur bey sehr veralteten Vorfällen ein, wo dann am obern Theile des Uterus selbst mit der umgestülpten Vagina sich Verwachsungen zu bilden scheinen, die die Reposition durchaus hindern.

§. 473.

Die Zufälle, welche den Gebärmuttervorfall begleiten und ihm zum Theil als Zeichen dienen, sind Empfindungen von Druck und Spannung in der Beckengegend, vorzüglich bey längerem Stillstehen oder Gehen, Hinderungen in den Ausleerungen des Mastdarms und der Harnblase, welche letztere Ausleerung oft nur in den Frühstunden, oder während der Rückenlage, oder nach Aufhebung des Uterus, durch zwey eingebrachte Finger leichter von Statten geht. Sinkt der Uterus noch mehr herab, so nimmt das Gefühl der Pressung noch mehr zu, obwohl der Schmerz, durch Spannung der dem obern Theile des Uterus angehefteten Theile erregt, nach und nach durch größere Erschlaffung sowohl, als durch Gewöhnung sich mindert; zugleich schwillt oft der Uterus an, und es zeigt sich Leukorrhöe. Noch mehr werden diese Zufälle gesteigert, wenn die Gebärmutter ganz aus den Geburtstheilen hervortritt und so Harnblase, Mastdarm, Mutterröhren und Eyerstöcke gewaltsam aus ihrer Lage bringt, und außerdem treten denn hierbey leicht Excoriationen, Ver-

härtung und Verdickung der Scheidenwand, so wie selbst krebsartige Beschaffenheit der Vaginalportion ein.

§. 474.

Zu erkennen ist im Ganzen der Gebärmuttervorfall sehr leicht durch genau angestellte geburtshülfliche Untersuchung, wobey man jedoch die Vorsicht brauchen muß, bey kleinern Vorfällen, welche zuweilen in der Rückenlage gänzlich zurückgehen und daher in den Morgenstunden mitunter selbst nach angenommener aufrechter Stellung nicht mehr bemerkt werden, stets in aufrechter Stellung und nachdem die Kranke schon einige Zeit außer dem Bette sich befunden hat, die Untersuchung vorzunehmen. Ohne sorgfältige innere Untersuchung hingegen wird das Uebel allerdings öfters verkannt, und oft ein bloßes Symptom desselben, z. B. weißer Fluß oder Blutung, für die eigentliche Krankheit genommen, oder aber man schließt wohl auch aus der Empfindung des Drängens in den Geburtstheilen, aus der Verstopfung u. s. w. auf einen Vorfall, wo keiner vorhanden ist, sondern diese Beschwerden von Hämorrhoidalcongestionen u. s. w. abhängen. Endlich könnte auch wohl der theils bey der Menstruation, theils in dem zweyten Schwangerschaftsmonat regelmäßig etwas tiefer stehende Uterus für vorgefallen gehalten werden, welcher Irrthum jedoch durch gehörige Berücksichtigung der übrigen Umstände und kurze Beobachtung des Uebels bald berichtigt werden kann. Eben so leicht ist es, den stärkern Gebärmuttervorfall nach den oben angegebenen Zeichen von dem Gebärmutterpolypen oder von der Umstülpung des Uterus (wovon weiter unten) zu unterscheiden, indem er sich immer durch den am untersten Ende der Geschwulst fühlbaren quergespaltnen Muttermund hinlänglich charakterisirt.

§. 475.

Aetiologie. Das Wesentliche des Uebels besteht immer in abnormer Verlängerung, Erschlaffung und Ausdehnung der Gebärmutterbänder. Die entfernten veranlassenden sowohl als Gelegenheitsursachen sind sehr verschieden-

Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß Vorfälle der Gebärmutter bey Personen, welche noch nie geboren haben, überhaupt selten vorkommen und fast nie sehr bedeutend sind, daß ferner schlaffer, phlegmatischer Habitus, ein weites und wenig geneigtes Becken, und namentlich alles, was den Tonus der Geburtstheile schwächt, zu dieser regelwidrigen Lage disponirt. Hierher gehören öfters wiederkehrende bedeutende Blutungen, Leukorrhöe, der Gebrauch von Kohlentöpfen, zu warmen örtlichen oder allgemeinen Bädern, unzeitige Geburten und überhaupt zu bald auf einander folgende Wochenbetten.

§. 476.

Im je größeren Maaße nun diese disponirenden Momente Statt gefunden haben, um so leichter wird durch die jetzt namhaft zu machenden Gelegenheitsursachen die Krankheit selbst zu Stande kommen. Hierhin gehören aber Unachtsamkeit und zu zeitiges Aufstehen im Wochenbett (eine der häufigsten Veranlassungen zu Vorfällen), heftiges Pressen während der Geburt selbst, vorzüglich bey nicht hinlänglich eröffnetem Muttermunde, oder bey dem Abgange der Nachgeburt, oder endlich beym Stuhlgange in den ersten Tagen des Wochenbettes. Ferner anstrengendes, öfter wiederkehrendes Erbrechen, oder Husten, anhaltender Durchfall mit starkem Tenesmus, anstrengende Arbeit, das Heben schwerer Lasten, Springen u. dgl., durch welche Momente zuweilen sogar plötzlich und ohne vorhergegangene wesentliche Disposition ein Gebärmuttervorfall zu Stande kommen kann, welcher indeß dann auch nur so stärkere Zufälle hervorzubringen pflegt und zu Entstehung von Entzündung, Fieber, Schwindel u. s. w. Veranlassung geben kann. Endlich kann auch durch den Druck von unzweckmäßigen Kleidungsstücken, zu weit herabragenden und zu fest anliegenden Schnürbrüsten, oder durch Druck von abnormen Vergrößerungen benachbarter Theile, also bey Ausartungen der Eyerstöcke, der Gebärmuttervorfall zu Stande kommen.*)

*) M. s. einen merkwürdigen Fall, wo ein großer, späterhin durch

§. 477.

Die Prognose richtet sich bey diesem Uebel nach dem Grade, nach der Dauer und der Entstehungsweise desselben. Ein unvollkommner, beweglicher, erst in Folge von Schwäche neuentstandener Vorfall macht im Ganzen wenig Beschwerde, nimmt jedoch in der Regel nach und nach immer mehr zu, und fordert daher baldige Beseitigung; ein beträchtlicher Vorfall hingegen stört oft nicht nur die Sexualfunctionen bedeutend, sondern wird durch Veranlassung zu Ausartung der Uterinsubstanz sogar gefährlich, so wie zugleich die Möglichkeit radicaler Heilung sich immer mehr verringert. Ein Vorfall des Uterus endlich, welcher bereits Vergrößerung der Uterinsubstanz und regelwidrige Verwachsungen desselben mit benachbarten Theilen zur Folge gehabt hat, ist nicht nur unheilbar, sondern auch durch immer weiter gehende Degenerationen, Blutergießungen u. s. w. oft gefährlich.

§. 478.

In der Behandlung des Gebärmuttervorfalls verdienen nun insbesondre drey Indicationen Erwägung: 1) die dringendsten Krankheitszustände, welche durch den Vorfall veranlaßt wurden, zu beseitigen und die etwa noch fortwirkenden Gelegenheitsursachen desselben zu heben; 2) den vorgefallnen Uterus in seine natürliche Lage zurückzuführen, und 3) ihn in dieser Lage theils durch Hebung der nächsten Krankheitsursache, d. i. der Erschlaffung seiner Bänder, theils durch mechanische Unterstützungsmittel zu erhalten.

§. 479.

Die Erfüllung der ersten Indication richtet sich nach der Natur der durch den Vorfall veranlaßten Zufälle. Bey

---

den Mastdarm sich entleerender Eitersack den Vorfall herabdrängte, in den allgemeinen medicin. Annalen 1811. Annal. der Heilkunst S. 841.

einer in Folge plötzlicher Dislocation oder allmähliger Vergrößerung und Einklemmung entstandenen entzündlichen Reizung des Uterus, wird der antiphlogistische Heilapparat und selbst Blutentziehung eintreten müssen; Bäder, örtliche Fomentationen aus erweichenden, oder, bey mehr schwammiger Auftreibung, aus bittern und narkotischen Kräutern, bey großer Schmerzhaftigkeit aus warmer Milch mit Laudanum, oder aus warmem Oleum Hyoscyami, bey Excoriationen des Uterus und der Scheide aus dem nach Befinden mit den erwähnten Aufgüssen zu verdünnenden Bleywasser, sind außerdem nützlich. Zugleich sucht man alles, was das Herabpressen des Uterus vermehrt und unterhält, zu entfernen, wohin vorzüglich Erbrechen, Husten und Stuhlzwang zu rechnen sind, welche theils palliativ durch demulcirende beruhigende Mittel gemildert, theils nach ihrer Entstehung behandelt werden müssen.

§. 480.

Sind nun die Rücksichten, welche die erste Indication fordert, genommen, oder waren überhaupt keine Zufälle dieser Art vorhanden, welche eine besondere Behandlung nöthig machen, so schreitet man zur Erfüllung der zweyten Indication, nämlich zur Reposition des Vorfalls. Hierbey wird nun das Verfahren verschieden seyn, je nachdem der Vorfall mehr oder minder bedeutend ist. Ein kleiner Vorfall nämlich weicht oft schon von selbst zurück, so wie die Kranke die horizontale Lage annimmt, oder durch den wie zur Untersuchung eingebrachten Zeigefinger noch etwas mehr zurückgedrängt wird, um einen größern, namentlich einen completten Vorfall zurückzubringen, wird hingegen ein etwas zusammengesetzteres Verfahren nothwendig. Man läßt zu diesem Ende der Kranken, am besten gleich früh, bevor sie das Bett verlassen hat, durch ein Lavement den Stuhl entleeren, so wie für Entleerung der Blase, entweder auf natürlichem oder künstlichem Wege, zu sorgen ist. Hierauf bringt man dieselbe auf ein Lager, wo durch eine in der Kreuzgegend untergeschobene Rolle eine mäßige Erhöhung hervorgebracht worden ist, bestreicht dann, wenn der Uterus noch innerhalb

der Scheide liegt, den Zeige- und Mittelfinger mit Oehl, bringt sie in die Vagina ein und drängt behutsam und der Führungslinie gemäß den Uterus mittelst angesetzten Fingerspitzen an der Vaginalportion in seine regelmäßige Lage zurück.

§. 481.

Liegt der Uterus völlig außerhalb der Geschlechtstheile, so bestreicht man denselben erst mit Oehl, setzt dann Daumen, Zeige-, Mittel- und vierten Finger rings an die Vaginalportion, und drängt nun vorsichtig, und indem man den Uterus dabey gelind drehend hin und her bewegt, denselben in die Tiefe des Beckens und in seine regelmäßige Lage zurück, indem man zugleich darauf achtet, ob die Reposition etwa heftige Schmerzen, welche auf Druck wichtiger, dem Uterus vielleicht schon nachgesunkener Theile hinweisen, verursacht, in welchem Falle man lieber die Reposition nicht vollkommen macht, sondern gradweise vollbringt, so daß man zuvörderst den Uterus nur in der Vagina zu erhalten und erst nach einiger Zeit ihn weiter herauf zu führen sucht. Wird der Vorfall durch Druck ausgearteter Organe in der Beckenhöhle und erfolgte Verwachsungen unterhalten, so hüte man sich, nicht durch Gewalt die Reposition vollbringen zu wollen, sondern es muß, sobald man sich sicher hiervon überzeugt hat, der Vorfall als unheilbar betrachtet werden, als welches zwar selten, aber doch mitunter vorkommt.

§. 482.

Die Erfüllung der dritten Indication, welche die Erhaltung in der normalen Lage bezweckt, ist gleichfalls nach dem Grade des Uebels verschieden. Ist es ein nicht bedeutender, neuentstandener Gebärmuttervorfall, so ist es zu erwarten, daß die radicale Heilung durch Wiederherstellung einer normalen Spannung der Uterinbänder gelingen werde, und dann muß zuvörderst für 2 bis 3 Wochen die horizontale Lage zur Pflicht gemacht, und durch den Apparat tonischer Mittel die Contractilität der Faser befördert werden.

Hierher gehören: 1) Injectionen von Abkochungen der Salvia, des Serpillum, Absinthium, der Eichen-, Ulmen- oder Weidenrinde, auch wohl mit etwas rothem Wein oder Alaunauflösung versetzt; 2) Einreibung spirituöser Mittel auf den Unterleib, Tragen des aromatischen Pflasters auf der regio hypogastrica u. s. w.; 3) Einbringung eines Schwammes in die Vagina, welcher mit den genannten bittern und adstringirenden Mitteln befeuchtet wird, oder eines Säckchens mit Eichenrindenpulver gefüllt und mit rothem Weine besprengt.

§. 483.

Kann man nun hoffen, daß durch diese Maaßregeln die Erschlaffung der Gebärmutterbänder und Scheidenwände gehoben sey, so erlaubt man der Kranken etwas aufzustehen, und achtet darauf, ob bey aufrechter Stellung und bey gelinder willkührlicher Pressung der Bauchmuskeln der Vorfall nicht von neuem erscheint. Ist dies nun nicht der Fall, so läßt man die Kranke allmählig länger auf seyn, warnt indeß vor allen heftigen und anstrengenden Bewegungen, nimmt Rücksicht auf Erhaltung leichter und natürlicher Harn- und Stuhlausleerungen (bey denen alles Pressen streng zu untersagen ist), und fährt noch einige Zeit mit Anwendung des örtlich die Contraktilität erhöhenden Apparats fort.

§. 484.

Wo dagegen der Vorfall überhaupt zu veraltet ist, als daß man auf dem angegebenen Wege dessen Heilung erwarten dürfte, oder auch die angezeigte Methode fruchtlos geblieben ist, fordert das Uebel ein Mittel, welches wenigstens die mit der tief herabgetretenen Gebärmutter nothwendig verbundenen Beschwerden etwas mindert. Dieses wird bewirkt durch eine mechanische Unterstützung des Uterus, zu deren Ausführung man sehr verschiedene Mittel in Vorschlag gebracht hat. Eins der zweckmäßigsten zu diesem Behuf ist die schon erwähnte Einbringung eines hinlänglich großen Schwammes in die Vagina, bey welchem alle nachtheilige

Reizung der Vaginalportion wegfällt und man zugleich durch Befeuchten des Schwammes mit einem Eichenrindendekokt und etwas rothem Wein zur vollkommnen Heilung immerfort beytragen kann. — Ein solcher Schwamm muß an seinem untern dünnern Ende mit einer Schlinge versehen seyn, theils um ihn bequem herausnehmen zu können (welches überhaupt, namentlich aber zur Zeit der monatlichen Reinigung öfters geschehen muß), theils um ihn an eine Leibbinde mit zwischen den Schenkeln locker durchgezogenem Bande (ohngefähr wie der Beinriemen an einem Bruchbande) etwas befestigen zu können, wodurch man theils das Hervordrängen des Schwammes in Folge von Vaginalkrampf, oder in Folge beträchtlicher Erweiterung der rima genitalium bey vielleicht früher Statt gehabten Einrissen des Mittelfleisches verhindern kann (in welchem letztern Falle man zur Verhinderung des Hervordrängens durch eine vor die Geburtstheile gelegte Compresse noch mehr beytragen kann), theils auf alle Weise das Herausfallen des Schwammes im Gehen zu verhüten ist.

§. 485.

Wo indeß der Schwamm keine hinlängliche Unterstützung gewährt, was vorzüglich bey einem schon Jahre lang bestehenden sehr bedeutenden Gebärmuttervorfalle und bey sehr weitem Becken eintreten wird, ist man genöthigt, auf festere Unterstützungsmittel zu denken, und zu diesem Behuf dienen dann die Mutterkränze (Pessaria), deren die Bandagenlehre*) eine beträchtliche Anzahl aufzählt, und von welchen wir jetzt noch einige der empfehlenswerthesten betrachten und ihre Anwendungsart beschreiben wollen.

---

*) C. J. Glob. Bernstein's systemat. Darstellung des chirurgischen Verbandes. Jena 1798. und Ebendesselben Kupfertafeln mit Erklärungen und Zusätzen z. systemat. Darst. d. chirurg. V. Quersol. m. 51 Kpf. 1802. Juville Abhandl. über die Bruchbänder u. and. bey Gebärmuttersenkungen u. s. w. anwendbaren Verbände. A. d. Franz. v. Schregen. Nürnb. 1800. Außerdem findet sich die ausführlichste Betrachtung der verschiedenen Pessarien bey: Hunold

§. 486.

Wir theilen die Pessarien ein in gestielte und ungestielte. Beide Arten haben ihre besondern Vortheile und Nachtheile. Die ungestielten werden ohne Schmerzen getragen, bedürfen keiner besondern Binde zum Zurückhalten, ja hindern (gut gelegt) nicht einmal die Empfängniß; dagegen sind sie nicht leicht den gegebenen Umständen, vorzüglich dem Becken, genau anzupassen, müssen daher, wenn sie zu groß sind, die benachbarten Theile bedeutend drücken, oder werden, wenn sie zu klein sind, bald ausfallen, ja das Uebelste ist, daß die weichen Theile gewöhnlich durch den Druck des Pessarii nachgeben und so, wenn es auch anfänglich fest lag, doch späterhin das Ausfallen desselben bewirken. — Was die gestielten Mutterkränze anbelangt, so halten sie zwar den Uterus mit Sicherheit zurück, dagegen machen sie auch viele Beschwerden, fordern das Tragen einer besondern Binde, deren Durchnässung vom Urinabgange unvermeidlich ist, der Stiel des Mutterkranzes reibt und drückt die Vagina und die äußern Geburtstheile, veranlaßt Leukorrhöe und Excoriationen. Außerdem sinkt auch, selbst bey festens angelegter Binde, der Uterus doch im Gehen etwas herab, und wenn sich die Kranke dann schnell und unvorsichtig niedersetzt, so stößt der Mutterkranz den Uterus gewaltsam in die Höhe, welches denn nicht nur schmerzhafte Empfindungen macht, sondern zu nachtheiligen Reizungen des Muttermundes, selbst zu Entstehung von Skirrhositäten führen kann.

§. 487.

Da sonach die ungestielten Pessarien allerdings weniger beschwerlich und gefährlich sind, als die gestielten, so wird man ihnen, wo nur immer möglich, den Vorzug

---

Diss. de Pessariis. Marb. 1799. 8. und in Richter's Anfangsgr. der Wundarzneykunst. Bd. VII. S. 16.

geben. — Die Form wie das Material derselben ist indeß äußerst verschieden, am wenigsten zu empfehlen sind, ihres Drucks und ihrer Form wegen, die cylinder-, apfel- und birnförmigen Pessarien; besser, und doch sehr einfach, ist der, auch von Richter besonders empfohlne Levret'sche Mutterkranz (T. I. f. IX.), welcher aus einem Ringe von Kork, gegen 3 Zoll im Querdurchmesser und ein Sechstheil weniger im geraden Durchmesser betragend, verfertigt und mit einem Ueberzuge aus Wachs, mit etwas Gyps vermischt, überzogen wird.*) Weniger gut sind die hölzernen, bloß tellerförmigen, runden, oder die nach Art des Brüninghausischen hinten und vorn etwas ausgeschnittenen (nach Art einer ∞), welche sehr leicht abgleiten und ausfallen.

§. 488.

Ferner gehören hierher die elastischen ungestielten Pessarien, worunter das Hunold'sche, aus einem Fischbeinringe mit Seide umwickelt und mit einem Netze von Haarbändern innen durchflochten (s. T. I. f. X.), Erwähnung verdient, obwohl auch dieses wegen des dünnen Randes leicht ausfallen kann. Dieses leichte Herausgleiten ist indeß auch von den andern elastischen Pessarien, z. B. von den Juville'schen und Bernard'schen, zu befürchten, von denen das erste aus einer kleinen Flasche elastischen Harzes, am Boden mit einem eingelegten goldenen Ringe (T. I. f. XII.), der zweyte aus Leinwand, mit Auflösung des elastischen Harzes bestrichen, besteht, und welche namentlich durch die Erwärmung sich erweichen und so herausfallen.

§. 489.

Die gestielten Mutterkränze betreffend, so hat man auch von dieser Art theils elastische, theils unelastische.

---

*) Wenn ein solcher Kranz gut liegen soll, so muß er namentlich nicht zu dünn seyn, denn je breiter natürlich der an der Vaginalwand liegende Rand ist, desto weniger wird er abgleiten.

Die erstern, gewöhnlich aus Leinwand, mit aufgelöstem elastischen Harz bestrichen, verfertigt, erweichen sich jedoch bald, knicken zusammen und lassen den Vorfall wieder heraustreten, können daher nur für sehr empfindliche Personen und bey nicht allzubeträchtlichen Vorfällen Statt finden, und müssen öfters erneuert werden. Sie haben das Gute, daß sie beym Niedersetzen nicht so gegen die Gebärmutter stoßen, und ich habe sie daher nicht ohne Nutzen gefunden, zumal da mitunter, wenn der Vorfall noch nicht gar zu stark war, er sich durch ein halbjähriges oder etwas längeres Tragen eines gestielten Mutterkranzes entweder ganz verliert, oder sodann durch einen bloßen Schwamm sich zurückhalten läßt.

§. 490.

Die harten elastischen Mutterkränze sind am besten mit einem soliden, nach der Führungslinie mäßig gebogenen Stiele versehen, der Teller wird entweder von dem Stiele unmittelbar (wie bey dem Hunold'schen) getragen, und dann muß der in der Mitte vertiefte Teller mit einigen Löchern versehen seyn, oder der Teller, zur Unterstützung der Vaginalportion, wird in einen bloßen Ring verwandelt und dann von drey auf dem Stiele aufsitzenden Stützen getragen (wie bey dem Zeller'schen s. T. I. f. XI.). Eins der gewöhnlichsten, wohlfeilsten und besten Pessarien dieser Art ist das von Hunold, welches aus überfirnißtem, vorher in Leinöhl gekochtem Holze besteht und welches man auch mit einer Wachsmasse überziehen lassen kann. Um übrigens bey diesen harten gestielten Pessarien das Stauchen gegen die Gebärmutter beym Niedersitzen zu verhüten, giebt Richter den Rath, den Stiel zu durchschneiden, an jedem Ende eine etwa zollange silberne Röhre anzufügen, eine dünner als die andere, so daß eine sich in die andere einschieben läßt, und nun in diese Röhren eine Feder von spiralförmig gewundenem Draht so zu legen, daß sich beym Druck der Stiel verkürzt und von selbst wieder verlängert; allein es ist wohl zu zweifeln, ob eine so künstliche Vorrichtung hier lange Zeit widerhalten

würde. Eher könnte man daher, nach dem Vorschlage Ebendesselben, den Kranken, welche das Hunold'sche oder Zeller'sche Pessarium tragen, den Rath geben, am hintern und obern Theile der Schenkel Kissen zu befestigen, welche, wenn die Kranken sich setzen, den Stoß gegen den Stiel des Mutterkranzes verhindern. — Daß übrigens alle gestielte Pessarien am untern Ende des Stiels mit ein oder einigen Oeffnungen zum Durchziehen des an eine Leibbinde befestigten Bandes versehen seyn müssen, ergiebt sich schon von selbst.

§. 491.

Wir haben nun noch von der Art, Mutterkränze einzulegen und herauszunehmen, zu sprechen: — Um einen ungestielten Mutterkranz einzulegen, muß zuvörderst nach oben (§. 480. u. 81.) angegebenen Methoden die vollkommne Reposition des Vorfalls bewerkstelligt seyn; man läßt dann die Kranke (welche nüchtern seyn und Urin und Stuhl entleert haben muß) in eben die Lage bringen, welche zur Reposition nöthig war (§. 480.), läßt die Knie etwas anziehen, bestreicht den Mutterkranz mit Oehl und bringt ihn dann mit seiner Länge in der Achse des Beckens, mit seiner Breite in der Richtung der geraden Durchmesser desselben in die Mutterscheide ein, wobey die Kranke alles Pressen sorgfältig vermeidet. Im Becken nun giebt man ihm die Richtung, daß er mit seiner Länge in den Querdurchmesser der Beckenhöhle, und mit seiner Breite in den geraden Durchmesser derselben zu liegen kommt, und der Muttermund über der Oeffnung des Mutterkranzes, und zwar auf der concaven Seite desselben sich befindet. — Hat man sich von der guten Lage desselben überzeugt, und empfindet die Kranke weder heftiges Drücken, noch sonstigen Schmerz, so bedeckt man die äußern Geburtstheile mit einer dicken, allenfalls mit rothem Wein besprengten Compresse, welche an eine Leibbinde hinten und vorn befestigt wird, läßt ihr die Schenkel zusammen legen und sich ruhig halten.

§. 492.

Nach einer zwey bis drey Tage beobachteten Ruhe, wenn sich der Mutterkranz in die weichen Theile des Beckens gehörig eingedrückt hat, läßt man die Kranke zwar aufstehen, allein alle anstrengenden Bewegungen in den nächst folgenden Tagen sorgfältig vermeiden, die Compresse noch mehrere Tage forttragen, Verstopfungen durch von Zeit zu Zeit zu nehmende Lavements vorbeugen und beym Stuhlgange die Geburtstheile mit der Hand bedecken, bis man sich von vollkommen guter und fester Lage des Pessarii hinlänglich überzeugt hat. Ueberhaupt muß auch späterhin von Zeit zu Zeit die innere Untersuchung vorgenommen werden, da zuweilen das Pessarium sich verrückt oder schief legt (mit der breiten Fläche nach vorn), oder auch wohl der Uterus sich neben demselben herabdrängt, oder endlich, wenn das Instrument lange gelegen hat, dasselbe auch schadhaft werden könnte. — Im letzteren Falle, oder wenn es eine ganz falsche, im Becken selbst durch einen gelinden Druck nicht abzuändernde Lage bekommen hätte, muß es herausgenommen werden, wobey denn die Kranke wieder dieselbe Lage, wie bey der Einbringung, annehmen muß, und man den Zeigefinger in die Oeffnung des Mutterkranzes bringt, ihn erst mit seiner Länge in die Führungslinie des Beckens herabzudrängen und so herauszunehmen sucht, welches allerdings zuweilen bey Pessarien, welche mehrere Jahre gelegen haben, mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden zu seyn pflegt und wozu man sich zuweilen auch der Beyhülfe einer etwas starken krumm gebogenen Sonde bedienen kann. — Das Herausnehmen des Mutterkranzes ist übrigens auch nothwendig, wenn er weißen Fluß, Entzündung, Geschwulst*) oder überhaupt Schmerzen verursacht; eben so ist es rathsam, ihn während der Menstruation zu entfernen, und durchaus nothwendig wird dies

*) Am gefährlichsten ist das Einklemmen der Vaginalportion in die Mutterkranzöffnung, wobey man zuweilen zum Durchschneiden des Mutterkranzes gezwungen werden kann.

zur Vermeidung nachtheiliger Reizung in der zweyten Hälfte einer etwa eingetretenen Schwangerschaft. Ueberhaupt bekommen oft die Kranken selbst die nöthige Fertigkeit im Herausnehmen und Einlegen des Mutterkranzes, welches zur öftern Reinigung der Geburtstheile und des Instruments am vortheilhaftesten ist.

§. 493.

Die Einlegung eines gestielten Mutterkranzes fordert im Wesentlichen dasselbe Verfahren. Man läßt hierzu der Kranken eine Leibbinde verfertigen, an welcher hinten zwey lange seidene, einen halben Zoll breite Bänder befestigt werden, um durch den Stiel des Mutterkranzes gezogen werden zu können. An der vordern Gegend der Leibbinde befestigt man zu beiden Seiten ein paar kürzere Bänder, um die von dem Mutterkranzstiel Vförmig nach vorn und oben geführten hintern Bänder daran zu knüpfen, durch welche Richtung der Bänder das Verunreinigen derselben bey Stuhl und Urinabgange in etwas vermieden wird. Den Mutterkranz selbst wählt man nach der Höhe und Weite des Beckens, indem sein Teller weder zu groß seyn darf, damit er nicht drücke, noch zu klein, weil sonst der Uterus sich neben demselben herabdrängen wird. Man bringt ihn nach gemachter Reposition, und zwar ebenfalls hinlänglich eingeölt, ein, stellt ihn so, daß der Muttermund auf dem Teller ruht, befestigt dann die hintern Bänder, welche schon vor dem Einbringen des Mutterkranzes durch die Oeffnungen des Stiels gezogen seyn müssen, an die vordern kürzern Bänder, so daß der Uterus dadurch gerade in seine normale Stellung gehoben wird, und macht nun der angelegte Mutterkranz weder Druck noch Schmerz, so kann der Kranken das Aufstehen bald wieder erlaubt werden, jedoch so, daß Anstrengungen noch längere Zeit vermieden werden, vorzüglich um das Herabzwängen des Uterus neben dem Pessarium zu verhindern. — Uebrigens lernen die Kranken gewöhnlich auch mit diesen Instrumenten bald selbst umgehen, und können das Herausnehmen, Reinigen und Einbringen desselben sodann sich selbst besorgen.

2.

Schieflagen der nicht schwangern Gebärmutter.

1) Vorwärtsneigung (Antroversio uteri).

§. 494.

Der nicht schwangere Uterus, auf beiden Seiten durch doppelte Bänder befestigt, kann vorzüglich nach vor- und hinterwärts mit seiner Längenachse von der Führungslinie des Beckens sich entfernen, seitwärts hingegen wird er nur zuweilen durch abnorme Geschwülste, entweder seiner eigenen Substanz, oder benachbarter Organe, gedrängt. Die Neigung mit dem Grunde nach vorwärts, im gewöhnlichen Zustande schon durch die Anheftung der runden Mutterbänder im geringen Grade vorhanden, bekommt, wenn sie beträchtlicher wird und krankhafte Zufälle erregt, den Namen der Schieflage nach vorn oder der Vorwärtsneigung,*) dahingegen die abnorme Lage mit dem Gebärmuttergrunde nach rückwärts den Namen der Rückwärtsneigung oder der Schieflage nach hinten erhält.

§. 495.

Was die hier zunächst zu betrachtende Vorwärtsneigung anbelangt, so ist sie vorzüglich wegen des Drucks auf die Harnblase mit heftigen, von diesem Organ ausgehenden Beschwerden verknüpft, die Kranke hat steten Trieb, den Urin zu lassen, empfindet bey stärkerem Drucke auf die Schambeingegend Schmerzen, hat das Gefühl eines harten, im Stehen ihr auf die Blase fallenden Körpers, welcher zurückweicht, wenn sie die Rückenlage annimmt, ja es erstrecken

*) Ich wähle hier das Wort Neigung, um die Krankheit zu unterscheiden von der bey Wöchnerinnen beobachteten eigentlichen Vorwärtsbeugung (Pronatio uteri), von welcher im zweyten Theile die Rede seyn wird.

sich die schmerzhaften Empfindungen zuweilen bis in die Lenden und Inguinalgegend, welches alles denn leicht Veranlassung geben kann und auch in einem von Levret beschriebenen Falle wirklich gegeben hat, die Krankheit mit Steinbeschwerden zu verwechseln. Das sicherste Kennzeichen derselben ist daher nur aus der innern Untersuchung zu entnehmen, bey welcher man die Vaginalportion weit nach rückwärts und oft so hoch gestellt findet, daß man ihn kaum erreicht, da hingegen durch den vordern Theil des Scheidengewölbes der auf der Harnblase liegende Grund des Uterus wahrgenommen wird.

§. 496.

Die Entstehung des Uebels ist verschieden. Begünstigt wird sie durch Einflüsse, welche Erschlaffung der Gebärmutterbänder bewirken, so wie durch den Zustand des Wochenbettes; ferner durch sehr starke Neigung oder Krümmung des Beckens mit stark hervorragendem Vorberge; ferner entsteht sie durch Erweiterungen der Flexura sigmoidea des Coli von angehäuften Excrementen, durch Knochenauswüchse an der hintern Beckenwand, Ausartungen der Gebärmuttersubstanz selbst, oder widernatürliche Verbindungen derselben, namentlich mit dem Mastdarme in Folge ursprünglicher Mißbildung (s. §. 138.).

§. 497.

Die Prognose ist für leichtere Grade des Uebels nicht ungünstig, indem theils die Beschwerden davon nicht beträchtlich sind (außer daß dadurch öfters die Conception gehindert wird), theils auch die Zurückführung der normalen Lage keinen besondern Schwierigkeiten unterworfen zu seyn pflegt, da hingegen die höheren Grade, theils wegen der Störung der Urinexcretion, theils wegen gern entstehender Hämorrhoidalzufälle, vorzüglich wenn Mißbildungen des Beckens oder der Gebärmutter zum Grunde liegen, eine üble Prognose geben und im letztern Falle oft als ganz unheilbar zu betrachten sind.

§. 498.

Die Behandlung hat dieselben drey Indicationen, welche beym Gebärmuttervorfall aufgestellt worden sind. Zunächst also beseitigt man Verhaltungen des Stuhls und Urins, so wie entzündliche Zufälle, bringt dann die Kranke in eine Rückenlage, wobey die Kreuzgegend durch eine untergeschobene Rolle erhöht wird, und nun leitet man theils durch einen über dem Schambogen angebrachten Druck, theils durch Einbringung zweyer Finger in die Vagina und gelindes Vorwärtsdrücken der Vaginalportion den Uterus in seine normale Lage zurück, wobey zuweilen, wo die Vaginalportion bereits mit der hintern Scheidenwand verwachsen wäre, es allerdings nothwendig werden könnte, nach v. Siebold's Rath diese Verwachsung zuvor durch das Messer zu trennen.

§. 499.

Die meiste Schwierigkeit hat indeß die Erfüllung der dritten Indication, nämlich der Erhaltung des Uterus in der normalen Lage. Man empfiehlt zu diesem Ende für mehrere Tage die Beybehaltung der Rückenlage, bringt einen Schwamm in den hintern Theil des Scheidengewölbes (äußerer Druck durch Binden, über dem Schambogen angelegt, kann bey der tiefen Lage des Uterus im Becken wenig nützen), verhütet sorgfältig Anhäufungen festen Stuhls im untern Theile des Dickdarms, und läßt im äußersten Falle selbst einen ringförmigen, die Vaginalportion umschließenden Mutterkranz tragen.

2) Rückwärtsneigung oder Zurückbeugung der nicht schwangern Gebärmutter (Retroversio uteri).

§. 500.

Diese abnorme Lage des Uterus, wo der Gebärmuttergrund in die Aushöhlung des Kreuzbeins sinkt und der Mutterhals sich hinter oder über dem Schambogen findet, kommt außer der Schwangerschaft äußerst selten vor, häufiger aber in den ersten Monaten der Schwangerschaft (s. d. 2ten Th.),

obwohl man gerade der Behauptung des verewigten Richters,*) es lasse sich eine solche Zurückbeugung außer der Schwangerschaft kaum gedenken, nicht füglich beypflichten kann. Ich selbst beobachtete einen Fall, wo stete, mit der Wiederkehr der monatlichen Reinigung verknüpfte Krämpfe und heftige Hämorrhoidalbeschwerden mit einer solchen falschen Lage des Uterus sich verbunden hatten, und schon v. Siebold bemerkt, daß diese Lage gewiß oft bloß wegen unterlassener geburtshülflicher Untersuchung nicht erkannt, sondern mit aus andern Ursachen entstandenen Hämorrhoidalzufällen verwechselt werde.

§. 501.

Veranlassungen zu dieser abnormen Lage werden vorzüglich geben können: ein weites, wenig geneigtes und gekrümmtes Becken, heftiges Drängen beym Stuhlgange, Ausartungen der Gebärmuttersubstanz, längere Urinverhaltungen u. s. w. Die Folgen müssen in Druck auf den Mastdarm, Obstructionen, Kreuzschmerzen u. s. w. bestehen, und die Behandlung wird auf ähnliche Weise, wie bey der Vorwärtsneigung, vollzogen werden müssen, nur daß man hier der Kranken die Lage auf Kniee und Ellenbogen gestützt, giebt, und die zwey eingeführten Finger gegen den Gebärmuttergrund anstemmt und diesen gegen den Vorberg hinauf schiebt, dann aber den Uterus durch längere Zeit beybehaltene Bauchlage, Einbringen eines Schwammes in den vordern Theil des Scheidengewölbes oder durch einen eingelegten Mutterkranz in der angewiesenen Lage zu erhalten sucht.

---

§. 502.

Außer diesen beiden Schieflagen könnten endlich auch die Senkungen der Gebärmutter in Leisten-, Bauch-,

---

*) Anfangsgründe d. Wundarzneyk. Th. 7. S. 47.

Rücken- und Mutterscheidenbruches*) hierher gezählt werden, von welchen man von Zeit zu Zeit Beyspiele beobachtet hat, allein theils sind diese Fälle so äußerst selten, theils ist hier so ganz die Beachtung und Behandlung der Bruchgeschwulst selbst Hauptsache, daß von diesen Lagenveränderungen der Gebärmutter als besondere Krankheiten nicht die Rede seyn kann, weßhalb wir hierüber auf die chirurgischen Lehrsätze von den Brüchen verweisen, und uns zu der letzten Regelwidrigkeit am Uterus wenden, nämlich zu der

a.

Umkehrung oder Umstülpung der nicht schwangern Gebärmutter (Inversio uteri).

§. 503.

Durch diesen Namen bezeichnen wir das Herabsinken des Gebärmuttergrundes in die Gebärmutterhöhle, in den Muttermund, ja zuletzt durch die Mutterscheide und die äußern Geburtstheile, wobey denn natürlich die innere Fläche der Gebärmutter zur äußern wird, und im Falle die Gebärmutter bis vor die äußern Geburtstheile herabgesunken ist, der Muttermund den obern Theil des vorliegenden Klumpens ringförmig umgiebt und die ebenfalls herabgesunkene und umgestülpte Mutterscheide den hohlen Stiel dieser mehr kuglichen Geschwulst bildet. — Man unterscheidet hierbey zwischen unvollkommner und vollkommner Umstülpung (Inversio uteri completa et incompleta) und begreift unter der erstern Abtheilung diejenige Herabsenkung, wo die umgestülpte Gebärmutter noch nicht ganz durch den Muttermund sich gedrängt hat, da das Gegentheil die vollkommne Umstülpung darstellt. —

*) Zu welchen man eigentlich selbst die Zurückbeugung der Gebärmutter rechnen kann.

§. 504.

Eine ſolche Aenderung im Verhältniß der einzelnen Gebärmuttergegenden nun iſt nicht gedenkbar, außer wo die Gebärmutterhöhle und der Muttermund eine bedeutende Vergrößerung erfahren hatten, welches eines Theils durch die Schwangerſchaft geſchieht, daher denn auch im Wochenbett, oder vorzüglich unmittelbar nach der Geburt des Kindes die Umſtülpung am häufigſten vorkommt (wovon das Nähere im zweyten Theile), andern Theils aber auch, obwohl ſeltner, durch abnorme Auswüchſe, namentlich durch Gebärmutterpolypen, bewirkt wird. — Eben deßhalb aber, weil die Umſtülpung am gewöhnlichſten im Wochenbette entſteht, hat man ſie auch unter den Krankheiten der Wöchnerinnen der Regel nach mit abgehandelt; allein da es an Beyſpielen nicht fehlt, wo dergleichen fehlerhafte Lagen erſt mehrere Jahre nach dem Wochenbette bemerkt wurden, ſo iſt es doch nöthig, auch unter den Krankheiten der Nichtſchwangern dieſem Falle eine beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden.

§. 505.

Diagnoſe. Die Kranke fühlt entweder bloß innerlich in den Geburtstheilen einen ſtumpfen Druck, mit Gefühl von Drängen und Preſſen verbunden, leidet an öftern Blutungen, an Schleimfluß, Störungen der Stuhl- und Harnausleerungen, Hämorrhoidalzufällen u. ſ. w., oder ſie wird durch eine zwiſchen und vor den äußern Geburtstheilen fühlbare Geſchwulſt incommodirt, empfindet die genannten Beſchwerden dann gewöhnlich in noch höherem Grade, und hat noch außerdem Schmerz von Excoriationen, entzündlichen Zufällen des Uterus u. ſ. w. — Bey der angeſtellten Unterſuchung giebt ſich die vollkommne Umſtülpung zu erkennen dadurch, daß die Geſchwulſt empfindlich iſt, und daß man zwiſchen den ringförmig den Stiel der Geſchwulſt umgebenden Muttermund und den Stiel keine Sonde einführen kann (wodurch ſie ſich von einem Polypen unterſcheidet), ferner daß abwärts kein Muttermund bemerkt wird (wodurch ſie von

dem Vorfalle abweicht). — Die unvollkommne Umstülpung ist oft schwerer zu erkennen; hier zeigt sich eine kugliche Geschwulst im Muttermunde, welche oft alle äußerliche Merkmale eines gegen die Mutterscheide sich herabdrängenden Polypen hat,*) am meisten jedoch von demselben dadurch sich unterscheidet, daß sie empfindlich ist, so daß die Kranke anzugeben vermag, auf welche Weise dieselbe durch den untersuchenden Finger berührt oder gereizt wird.

§. 506.

Den vollkommensten Aufschluß aber wird in der Regel die Beobachtung der vorhergegangenen Umstände geben, denn da, wie schon bemerkt, nur in Wochenbetten, oder durch beträchtliche Polypen die Umstülpung entsteht, so kann durch Berücksichtigung dieser Dinge und besonders durch genaue Erforschung des letzten Geburtsverlaufs und des Befindens im Wochenbett alsbald die nöthige Aufklärung erhalten, und die Diagnose, mit Berücksichtigung des Resultats der geburtshülflichen Untersuchung, berichtigt werden.**)

§. 507.

Von den Bedingungen der Entstehung einer Gebärmutterumstülpung ist theils oben bey der Geschichte der Polypen die Rede gewesen, theils werden wir bey den Regelwidrigkeiten der Geburt und des Wochenbettes wieder darauf zurückkommen. Die Prognose betreffend, so ist zwar die plötzlich eingetretene Umstülpung oft mit den gefährlichsten

*) Vergl. den Fall, welchen Hauck (Rust's Mag. Bd. IV Hft. 3.) beschreibt.

**) Ein merkwürdiges Beyspiel von einer 26 Jahr dauernden Umstülpung, bey welcher zuletzt durch einen Quacksalber eine Ligatur angelegt wurde, die nach 6tägigen schrecklichen Leiden und drohendem Brande von dem nun dazu gerufenen Hrn. d'Outrepont abgenommen wurde, findet sich in E. B. Herzog Diss. de inversione uteri. Wirceb. 1817. 4.

Zufällen verbunden, theils an und für sich klar, wie sehr bey so ganz widernatürlicher Lage die Functionen des Uterus gestört werden müssen, und wie leicht er der Gefahr der Entzündung und selbst des Brandes ausgesetzt sey; demohnerachtet hat die Beobachtung Fälle gezeigt, wo der Uterus sich nach und nach so völlig an diese Lage gewöhnt hatte, daß selbst die Menstruation fortdauerte und das Wohlbefinden nicht mehr als durch einen gewöhnlichen Gebärmuttervorfall gestört war.

§. 508.

Die Behandlung hat, wie bey dem Gebärmuttervorfalle, namentlich drey Indicationen zu berücksichtigen, nämlich: 1) die durch ein plötzliches Hervortreten oder äußere Schädlichkeiten veranlaßten Zufälle zu beseitigen, in welcher Hinsicht bey Entzündungsgeschwulst des Uterus auf ähnliche Weise verfahren werden muß, wie oben (§. 479.) für ähnliche Zufälle, wenn sie an der prolabirten Gebärmutter sich zeigen, erwähnt worden ist; nur muß erinnert werden, daß diese Zufälle bey der Umstülpung, entweder wenn dieselbe eben erst entstanden, oder (was auch geschehen kann), wenn der vielleicht vorher nur zum Theil umgestülpte Uterus nach einer gewaltsamen Bewegung, nach heftigem Pressen u. s. w. sich plötzlich vollkommen umgestülpt hatte und wohl gar vor die äußern Geburtstheile getreten war, weit heftiger als bey dem bloßen Gebärmuttervorfall zu seyn pflegen und daher gewöhnlich auch ein kräftigeres antiphlogistisches Heilverfahren fordern.

§. 509.

Die zweyte Indication gebietet die Wiederherstellung der natürlichen Lage der Gebärmutter; ihre Erfüllung findet jedoch, je mehr die Umstülpung veraltet ist, um so bedeutendere Schwierigkeiten. Wo der Uterus noch beweglich ist, verrichtet man sie, indem man der Kranken eine Rückenlage, wie zur Reposition des Gebärmuttervorfalls, anweist, dann mit konisch zusammengelegter und hinreichend eingeöhlter Hand

den Fundus uteri mit den Fingerspitzen faßt und ihn durch behutsames, in der Richtung der Führungslinie des Beckens fortgesetztes Drücken und Drängen nach und nach einwärts schiebt, dem Muttergrunde dann durch den Muttermund hindurch nachfolgt, und so den Uterus bis zu der ihm natürlichen Stellung im Becken heraufführt. Hat die regelwidrige Lage noch nicht allzulange gedauert, so wird dieses ohne allzugroße Mühe gelingen; ist das Gegentheil aber der Fall, so wird oft der Kranken der Repositionsversuch selbst die heftigsten Zufälle verursachen, und man wird genöthigt seyn, Bäder, erweichende Umschläge und ähnliche Mittel längere Zeit fortzusetzen und dann erst die Reposition von neuem zu versuchen, obwohl man in mehreren veralteten Uebeln dieser Art sich zuletzt bekennen mußte, daß die Reposition überhaupt hier gänzlich unmöglich sey.

§. 510.

Die dritte Indication fordert Erhaltung des Uterus in seiner wiedererlangten natürlichen Lage, zu welchem Ende denn zuvörderst die Contraction desselben bewerkstelligt werden muß, da außerdem stets die Neigung zum Wiedereintritt der Umstülpung verbleiben würde. Die Contraction aber wird erregt theils durch Einreibungen von Naphtha und flüchtigem Linimente, theils durch Injectionen aromatischer, mit Essig und Wein vermischter Kräuteraufgüsse, theils durch innerliche Mittel, worüber ich auf die bey Gelegenheit der Gebärmutterblutungen beschriebene Behandlungsart verweise. Ist die Zusammenziehung vollkommen geschehen, so ist Wiederumstülpung nicht möglich, und die Kur ist beendigt. Sinkt aber bey wiederhergestelltem normalem Verhältnisse des Uterus derselbe demohnerachtet noch tief in das kleine Becken herab, so tritt die Behandlung des Gebärmuttervorfalls ein, so wie denn endlich, wo die Reposition der Umstülpung überhaupt gänzlich unterbleiben mußte, man wenigstens das Zurückbringen des Uterus in die Höhle der Mutterscheide nicht unterlassen darf, und zum Zweck des Zurückhaltens sich dann (so wie dies z. B. in dem erwähnten, von Herzog beschriebe-

nen Falle geschah) eines kurzgestielten Pessarii, oder eines Schwammes, oder beider zugleich bedienen kann.

Daß übrigens bey vollkommner Umstülpung auch Herabsinkung der Darmwindungen in dem umgestülpten Uterus Statt finden wird, ergiebt sich von selbst (man kann dies einen Mutterdarmbruch, Enterocele hysterica, nennen); allein die Behandlung der umgestülpten Gebärmutter hebt diesen Darmbruch zugleich.

II.

Krankheiten der Mutterscheide.

§. 511.

Die Mutterscheide, in wiefern sie eigentlich wahre Fortsetzung des Uterus und von letzterem nur durch die geringere Entwickelung ihrer Wände verschieden ist, zeigt auch ganz ähnliche Krankheitszustände, wie die im Uterus bemerkten, obwohl gewöhnlich von geringerer Heftigkeit und minderer Ausdehnung auf das allgemeine Befinden. Mehrere Krankheitszustände der Vagina sind daher mit gleichnamigen des Uterus genau verbunden, und werden durch dieselbe Behandlung, wie jene, gehoben; dahin gehört der weiße Fluß, die Entzündung, die Eiterung, der krebshafte Zustand; andere sind der Mutterscheide mit der Gebärmutter gemein und fordern nur hier eine etwas andere Behandlung, wohin der Mutterscheidenvorfall und zum Theil auch die Mutterscheidenpolypen gehören; wenige sind diesem Organ eigenthümlich, wohin wir nur den Mutterscheidenbruch rechnen.

I.

Von den Mutterscheidenpolypen.

§. 512.

Wir können uns hier der Hauptsache nach in allem, was Entstehungsweise, Erkenntniß, Prognose und Behandlung

betrifft, auf das beziehen, was von §. 421. an über die polypösen Auswüchse der Gebärmutter selbst gesagt worden ist; nur einige Bemerkungen sind noch anzufügen: — Zunächst die Entstehung betreffend, so sind hier vorzüglich scharfer, durch Ansteckung entstandener weißer Fluß, syphilitische Ansteckung, Onanie, oder Quetschungen einzelner Theile der Mutterscheide durch schwere, künstliche Entbindungen als die gewöhnlichsten Veranlassungen zu erwähnen. Die Erkenntniß anbelangend, so wird diese selbst bey dem Beginn des Uebels sehr leicht durch die geburtshülfliche Untersuchung erworben. Auch die Prognose ferner wird günstiger, als für die Gebärmutterpolypen, da die Zufälle, welche Mutterscheidenpolypen veranlassen, von weit mindener Heftigkeit sind und die Heilung sehr erleichtert ist. — Endlich rücksichtlich der Behandlung, so möchten wohl gerade diese Polypen am ersten durch Ausschneiden zu entfernen seyn, dann aber, wenn, etwa wegen beträchtlicher Größe derselben, Bedenken obwaltet, von dieser Heilungsart Gebrauch zu machen, wird die Ligatur angewendet werden müssen, welche ebenfalls durch den Sitz des Uebels bedeutend erleichtert wird, und gewöhnlich ohne Instrumente ausgeführt werden kann.

2.

Von dem Vorfalle der Mutterscheide (Prolapsus vaginae).

§. 513.

Wenn die Mutterscheide entweder mit ihren ganzen Häuten, oder bloß an ihrer innern Haut sich beträchtlich ausdehnt, herabsinkt und sich dabey nothwendig zum Theil in das nächstfolgende Stück des Scheidenkanals einschiebt (gleich der Intus susceptio des Darmkanals) und umstülpt, so nennen wir dies einen Mutterscheidenvorfall, von welchem man mit Richter*) eigentlich vier Arten unterscheiden kann.

*) S. Richter Anfangsgr. d. W. Th. VII. S. 53.

Die ersten beiden Arten werden durch Erschlaffung und Verlängerung der innern Haut der Wutterscheide gebildet, welche entweder im ganzen Umfange des Scheidenkanals abgetrennt und herabgesunken ist, oder nur an einer einzelnen Stelle den Vorfall bildet; diese Arten kommen am häufigsten vor. — Die beiden andern Arten entstehen, wenn der gesammte Scheidenkanal, also die Muskelhaut mit, entweder partiell, oder im ganzen Umfange der Scheidenwände herabtritt.

§. 514.

Die Erkenntniß des Mutterscheidenvorfalls ist im Allgemeinen sehr leicht, zumal wenn er weit aus den Geburtstheilen hervorgetreten ist, wo derselbe, wenn er den ganzen Umfang des Scheidenkanals einnahm, cylinderförmig und oft beträchtlich verlängert erscheint, indem er sich z. B. von einem Polypen (mit welchem indeß der partielle und nur durch die innerste Haut gebildete Vorfall allein bedeutende Aehnlichkeit hat) durch die Empfindlichkeit, durch die vollkommnere organische Textur und in den meisten Fällen durch die Fähigkeit, unter mäßigem Druck gänzlich zurückzuweichen, unterscheidet. Um den Vorfall der innern Haut allein von dem Vorfalle des ganzen Scheidenkanals zu unterscheiden, muß man theils auf Entstehung desselben, theils auf Textur der vorliegenden Wulst, theils auf die Lage der Gebärmutter Rücksicht nehmen. Ein Vorfall der innern Haut nämlich entsteht nach und nach, ein Vorfall der ganzen Scheidenhäute entsteht plötzlich; im erstern Falle bilden die vorliegenden Theile einen blinden Sack, neben welchem man den Finger einbringen muß, um den Muttermund, welcher dabey ganz in seiner regelmäßigen Lage bleiben kann, zu erreichen, im letztern Falle ist der vorgetretene Theil mehr ein dicker wulstiger, vollkommner oder unvollkommner Ring oder Cylinder, ohngefähr gleich dem Vorfalle des Mastdarms, durch welchen man den Finger einbringen muß, um dann die Mündung der hier nothwendig ebenfalls mit herabgetretenen Gebärmutter, und zwar weit unten, zu fühlen.

§. 515.

Die Beschwerden, welche ein Mutterscheidenvorfall veranlaßt und wodurch er sich dem Gefühle der Kranken selbst zu erkennen giebt, sind Drängen und Vollseyn in den Geburtstheilen, Hinderungen beym Urinlassen und Stuhlgange, so wie beym Coitus beschwerte Conception, Veranlassung des weißen Flusses, und bey weit hervortretendem Vorfalle Excoriationen durch den Harnabfluß, Degenerationen, Entzündung und selbst Gangrän.*) Außerdem entstehen durch bedeutende Scheidenvorfälle nach und nach gewöhnlich Vorfälle der Gebärmutter, so wie dadurch bey eintretender Schwangerschaft und Geburt manche regelwidrige Zufälle veranlaßt werden können.

516.

Die Ursachen des Mutterscheidenvorfalls sind theils Schlaffheit der Geschlechtsorgane und der dieselben zunächst umgebenden Theile überhaupt, in Folge öfterer Blutflüsse, häufiger Wochenbetten, unzeitiger Geburten, ausschweifender Lebensweise, und begünstigt durch ein sehr weites Becken, theils Atonie in den Wänden des Scheidenkanals insbesondre, welche veranlaßt werden kann durch heftige und lang dauernde Ausdehnungen derselben bey schweren Geburten, durch erlittene Quetschungen oder partielle Zerreißungen, vorzüglich durch beträchtliche Einrisse des Mittelfleisches, durch langwierigen weißen Fluß u. s. w. Plötzlich kann dieser Vorfall erzeugt, oder wenigstens seine allmählige Entstehung sehr befördert werden durch Heben schwerer Lasten, Springen, Fallen, anhaltenden Husten, Stuhlzwang oder heftiges Erbrechen, durch heftiges Verarbeiten der Geburtswehen, vorzüglich in einer unangemessenen Lage, z. B. auf einem Geburtsstuhle mit senkrechter Rückenlehne u. s. w. Zuweilen endlich entsteht der Mutterscheidenvorfall auch in Folge von Krankheiten benachbarter Organe, in Folge von Senkungen

*) Ein merkwürdiges Beyspiel dieser Art wird von Winzmann erzählt in v. Siebold's Journ. f. Geburtsh. Bd. I. St. 2. S. 244.

des Uterus, von langwierigen Harnverhaltungen, groſsen Blasensteinen, Wasseransammlungen in der Bauchhöhle, und Brüchen, welche sich gegen das Gewölbe der Mutterscheide herabsenken.

§. 517.

Die Behandlung des Mutterscheidenvorfalls besteht theils in Zurückbringung desselben, theils in der Sorgfalt für seine Zurückhaltung. Das erstere ist, wo das Uebel noch nicht veraltet und weder mit Entzündung, noch mit Degeneration der Vagina verknüpft ist, gewöhnlich sehr leicht, indem man bey angeordneter Rückenlage den Vorfall mit zwey eingehöhlten Fingern allmählig zurückschiebt, die erschlafften Scheidenwände gegen die Beckenwandungen andrückt und gleichsam ausglättet. Schwerer dagegen gelingt die Reposition, wo der Vorfall beträchtlich angeschwollen und entzündet ist, wo man zuvor Umschläge von theils erweichenden und narkotischen, theils späterhin von gelind zusammenziehenden Mitteln machen muſs; am schwersten jedoch ist dieselbe, wenn der Vorfall beträchtlich groſs, weit aus den Geburtstheilen herabhängend und vielleicht überdies verhärtet ist. Will man hier nicht (was in mehreren solchen Fällen, namentlich wenn es bloſs Vorfall der innern Scheidenhaut ist, sehr füglich geschehen kann und mehrmals bereits mit Glück versucht worden ist) lieber zum Abschneiden oder Abbinden des prolabirten Theils schreiten, so kann die Reposition nur durch längere Zeit (zuweilen mehrere Wochen lang) fortgesetzte Rückenlage, bei sehr strenger Diät, öftern Abführungen und anhaltenden, durch Compressen und eine T Binde fortgesetzten gelinden Druck bewerkstelligt werden.

§. 518.

Das Zurückhalten des reponirten Scheidenvorfalls wird bewerkstelligt 1) durch Entfernung der noch einwirkenden Ursachen, welche dieses Uebel veranlaſst hatten, Hebung der Urinverhaltung, Beseitigung der Steinbeschwerden, des Stuhlzwanges, Erbrechens u. s. w.; 2) durch angemessene mechani-

sche Unterstützung und zweckmäßige Lage. Als Mittel zur Unterstützung des Scheidenvorfalls ist aber besonders ein cylinderförmiger, oberwärts etwas stärkerer Schwamm, mit adstringirenden Dekokten befeuchtet, zu empfehlen, welcher, wenn die Kranke das Bette verläßt, durch eine T Binde befestigt werden muß. Zu demselben Endzweck dienen ferner die Scheidencylinder aus Leinwand, mit Eichenrindenpulver und rothem Wein gefüllt, und endlich kann man sich dazu auch mehrerer der oben beschriebenen Mutterkränze, so wie der hohlen elastischen Scheidencylinder bedienen, zumal wenn es ein Vorfall der ganzen Scheidenwände, und derselbe also auch mit einem unvollkommnen Gebärmuttervorfall verknüpft ist.

3.

Von dem Mutterscheidenbruche (Colpocele, Elytrocele, Hernia vaginalis).

§. 519.

In den vertieften Falten, welche als Fortsetzungen des Bauchfells vom Gebärmuttergrunde nach der Harnblase sowohl als nach dem Mastdarme hin gebildet werden, senken sich zuweilen ein oder mehrere benachbarte Unterleibseingeweide herab, dehnen sie nach und nach beträchtlich aus, und verursachen so eine Bruchgeschwulst, welche an dem Grunde der Mutterscheide entweder vor oder hinter der Vaginalportion fühlbar werden muß und deshalb den Namen des Mutterscheidenbruchs bekommt. In wiefern jedoch die Falte, welche vom Uterus nach dem Mastdarme reicht, schon im regelmäßigen Zustande tiefer ist, als die vom Uterus nach der Harnblase, und in wiefern noch überdies der Uterus gewöhnlich mit dem Grunde etwas mehr gegen den Schambogen geneigt ist, und dadurch die vordere Falte noch mehr verengert, so finden wir auch den Mutterscheidenbruch häufiger hinter als vor der Vaginalportion im Scheidengewölbe, jedoch überhaupt selten genau in der Mitte der hintern oder vordern Gegend, sondern meistens etwas seitwärts, als welches durch die an-

einanderstoßenden rundlichen Körper des Mastdarms, der Gebärmutter und der Harnblase leicht erklärlich wird.

§. 520.

Was die Hereinsenkung des Bruchsackes gegen das Scheidengewölbe insbesondre betrifft, so finden wir entweder, daß der durch das Bauchfell gebildete Bruchsack die gesammten Scheidenwände und also zugleich die Muskelhaut ausdehnt (dies ist z. B. der Fall bey der Zurückbeugung der Gebärmutter, welche, wenn auch in geringerem Grade, nothwendig einen Mutterscheidenbruch mit veranlaßt), oder daß der Bruchsack die Fasern der Muskelhaut der Mutterscheide auseinander drängt, zwischen dieselben hereintritt und dann bloß die innere Haut zu seiner äußern Decke ausdehnt. Ob das eine oder das andere der Fall sey, wird theils aus der Entstehung sich abnehmen lassen (ein plötzlich entstandener Mutterscheidenbruch z. B., mit Zurückbeugung der Gebärmutter, wird immer eine Ausdehnung der ganzen Scheidenwände hervorbringen), theils wird es durch die Untersuchung ausgemittelt werden können, indem man bey dem Mutterscheidenbruche, welcher durch Auseinanderdrängen der Muskelfasern entstanden ist, nachdem in horizontaler Lage der Bruch völlig zurückgedrängt worden ist, im Stande seyn wird, im Scheidengrunde die Spalte auszumitteln, durch welche der Bruchsack herabgedrängt war.

§. 521.

Die Erkenntniß des Mutterscheidenbruchs ist nicht sehr schwierig, und es kann dieses Uebel nicht leicht mit andern verwechselt werden. Die Empfindungen, durch welche sich die Entstehung desselben der Kranken selbst ankündigt, sind: ein nach irgend einer gewaltsamen Bewegung oder Anstrengung plötzlich entstandenes, anfänglich auch wohl geringes, allmählig aber stärker werdendes Gefühl von Vollheit und Herabdrängen in der Mutterscheide mit nachfolgendem Schmerz, welcher öfters wiederkehrt, kolikartig erscheint, und mit welchem sich verschiedene Zufälle verbinden, jenachdem

diese oder jene Theile in den Bruchsack herabgesunken sind. Bey einer nunmehr vorgenommenen ärztlichen und geburtshülflichen Untersuchung wird sich alsbald ergeben, daß in dem Gewölbe der Mutterscheide am vordern oder hintern Theile oder an den Seiten derselben eine weiche, regelwidrige Geschwulst hervortritt, welche kleiner wird oder sich völlig verliert, sobald die Kranke auf dem Rücken liegt und die Geschwulst selbst mit den Fingerspitzen etwas gedrückt wird, dagegen weiter hervortritt in aufrechter Stellung, beim Husten und Pressen. — Durch die letztern Umstände, so wie durch den größeren Umfang und innere Vollheit unterscheidet sich die Geschwulst deutlich von einem bloßen Vorfalle, so wie die Freiheit und Regelmäßigkeit des Muttermundes keine Verwechselung mit Polypen oder Vorfällen und Umstülpungen der Gebärmutter zuläßt.

§. 522.

Die Theile, welche in einen Mutterscheidenbruch herabtreten können, sind verschieden; am häufigsten sind es Darmwindungen, das Ileum, die Flexura sigmoidea des Dickdarms u. s. w.; seltner und nur bey Mutterscheidenbrüchen zwischen Uterus und Mastdarm ist es möglich, daß Theile des Netzes mit herabtreten; außerdem kann in einen solchen Bruch auch die Harnblase sich herabsenken, welches dann gewöhnlich Urinbeschwerden (Ischuria) veranlassen wird, und wobey, sobald die Blase gefüllt ist, die Untersuchung eine Fluctuation der Bruchgeschwulst, und Drängen zum Harnlassen beym Druck auf diese Geschwulst zu erkennen geben wird. Daß ferner selbst der Uterus zuweilen in diesen Brüchen bemerkt wird, ist schon oben erwähnt worden. — Die Größe dieser Brüche ist zuweilen bedeutend, und sie können, wenn sie allzutief hinter der Vagina herabsinken, zugleich durch ihren Druck auf den Mastdarm, Vorfälle dieses letztern veranlassen.

§. 523.

Ursachen, welche den **Mutterscheidenbruch** theils veranlassen und die langsamere **Entstehung** desselben begünstigen, theils schnell herbeyführen, sind: 1) häufige vorausgegangene Geburten, besonders sehr großer Kinder, wobey durch Einkeilung des Kopfs in der Höhle des kleinen Beckens, durch Instrumental- oder Manualhülfe, vorzüglich ohne die nöthige Vorsicht angewendet, die gesammten Mutterscheidenwände oder die Muskelhaut insbesondre ausgedehnt, gequetscht oder die Fasern der letztern von einander getrennt worden sind; ferner Unvorsichtigkeiten im Wochenbett, zu zeitiges Verlassen der horizontalen Lage, Anstrengung durch Heben, oder beym Stuhlgange, durch sehr heftigen Husten u. s. w., welche letztern Ursachen zuweilen (obwohl selten) auch bey Frauen, welche noch nicht geboren hatten, den Mutterscheidenbruch herbeyführen können.

§. 524.

Die Folgen und die Gefährlichkeit der Mutterscheidenbrüche sind im Ganzen weniger als bey andern Brüchen zu fürchten; ein Mutterscheidenbruch nämlich klemmt sich sehr selten ein, und es ist dieses kaum möglich, außer in dem Falle, wo der durch das Bauchfell gebildete Hals des Bruchsackes besonders verhärtet und verdickt, der Bruch selbst folglich schon sehr veraltet ist, oder zur Zeit einer vor sich gehenden Geburt, obwohl auch hier der Bruch gewöhnlich von selbst zurückweicht. Die meisten Beschwerden wird der Bruch machen, wenn die Harnblase in denselben herabgesunken ist, obwohl auch außerdem der Bruch durch Kolikschmerzen, Obstructionen u. s. w. öfters der Kranken beschwerlich werden wird.

§. 525.

Behandlung. Auch hier sind vorzüglich zwey Momente, die Zurückbringung des Bruchs und die Zurückhaltung desselben zu berücksichtigen; was das erstere betrifft, so gelingt die Taxis hier gewöhnlich sehr leicht bey horizontaler

Rückenlage und mäßigem Andrängen zweyer eingeöhlter und in die Vagina gebrachter Finger; ist der Bruch größer und an der hintern Scheidenwand herabgestiegen, so wird man für schwierigere Fälle die Lage, auf Knie und Ellenbogen gestützt, anordnen, immer aber dafür sorgen müssen, daß die Beckengegend mehr als die Brustgegend der Kranken erhöht sey. Bey dieser Zurückbringung des Bruchs ist es übrigens, wie auch von Richter bemerkt wird, keinesweges hinlänglich, die Geschwulst selbst so lange zu drücken, bis sie verschwindet, sondern, da sehr wohl Darmstücke in dem Bruchsackhalse (d. i. der Theil des Bruchsackes, welcher zwischen Gebärmutter und Mastdarm liegt) liegen bleiben, und, wenn demohnerachtet ein Pessarium eingelegt wird, heftige Kolikschmerzen veranlassen können, so muß man, wenn es ein hinterer Mutterscheidenbruch ist, die ganze hintere Fläche der Mutterscheide bis an den Muttermund herauf drücken und ausstreichen, bis man diese ganze Fläche völlig frei fühlt.

§. 526.

Was nun die Zurückhaltung des Bruchs betrifft, so pflegt diese immer etwas schwieriger zu seyn, und kann nur theils durch Vermeidung und Beseitigung der veranlassenden Ursachen, durch mehrere Tage streng beybehaltene horizontale Lage und Einbringung einer die Bruchöffnung hinlänglich comprimirende, in die Mutterscheide eingebrachte Vorrichtung erhalten werden. Für letzteren Behuf können indeß die gewöhnlichen scheiben- oder ringförmigen Pessarien nicht empfohlen werden, da sie leicht Veranlassung zur Einklemmung dieser Brüche geben würden, man wählt vielmehr hierzu die cylinderförmigen, welche man entweder bloß aus einem der Form und Weite der Vagina vollkommen angemessenen Stück Schwamm verfertigt, welches man sowohl mit Wachstaffent überziehen lassen kann, als dasselbe auch ohne Ueberzug, und mit adstringirenden Dekokten befeuchtet, einbringen läßt (wobey nur das öftere Einlegen und Herausnehmen unangenehm wird), oder man bedient sich dazu hohler elastischer Cylinder (z. B. des Pickel'schen Scheidencylinders), welche man entweder

um die Zusammendrückung derselben zu verhüten, nach v. Siebold's Rath mit Roßhaaren ausfüllen, oder von dicht an einander gewundenem Drath, welcher von innen und außen mit Leinwand überzogen und dann gut gefirnißt wird, verfertigen läßt.

§. 527.

Will man ein solches Scheidenpessarium einlegen, so muß der Bruch in der angemessenen und oben beschriebenen Lage völlig zurückgebracht seyn, und dann der Cylinder so eingelegt werden, daß er bis dicht an den Muttermund reicht und somit auch das Herabsinken des Bruchs in den Bruchsackhals verhindert werde, worauf er sodann durch eine Binde, ohngefähr nach Art eines gestielten gewöhnlichen Pessarii, zu befestigen ist, obwohl er bey Frauen, welche noch nicht geboren haben, kaum dieser Unterstützung bedarf, sondern durch die Engigkeit der äußern Geburtstheile selbst schon hinlänglich zurückgehalten wird.

§. 528.

Die Fälle, wo Mutterscheidenbrüche, namentlich außer der Schwangerschaft und der Periode der Geburt, sich eingeklemmt hatten, sind sehr selten, und gewöhnlich wird eine solche Einklemmung nur durch beträchtliche Anfüllungen eines Theils vom Darmkanal, seltner der Harnblase, bewirkt werken können. Kommt daher eine solche Einklemmung vor, so wird zuerst immer für Entleerung der Harnblase und des Stuhls, letzteres durch erweichende öhligte Klystiere, zu sorgen, dann aber die Taxis nach den oben angegebenen Regeln vorzunehmen seyn, welches auch gewöhnlich bald und vollkommen gelingt, so daß man bisher kein Beyspiel kennt, wo eine Brucheinklemmung dieser Art die Operation erfodert hätte; in einem solchen Falle jedoch, wo die erwähnte Methode zur Zurückbringung durchaus nicht hinreichte und demohnerachtet dieselbe unumgänglich nothwendig würde, müßte die Operation allerdings mit vielfachen Schwierigkeiten verbunden seyn, und könnte nur, entweder durch Eröffnung der

innern Wand der Bruchgeschwulst in der Scheide, Ausdehnung des Bruchsackhalses mittelst der Finger, oder angemessener Werkzeuge und sofortiger Zurückbringung bewerkstelligt werden, da der Vorschlag, die Bauchhöhle über dem Schambogen zu öffnen und von hieraus den Darm heraufzuheben, noch weit weniger ausführbar und mit weit größerer Gefahr verbunden seyn müßte.

Nur eine weitere Entwicklung des Mutterscheidenbruchs endlich ist der

Mittelfleischbruch (Hernia perinaei).

§. 529.

Hier ist der vom Bauchfell zwischen Uterus und Mastdarm gebildete Bruchsack nämlich so weit ausgedehnt, daß er die Muskelfasern der Mittelfleischgegend auseinander treibt und zwischen der Schamspalte und dem After als eine bald größere bald kleinere weiche Geschwulst hervortritt, welche beym Husten oder Pressen und in aufrechter Stellung sich vergrößert, beym Liegen und unter einem gelinden Drucke hingegen sich verkleinert, innerlich aber in der Vagina sich ebenfalls durch Auftreibung ihrer hintern Wand zu erkennen giebt. Die Beschwerden, welche dieser Bruch veranlaßt, sind ziemlich dieselben, wie die bey Gelegenheit des Mutterscheidenbruchs beschriebenen, obwohl oft noch heftiger; auch die Entstehungsweise ist dieselbe, und selbst rücksichtlich der Gefahr der Einklemmung ist auch hier zu bemerken, daß sie selten vorkommt.

§. 530.

Was die Behandlung betrifft, so erfordert die Taxis zuvörderst das Zurückdrücken der äußerlich am Mittelfleische fühlbaren Geschwulst, dann aber die beym Mittelfleischbruche angezeigte und beschriebene Manipulation, ferner die Zurückhaltung des Bruchs betreffend, so dient dazu am sichersten der gegen den Mutterscheidenbruch empfohlne Scheidencylinder, allenfalls mit einer an der Binde zugleich befestigten klei-

nen, oder etwas ſtarken Compreſſe, welche öfters mit einem geiſtigen Mittel befeuchtet werden und genau auf die Stelle, wo der Bruch hervorzutreten pflegt, drücken muß, um ſo das allmählige Schließen der erſchlafften Muskelfaſern dieſer Gegend zu bewerkſtelligen.

III.

Krankheiten der Eyerſtöcke.

§. 531.

Die Ovarien, ſo wie die Muttertrompeten, nehmen zwar ebenfalls, gleich der Mutterſcheide, an mehreren Krankheiten des Uterus Antheil, und wir ſehen ſie daher öfters gleichzeitig bey Gebärmutterentzündungen von der Entzündung ergriffen werden, wir finden ſie verhärtet, krebshaft, ja durch offene Krebsgeſchwüre völlig zerſtört, ſobald der Uterus in hohem Grade von dieſem Uebel leidet, und endlich iſt nothwendig auch ihre Lage oft mit verändert, wenn die des Uterus bedeutend von der Norm abweicht, demohnerachtet fehlen, wenigſtens für die Eyerſtöcke, auch eigenthümliche, in ihnen primär entſtehende Krankheitsformen keinesweges, zu welchen wir namentlich die Entzündung derſelben, die Waſſerſucht und die vielartigen Degenerationen und Vergrößerungen der Subſtanz derſelben rechnen, welchen letztern krankhaften Zuſtänden dieſe Organe wohl mehr als irgend ein anderer Theil des weiblichen Körpers unterworfen ſind.

1.

Entzündung der Eyerſtöcke (Oophoritis).

§. 532.

Eine Krankheit, welche, zumal da ſie unter die ſeltnern gehört, ihrer Verſteckheit wegen leicht verkannt und ſelbſt bey der Aufzählung innerer Entzündungen in ärztlichen Schriften

oft übergangen wird. — Um ein richtiges Bild derselben zu entwerfen, ist es daher, wie auch namentlich von H. Clarus, welchem wir eine treffliche Abhandlung über diesen Gegenstand verdanken,*) geschehen ist, unerlaßlich, auf die Verhältnisse unter welchen die Krankheit gewöhnlich entsteht, aufmerksam zu machen, indem hieran sie oft mehr, als aus ihren äußerlich wahrnehmbaren Zeichen, erkennbar ist.

§. 533.

Man sieht sie aber vorzüglich bey sehr sinnlichen, durch Romanenleserey, frühe Ausschweifungen u. s. w. verdorbenen Personen, und zwar wohl nur innerhalb der zeugungsfähigen Jahre, und die Ausbildung der Entzündung kommt gewöhnlich durch Einflüsse zu Stande, welche entweder physisch durch Veranlassung heftiger Congestionen und Stockungen in den innern Genitalien wirken, wie plötzliche Unterdrückung der Menstruation, in Folge heftig reizender Purgir- oder treibender Mittel, der häufig Statt findende Geschlechtsreiz, ohne dadurch bewirkte Schwangerschaft, übermäßiger Genuß geistiger Getränke und stark gewürzter Speisen, plötzliche Erkältungen u. s. w.; oder von der psychischen Seite aus, das Geschlechtssystem heftig erregen, als unglückliche Liebe, plötzliche Umwandlung der Lebensweise, zumal wo bey unbefriedigtem Geschlechtsbedürfniß die Phantasie um so gewaltsamer aufgeregt wird, daher, wie H. Clarus bemerkt, das Uebel, namentlich bey feilen Dirnen, wenn sie wegen Syphilis oder Krätze in Heilanstalten oder Zuchthäuser gebracht werden, ausbricht.

§. 534.

Die Zeichen, welche die ausgebrochene Krankheit charakterisiren, sind: 1) Schmerzhaftigkeit des afficirten Organs, welche indeß oft nur bey angebrachtem äußern Drucke empfunden wird; 2) das Gefühl einer Anschwellung, etwa von der Größe einer welschen Nuß, bey tieferem Eingreifen

*) S. Annalen des klinischen Instituts zu Leipzig Iu Bds 2e Abth. 1812. S. 194.

nen, oder etwas starken Compresse, welche mit geistigen Mittel befeuchtet werden und wo der Bruch hervorzutreten pflegt, das allmählige Schließen der erschlafften Gegend zu bewerkstelligen.

Krankheiten

Die Ovarien, sich stets zwar ebenfalls, gesellen sich eine heiten des Uterus Krämpfe u. s. w., deren gleichzeitig bei wird, wenn man bedenkt, wie dung ergriffe des Nervensystems sind, welche sich ja durch vobten Produktivität der Ovarien (bey der Uterus in verbinden.
ist not
des

§. 535.

tet kann die Oophoritis sich leicht mit Entzün-
li benachbarter Organe verbinden, und namentlich mit
, mit welcher ihre Aehnlichkeit überhaupt sehr groß
ist, daß wir hier noch die namentlich von H. Clarus
für beide Krankheitsformen aufgestellten diagnostischen Merk-
male nicht übergehen können, welche darin bestehen, daß bey
der Metritis weit heftiger das Gefäßsystem, bey der Oopho-
ritis mehr das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen wird,
und bey ersterer sowohl das Verdauungs- als das urinausson-
dernde System in höherem Grade in Anspruch genommen
wird; ferner, daß der Sitz der Schmerzhaftigkeit nach der
Lage der Organe verschieden ist, und daß bey der Metritis
die innere Untersuchung, so wie häufig die consensuelle Af-
fection der Brüste das Uebel erkennen lehrt. — Auch mit
Schwangerschaften außer der Gebärmutter hat die Oophoritis
zuweilen große Aehnlichkeit, worauf wir im zweyten Theile
zurückkommen werden.

§. 536.

und Folgen der Oophoritis sind denen
uch hier kann das Uebel entweder sich
igen zertheilen, oder in Eiterung,
wie in chronische Entzündung und
ergehen, oder (was hier wegen
und deßhalb unzweckmäßiger
worden ist) durch plötzlich
ten. Immer ist diese
eils namentlich wegen
unheilbaren Degeneratio-
ankheit zu nennen, welche die
s im höchsten Grade verdient.

§. 537.

Die Behandlung der Oophoritis ist im Allgemeinen nach ähnlichen Grundsätzen, wie die der Metritis, einzuleiten, nur mit dem Unterschiede, daß man berücksichtigt, wie in der letztern gemeiniglich das gesammte Gefäßsystem und consensuell der Darmkanal heftiger in Mitleidenschaft gezogen, dagegen in der erstern mehr das Nervensystem mit afficirt sey. Obwohl daher Blutentziehungen auch in der Oophoritis nicht entbehrt werden können, so sind sie doch gewöhnlich in geringerer Quantität und häufig nur durch örtliche Ausleerungen (etwa durch Blutigel an die Schamlefzen oder das Mittelfleisch) zu veranstalten. Diät und Regimen müssen antiphlogistisch seyn, auf hinreichende Entleerung des Darmkanals durch blande Abführmittel oder Lavements ist hinzuwirken, so wie durch örtliche Wärme mittelst aufgelegter trockner gewärmter Kräuterkissen; durch ableitende Mittel, als Cataplasmata auf die Füße und späterhin Sinapismen an die Waden, die Zertheilung zu befördern.

*) S. darüber Mehreres in Hrn. Oslander's Schrift über die Entwickelungskrankheiten. 2r Thl. S. 140.

hinter dem Schambogen in der Gegend der Scham- und Darmverbindung; 3) durch Fiebersymptome, Durst, verminderten Harnabgang, belegte Zunge, Verstopfung, Unruhe, Kopfschmerz u. s. w.; 4) vorzüglich durch Affectionen des gesammten Nervensystems. Wir haben aber oben bereits die Meynung aufgestellt, daß die Nymphomanie wesentlich in chronischer Entzündung der Eyerstöcke begründet sey, und das, was man bey acuter Entzündung dieser Organe beobachtet hat, kann als ein neuer Beleg dafür gelten; die Kranken sind nämlich hierbey melancholisch, mit Gegenständen der Sinnlichkeit fast stets beschäftigt, machen dahin abzweckende Bewegungen, brechen auch wohl in Delirien aus, welche sich stets um verliebte Phantasien drehen; und hierzu gesellen sich eine Menge von andern Nervenzufällen, Krämpfe u. s. w., deren Erscheinung sich wohl leicht erklärt, wenn man bedenkt, wie bedeutend die Erregungen des Nervensystems sind, welche sich mit der normal erhöhten Produktivität der Ovarien (bey der Empfängniß) verbinden.

§. 535.

Uebrigens kann die Oophoritis sich leicht mit Entzündungen benachbarter Organe verbinden, und namentlich mit der Metritis, mit welcher ihre Aehnlichkeit überhaupt sehr groß ist, so daß wir hier noch die namentlich von H. Clarus für beide Krankheitsformen aufgestellten diagnostischen Merkmale nicht übergehen können, welche darin bestehen, daß bey der Metritis weit heftiger das Gefäßsystem, bey der Oophoritis mehr das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen wird, auch bey ersterer sowohl das Verdauungs- als das urinaussondernde System in höherem Grade in Anspruch genommen wird; ferner, daß der Sitz der Schmerzhaftigkeit nach der Lage der Organe verschieden ist, und daß bey der Metritis die innere Untersuchung, so wie häufig die consensuelle Affection der Brüste das Uebel erkennen lehrt. — Auch mit Schwangerschaften außer der Gebärmutter hat die Oophoritis zuweilen große Aehnlichkeit, worauf wir im zweyten Theile zurückkommen werden.

§. 536.

Die Ausgänge und Folgen der Oophoritis sind denen der Metritis ähnlich; auch hier kann das Uebel entweder sich unter kritischen Erscheinungen zertheilen, oder in Eiterung, oder in Degenerationen, so wie in chronische Entzündung und durch diese in Nymphomanie übergehen, oder (was hier wegen öfterer Verkennung des Uebels*) und deßhalb unzweckmäßiger Behandlung nicht selten beobachtet worden ist) durch plötzlich eintretende Gangrän in Tod sich endigen. Immer ist diese Entzündung sonach theils an sich, theils namentlich wegen den so leicht sich anschließenden und unheilbaren Degenerationen eine sehr bedenkliche Krankheit zu nennen, welche die Aufmerksamkeit des Arztes im höchsten Grade verdient.

§. 537.

Die Behandlung der Oophoritis ist im Allgemeinen nach ähnlichen Grundsätzen, wie die der Metritis, einzuleiten, nur mit dem Unterschiede, daß man berücksichtigt, wie in der letztern gemeiniglich das gesammte Gefäßsystem und consensuell der Darmkanal heftiger in Mitleidenschaft gezogen, dagegen in der erstern mehr das Nervensystem mit afficirt sey. Obwohl daher Blutentziehungen auch in der Oophoritis nicht entbehrt werden können, so sind sie doch gewöhnlich in geringerer Quantität und häufig nur durch örtliche Ausleerungen (etwa durch Blutigel an die Schamlefzen oder das Mittelfleisch) zu veranstalten. Diät und Regimen müssen antiphlogistisch seyn, auf hinreichende Entleerung des Darmkanals durch blande Abführmittel oder Lavements ist hinzuwirken, so wie durch örtliche Wärme mittelst aufgelegter trockner gewärmter Kräuterkissen; durch ableitende Mittel, als Cataplasmata auf die Füße und späterhin Sinapismen an die Waden, die Zertheilung zu befördern.

*) S. darüber Mehreres in Hrn. Oſiander's Schrift über die Entwickelungskrankheiten. 2r Thl. S. 120.

§. 538.

Als innere Mittel werden mit besonderm Nutzen die von Clarus empfohlnen Verbindungen des Calomels mit dem Opium oder den Zinkblumen und dem Castoreum, abwechselnd mit Mohnsamenemulsionen, mit etwas Nitrum gegeben werden, jedoch so, daß hierbey noch besondre Rücksicht auf die speciellen Veranlassungen der Krankheit genommen wird, folglich bey unterdrückten Hautausschlägen und nach heftigen Erkältungen besonders auf Herstellung der Hautfunction gewirkt werde durch Anwendung des Fliederblumenaufgusses mit dem Liquor Mindereri, oder der Antimonialien, wie des Vin. emet. — daß die unterdrückte Menstruation nach oben aufgestellten Regeln wieder in Fluß gebracht werde u. s. w. — Im weitern Verlauf der Krankheit und namentlich wenn sie sich mehr der chronischen Form nähert, werden ferner allgemeine laue Bäder, Einreibungen der Queckßilbersalbe mit dem flüchtigen Liniment, und wo sie völlig übergeht in die Form der Nymphomanie, die oben dargelegte Behandlung dieser Krankheit angezeigt seyn.

§. 539.

Geht die Entzündung in Eiterung über, welches sich ankündigen wird durch Frost, durch klopfenden Schmerz, durch Beschwerden bey der Bewegung des Schenkels der leidenden Seite, lentescirendes Fieber, eiterartigen Bodensatz im Urin, Vergrößerung der äußerlich fühlbaren Geschwulst, so kann die Behandlung fernerhin allein es sich zum Zweck machen, eine vortheilhafte Entleerung des gebildeten Abscesses zu begünstigen. Zu diesem Endzweck enthalte man sich der Anwendung aller stärker eingreifenden, den Darmkanal oder Gefäß- und Nervensystem gewaltsam afficirender Mittel, als wodurch ein solcher Prozeß, der allein Werk der Natur seyn kann, nur gestört werden müßte, setze dagegen den Gebrauch der lauen Bäder, der Fomentationen oder Cataplasmen des Unterleibes, der lindernden eröffnenden Klystiere fort, und beobachte genau, nach welchem Theile hin die Entleerung des Abscesses beab-

sichtigt wird. Ist es gegen die Bauchdecken, welches durch Zunahme und deutlichere Fluctuation der Geschwulst sich zu erkennen geben wird, so befördere man diese Entleerung durch eine Seitenlage, durch fortgesetzten Gebrauch der erweichenden Umschläge und Bäder; ist es das Scheidengewölbe, gegen welches der Abscess hindrängt, welches durch Pressen in den Geburtstheilen und durch die innere Untersuchung abgenommen werden kann, so sind erweichende Injectionen vortheilhaft; in beiden Fällen aber wird man immer die Eröffnung selbst am liebsten der Natur überlassen, und zur künstlichen Oeffnung wenigstens nicht eher schreiten, bis man sich von der Verwachsung des Eitersackes mit den Bauchdecken oder dem Scheidengewölbe (in welchem Falle von Osiander's Hysterotom Gebrauch zu machen wäre) hinlänglich überzeugt hat.

§. 540.

Sucht der Abscess den Uebergang in den Darmkanal, so giebt sich dieses durch vermehrtes Drängen auf den Mastdarm zu erkennen, und ist durch eröffnende Klystiere zu befördern, wobey denn die Ausleerungen selbst stets zu untersuchen sind, um die beginnende Entleerung, welche als eiterigter Durchfall erscheint, nicht zu übersehen. — Von innern Mitteln können außer demulcirenden, gelind die Ausleerung befördernden Dingen, als Molken, Decoctum rad. Althaeae, Graminis, Liquirit. u. s. w. zum Getränk keine füglich angewendet werden, und die Diät muß sehr leicht und gelind nährend seyn. Ist dagegen der Abscess geöffnet, so findet die Anwendung der China Statt, um die Kräfte zu erhalten und gutartige Eiterung, so wie Heilung des Abscesses zu bewirken. Bey der unmittelbar nach außen erfolgenden Entleerung des Eiters ist übrigens dann dieselbe ganz nach den Regeln der Chirurgie zu behandeln.

2.

Waſſerſucht der Eyerſtöcke (Hydrops ovarii).

§. 541.

Ein ziemlich häufiger Krankheitszuſtand dieſer Theile, deſſen Vorkommen ſich wohl leicht erklären läßt, wenn man bedenkt, daß die normalen Productionen des Eyerſtocks nach der Empfängniß in Erzeugung von Bläschen, mit Flüſſigkeit angefüllt, beſtehen, daß überhaupt Flüſſigkeit den Anfang aller organiſchen Bildungen darſtelle und ſomit auch in einem Organe deſſen geſunde und krankhafte Produktivität gleich ſtark iſt, die Anhäufung von wäſſerigen Stoffen gleichſam als die erſte Stufe zu anderweitigen Verbildungen betrachtet werden kann, weshalb man denn auch nicht ſelten zugleich mit dieſen Waſſeranſammlungen Verhärtungen, ſpeckige Ausartungen, Erzeugung fremder Gebilde u. ſ. w. wahrnimmt.

§. 542.

Die Waſſerſucht der Eyerſtöcke kommt aber in verſchiedenen Formen vor: entweder nämlich iſt der ganze Eyerſtock zu einem zuweilen außerordentlich großen Sacke ausgedehnt, welcher mitunter 20 bis 80, ja 100 Pfund Waſſer enthalten hat,*) oder es iſt die Subſtanz des Ovarii zu mehreren beſondern Zellen ausgedehnt, welche zum Theil unter einander zuſammenmünden und ähnliche Mengen Waſſer enthalten, oder endlich, es bildet das Ovarium einen großen Sack, welcher eine Menge hydatidenartiger Blaſen in ſich enthält.**) Die Flüſſigkeit, welche in dieſen Blaſen oder in den größeren Säcken vorhanden iſt, zeigt ſich gewöhnlich als helles gelbli-

*) S. davon Beyſpiele angeführt bey Dreyßig Handbuch der Pathologie der chroniſchen Krankheiten. Th. II. S. 502 u. 3.

**) Ein merkwürdiges Beyſpiel dieſer Art ſ. man in Möbius Dissert. in. de Virgine aacitica post paracenthesin purpura maligna extincta. Lips. 1725.

ches Wasser, zuweilen jedoch hat man sie auch mehr gallertartig, oder als gallertartige Substanz gefunden. — Merkwürdig ist es, daß vorzüglich das linke Ovarium zu dieser, so wie zu andern Verbildungen besonders hinneigt, welches offenbar mit der auf der linken Körperseite überhaupt überwiegenden Produktivität (Magen und Herz liegen ja auch auf der linken Seite) in Verbindung steht. Uebrigens nehmen öfters auch die fallopischen Röhren, so wie die breiten Mutterbänder an dieser Wassersucht Antheil.

§. 543.

Die Kennzeichen dieser Wasseransammlungen sind oft sehr schwierig aufzufinden, und werden gewöhnlich nicht eher wahrgenommen, bis die Geschwulst einen gewissen Umfang erreicht hat, indem bey geringern Graden die Kranken selbst keine bedeutende Beschwerde dabey zu empfinden pflegen, und daher nicht selten bey Sectionen dergleichen kleinere Ansammlungen gefunden werden, wo im Leben kein Symptom dieselben vermuthen ließ. Bey stärkerer Auftreibung des leidenden Theiles hingegen zeigen sich vorzüglich folgende Merkmale. Die Kranke empfindet in der kranken Seite (gewöhnlich der linken) einen stumpfen drückenden Schmerz, womit sich zugleich Beschwerden bey der Bewegung des Schenkels dieser Seite und Anschwellungen verbinden; zugleich entwickelt sich in der regio iliaca eine begränzte, selten deutliche Fluctuation zeigende Geschwulst, welche nach und nach sich vergrößert und endlich den ganzen Unterleib erfüllt. Auch durch das Scheidengewölbe ist diese Geschwulst oft bemerkbar, und es zeigt sich gewöhnlich der Uterus durch dieselbe dergestalt aus seiner Lage getrieben, daß die Vaginalportion nach derselben Seite, auf welcher die Geschwulst sich befindet, der Gebärmuttergrund aber nach der entgegengesetzten Seite hingedrängt ist.

§. 544.

Im Verlaufe der Krankheit gesellen sich dann zu den genannten Kennzeichen noch mehrere andere, welche innere Wasseransammlungen überhaupt zu begleiten pflegen, als Man-

gel an Appetit, Ekel und Erbrechen, Niedergeschlagenheit und Melancholie, Unordnung der monatlichen Reinigung, Leukorrhöe, trüber sparsamer Urin, Abmagerung, Engbrüstigkeit u. s. w. — Zuletzt tritt nicht selten allgemeine Wassersucht hinzu, und die Kranken sterben entweder an dieser oder an vollkommner Abmagerung.

§. 545.

Die Krankheit kann vorzüglich verwechselt werden entweder mit Schwangerschaft oder mit Wassersucht der Bauchhöhle (Ascites); von der erstern unterscheidet sie sich indeß durch weit längere Dauer und langsameres Zunehmen der Geschwulst, durch die ungleiche, mehr von einer Seite ausgehende Geschwulst des Leibes (obwohl auch bey Schwangerschaften außer der Gebärmutter, von welchen die Unterscheidung überhaupt schwieriger ist, ähnliches Verhalten der jedoch auch hier schneller anwachsenden Geschwulst Statt findet), ferner durch den Mangel der wesentlichen Zeichen der Schwangerschaft, der Auflockerung und Verkürzung der Vaginalportion und des Gefühls von Kindestheilen und Kindesbewegungen (mit welchen letztern zwar zuweilen von den Kranken selbst das Gefühl der Fluctuation verwechselt wird, wobey denn die genaue geburtshülfliche Untersuchung diesen Irrthum widerlegen muß), durch die Veränderung in den Brüsten, welche bey Schwangerschaft anschwellen, bey dieser Krankheit schlaff werden. — Von der Bauchwassersucht ist die Eyerstockswassersucht unterschieden durch die begränzte Geschwulst, die undeutlichere Fluctuation und das schnellere Eintreten allgemeiner Krankheitszustände.

§. 546.

Die veranlassenden Ursachen dieser Krankheit, welche ihrem Wesen nach bedingt wird durch eine abnorm aufgeregte, jedoch auf der niedrigsten Stufe der Bildung, d. i. bey der Ausscheidung von Wasser verweilende Produktivität (s. §. 561.), sind theils das Sinken normaler Produktivität in den höheren Jahren, welches diese Organe zu ihrer

eigentlichen Bestimmung der Erzeugung neuer Individuen unfähig macht, theils öftere Reizungen des Geschlechtssystems, ohne Herbeyführung normaler Schwangerschaft (z. B. durch Onanie), ferner vorausgegangene, unvollkommen zertheilte Entzündungen, oder mechanische Erschütterungen durch Stoß oder schweres Tragen, Einflüsse, welche heftige Congestionen gegen die Geschlechtsorgane veranlassen, als Unterdrückung der Menstruation, erhitzende Getränke, oder Arzneymittel, schwere Geburten, ausschweifende Lebensweise u. s. w., endlich auch alles, wodurch die Function der rückführenden Gefäße gehemmt wird, als Drüsenanschwellungen, früher Statt gehabte syphilitische Ansteckung u. s. w.

§. 547.

Die Prognose ist bey der Wassersucht der Eyerstöcke im Allgemeinen sehr ungünstig und die Krankheit meistens unheilbar; demohnerachtet werden Beyspiele aufgeführt, wo die Krankheit sich theils durch Entleerung des Wassers mittelst heftigen Erbrechens, theils mittelst Ergießung aus den Geburtstheilen durch die Muttertrompeten glücklich gehoben haben soll. Gewöhnlich zieht sich indeß die Krankheit sehr in die Länge, und kann in geringern Graden immer, zuweilen aber selbst bey beträchtlicher Entwicklung, lange ohne allzugroße Beeinträchtigung des allgemeinen Befindens bestehen, wird in sofern wenigstens eine etwas bessere Prognose als die Bauchwassersucht gestatten, wenn sie auch allerdings weit geringere Hoffnung für die Heilung gewährt.

§. 548.

Die Behandlung läßt bey der Natur des Uebels besonders günstige Resultate nicht erwarten, einmal, weil das Uebel gemeiniglich erst, nachdem es schon einen beträchtlichen Grad erreicht hat, der ärztlichen Behandlung übergeben wird; zweytens, weil die Wände, welche das Wasser umschließen, in der Regel so sehr in ihrer Struktur verändert sind, daß sie keine Hoffnung zur Resorption zulassen; drittens, weil selbst die unmittelbare Entleerung des Wassers mittelst einer

Operation nicht wohl möglich ist, indem häufig mehrere Zellenwände vorhanden sind, welche dieselbe hindern. Das Geschäft des Arztes wird sich daher nur auf Linderung der durch die Geschwulst veranlaßten Beschwerden und Verhütung einer weitern Vergrößerung derselben, so wie in Fällen bereits sehr angewachsener, äußerlich deutliche Fluctuation zeigender Wassersammlung auf unmittelbare Entleerung desselben durch die Operation, und möglichste Verhinderung neuer Ansammlungen beschränken.

§. 549.

In ersterer Hinsicht müssen die speziellen Ursachen, welche die Entstehung der Wasseranhäufung zur Folge hatten, berücksichtigt, Drüsenanschwellungen durch die Anwendung resolvirender Mittel, Spuren syphilitischer Zustände durch Merkurialien gehoben werden, die Einsaugung des ergossenen Wassers selbst ist durch Beförderung der Hautthätigkeit, so wie der Harnsecretion und Anwendung zertheilender Einreibungen zu befördern, und endlich besonders die Lebensweise und Diät einer strengen Ordnung zu unterwerfen, Aufenthalt in reiner trockner Luft, leicht verdauliche kräftige Diät, der mäßige Genuß eines kräftigen Weins und hinlängliche, den Kräften angemessene Bewegung sind zu empfehlen, so wie Beschwerden, welche vom Drucke der Geschwulst abhängen, als Verstopfungen, Congestionen u. s. w., durch von Zeit zu Zeit dargereichte blande Abführungen u. s. w. zu beseitigen.

§. 550.

Die Operation, welche zur eigentlichen Heilung des Uebels angewendet werden könnte, ist zweyfach, entweder die Paracentheſe, oder die Exstirpation des ausgearteten Organs. Letztere würde allerdings den Vorzug verdienen, wenn ihrer Ausführung sich nicht zu bedeutende Schwierigkeiten entgegensetzten. Sie könnte nämlich nicht füglich anders als im Beginn der Krankheit Statt finden, da bey weiterer Entwicklung der Geschwulst die Oeffnung der Bauchhöhle allzubeträchtlich werden müßte; kann indeß gerade in dieser ersten Zeit, wo

entweder die Kranke noch gar keine Beschwerden davon empfindet, oder das Uebel noch nicht mit vollkommner Sicherheit zu erkennen ist, selten ausgeführt werden. Was dagegen die Paracentheſe betrifft, so wird sie insgemein zwar bey dieser Art der Wassersucht mehr widerrathen, als empfohlen; da es indeß keinesweges an Beyspielen fehlt, wo durch dieselbe theils das Uebel wirklich geheilt,*) theils doch das Leben der Kranken auf viele Jahre gefristet worden ist, so verdient dieselbe sicher häufiger als bisher geschehen, in Anwendung gezogen zu werden, und möchte auch wohl der Eröffnung durch den Schnitt, von welcher nur allzuleicht, wie P. Frank bemerkt, Fisteln zurückbleiben, vorgezogen werden. Rathsam möchte es indeß seyn, nach gemachter Paracenteſe die Canüle einige Zeit liegen zu lassen, um so eine adhäsive Entzündung der Wände des Sackes zu veranlassen und dadurch die radicale Heilung zu bewerkstelligen. — Noch ist zu erwähnen, daß man auch vorgeschlagen hat, die Paracenteſe des Eyerstocks durch die Vagina zu verrichten. Da indeß häufig das wassersüchtige Ovarium zu sehr aus der Höhle des kleinen Beckens sich hervorhebt, und daher zuweilen von der Vagina aus kaum zu erreichen seyn dürfte, da ferner hierbey auch Verletzung beträchtlicher Gefäße leicht Statt finden könnte, so darf diese Operation wohl nur auf die wenigen Fälle eingeschränkt werden, wo die fluctuirende Geschwulst tief in das Scheidengewölbe sich herabdrängt und die Fluctuation innerlich deutlicher als äußerlich fühlbar ist.

---

*) S. P. Frank epitome de curand. hom. morb. Lib. VI. p. I. p. 476.

3.

Von den Speck- und Fleischgeschwülsten, Verknöcherungen, so wie von den Erzeugungen fremder Körper in den Eyerstöcken.

§. 551.

Wenn die Wasseransammlung in den Eyerstöcken als der erste Grad ihrer krankhaften Productivität betrachtet wurde, so erscheint die Vergrößerung ihrer Substanz durch eyweißstoffartige, fettartige Massen, in welchen sich, wie in den gleichartigen Geschwülsten der Gebärmutter, öfters Knochenkerne ansetzen, die zweyte, und in der Bildung von einzelnen organischen Theilen, von Zähnen, Haaren u. s. w. die dritte und höchste Stufe dieser abnormen Bildungsthätigkeit. — In ärztlicher Hinsicht haben indeß, was die Entstehung, Erkenntniß, Folgen und Behandlung betrifft, alle diese Ausartungen mit der Wassersucht der Eyerstöcke so viel gemein, daß wir bey der Betrachtung derselben sehr kurz seyn können, indem wir, was das Physiologische anbelangt (in welcher Hinsicht namentlich die Erzeugung fremder Gebilde von besonderm Interesse ist), auf die schöne Abhandlung von Autenrieth*) verweisen.

§. 552.

Wie sonach die Zellen des wassersüchtigen Eyerstocks gewöhnlich nur krankhaft weitergebildete Graaf'sche Bläschen sind, so auch diese speckigen Auswüchse und sonstigen Degenerationen dieses Organs; die Knochenstücke also, die Zähne, die Haare, dürfen nicht, wie zuweilen geschehen ist, als Rudimente von Schwangerschaften außer der Gebärmutter, als Ueberbleibsel von ganzen Embryonen betrachtet werden, wogegen es der beste Beweis ist, theils daß ähnliche Bildungen

*) S. Reil's Archiv für Physiologie. Bd. VII. Heft 2.

auch an Organen vorkommen, wo an Conception und Schwangerschaft gar nicht zu denken ist (so fand Peuada*) das Herz einer Ente mit Federn besetzt), theils daß die hier vorgefundenen Gebilde solche sind, welche im Organismus selbst auf der niedrigsten Stufe der Organisation stehen, und daß hingegen z. B. Wirbel- oder Schädelknochen, Nervenmasse und dergl. sich nie in solchen ausgearteten Eyerstöcken gefunden haben; eine Thatsache, aus welcher H. Hegewisch folgerte, daß überhaupt nur die Erzeugung reproduktiver Gebilde den Antheil des Weibes an der Bildung eines neuen Individuums ausmache,**) worauf wir im zweyten Theile zurückkommen werden.

§. 553.

Die Kennzeichen dieser Ausartungen sind ziemlich dieselben (mit Ausnahme der Fluctuation), wie die der Eyerstockswassersucht, nur daß oft die Unterscheidung von Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter hier noch schwieriger wird, und ähnliche Degenerationen (wenn sie nicht mit allzustarker Vergrößerung verbunden sind) oft noch länger als die Wasseranhäufungen ohne Störungen des Allgemeinbefindens ertragen werden. — Als veranlassende Ursachen sind wohl hier ganz vorzüglich ausschweifende Lebensart und häufige Geschlechtsreizung ohne Eintritt normaler Schwangerschaft, nebst den andern bey der Wassersucht der Eyerstöcke namhaft gemachten Einflüssen aufzuzählen. — Lebensgefährlich werden diese Degenerationen nur, wenn sie einen sehr beträchtlichen Umfang erreichen, durch Druck auf benachbarte Theile, verursachte Wasserergießung in der Bauchhöhle u. s. w.

---

*) S. dessen Saggio d'osservazioni e memorie sopra alcuni casi singolari u. s. w. angezeigt in d. Erg. Bl. d. allgem. Lit. Zeit. 1810. No. 136.

**) S. neues nordisches Archiv von Pfaff, Scheel und Rudolphi. 1r Bd. 1s St.

§. 554.

Eine ärztliche Behandlung kann bey diesen Verbildungen gewöhnlich, wenn sie eine beträchtliche Entwicklung erreicht haben, nur auf palliative Weise, durch Milderung der von dem Drucke derselben veranlaßten Beschwerden, Statt finden; die radicale Heilung würde nur durch Exstirpation möglich werden, welche, wenn sie auch allerdings in andern Fällen einigemal ausgeführt worden ist,*) doch hier, wo bey weiter ausgebildetem Uebel gewöhnlich schon die Reproduction des gesammten Körpers darnieder liegt, nicht wohl mit Glück unternommen werden dürfte.

IV.

Krankheiten der Brüste.

§. 555.

Von den Brüsten gilt im Wesentlichen dasselbe, was wir über die Krankheiten des Uterus erinnert haben, d. i. daß sie namentlich zu der Zeit, wo ihre Thätigkeit am meisten gesteigert ist, nämlich zur Zeit der Schwangerschaft und Stillungsperiode, den meisten Krankheiten, und zwar insbesondere den acuten Krankheitsformen unterworfen sind, dahingegen außer dieser Zeit sie entweder nur an allgemeinen Krankheitszuständen oder an Krankheiten solcher Organe Theil nehmen, welche ihnen, wie hauptsächlich der Uterus, durch Consensus eng verbunden sind, oder durch unmittelbare örtliche Einwirkung schädlicher Einflüsse in krankhaften Zustand versetzt werden. Da nun der ursprünglichen Bildungsfehler der Brüste schon §. 134., der krankhaft übereilten Ausbildung der Brüste schon bey der zu zeitig eintretenden Pubertät §. 142. u. f. gedacht worden ist, die acute Entzündung der eigentlichen Brust-

*) Einige Beyspiele dieser Art s. bey P. Frank (Epitome d. hom. morb. cur. Lib. VI. p. 1. p. 479. angeführt.

drüse aber vorzüglich bey Schwangern und im Wochenbett vorkommt, die abnorme Ausscheidung des Monatsblutes durch die Brustwarzen ebenfalls schon oben betrachtet wurde (§. 179 u. f.), und äußerliche Krankheitszustände endlich, z. B. Verletzungen, Hautausschläge u. s. w., hier nicht wesentlich andere Behandlungsmaaßregeln, als an andern Stellen fordern, so bleiben hier theils nur einige krankhafte Zufälle, welche die völlige Entwickelung der Brüste zu Anfang und im Verlauf der zeugungsfähigen Lebensperiode betreffen können, theils Degenerationen der Brustdrüse selbst, welche theils mit oder nach chronischer Entzündung der Drüsensubstanz, theils ohne entzündliche Zufälle hervortreten, zu betrachten übrig.

1.

Krankhafte Entwicklung der Brüste in den zeugungsfähigen Jahren überhaupt.

1) Congestionen nach den Brüsten und Schmerzhaftwerden derselben.

§. 556.

Es ist eine schon bey der Physiologie der weiblichen normalen Entwicklung bemerkte Erscheinung, daß bey und nach dem erfolgten Eintritt der Menstruation die Brüste aufschwellen und sich erst hier vollkommner ausbilden; zuweilen nur kann auch diese vermehrte Gefäßthätigkeit, wie die der Menstruation zum Grunde liegende mit krankhafter Reizung sich verbinden; das Anschwellen der Brüste geschieht zu rasch, die Empfindlichkeit derselben wird rege gemacht, es entstehen flüchtige Stiche, ein prickelndes Gefühl, Schmerzhaftigkeit bey geringem Drucke u. s. w., welche entweder zur Zeit der wiederkehrenden Menstruation bloß sich zeigen, oder auch außer dieser Periode anhalten, und mitunter selbst zu Entstehung einzelner Knoten und Verhärtungen, von welchen unten die Rede seyn wird, Veranlassung geben.

§. 557.

Ursachen dieses Krankheitszustandes sind gewöhnlich unzweckmäßige Lebensweise im Allgemeinen, und örtliche Reizungen der Brüste insbesondre. Das allgemeine Verhalten angehend, so schaden sich Mädchen in der Entwicklungsperiode namentlich durch zu vieles Stillsitzen, mangelnden Genuß der freyen Luft, zu reichliche und erhitzende Nahrung, durch zu warmes Verhalten, vorzüglich zu warme Schlafstellen, und durch Aufregung verliebter Phantasien, oder wirkliche Ausschweifungen. Als örtliche Reizung wirkt das öftere Betasten der Brüste, namentlich durch einen Mann, zu warmes Einhüllen der Brüste, Besprengen derselben mit wohlriechenden Wässern und Oehlen, so wie das Schminken derselben, das Heraufzwängen der Brüste durch Schnürleiber, selbst das Tragen von mancherley Putz, Ketten u. s. w. auf und zwischen den Brüsten.

§. 558.

Obwohl nun diese Art von Schmerzhaftigkeit der Brüste an und für sich eben nicht bedenklich genannt werden kann, so kann sie doch leicht zu innern kleinen Verbildungen, Verdickung in den Wänden der Milchkanäle u. s. w. führen, und dadurch für die künftigen Functionen dieser Theile beym Stillen sehr nachtheilig werden, und darf schon in dieser Hinsicht nicht unberücksichtigt bleiben. Zur Beseitigung derselben ist es vorzüglich nothwendig, die im vorigen Paragr. genannten Ursachen zu entfernen, die Lebensordnung und Diät zweckmäßig zu bestimmen, auf regelmäßige Unterhaltung der Menstruation hinzuwirken, bey Ueberhäufung des Körpers mit nahrhaften Stoffen einige blande Abführungen und kühlende Getränke anzuordnen, und besonders den öftern Gebrauch lauer allgemeiner Bäder zu empfehlen, welche ganz vorzüglich im Stande sind, diesen Zustand von Schmerzhaftigkeit gründlich zu heben.

a) Unvollkommne Ausbildung der Brüste und vorzeitiges Welken derselben.

§. 559.

Wenn die Brüste in den Jahren nach Eintritt der Menstruation schlaff und klein bleiben, so ist dies entweder Folge einer im Allgemeinen geschwächten Reproduction, oder einer mangelhaften Ausbildung oder anderweitigen Störung des Geschlechtssystems; und aus denselben Gründen kann auch, nachdem früher diese Theile gehörig ausgebildet waren, ihr vorzeitiges Zusammenfallen und Abwelken verursacht werden. Die Schwächung der Reproduction selbst ist aber entweder direkt durch Säfteverlust, vorausgegangene angreifende allgemeine Krankheiten veranlaßt, oder es sind die assimilirenden Organe und namentlich die Lymphgefäße in Unordnung; die Unvollkommenheit des Geschlechtssystems ist entweder Folge ursprünglicher Mißbildung, oder durch örtliche Krankheiten und Zerstörungen desselben herbeygeführt, wie man denn z. B. nach Ausrottung des Uterus Schlaffwerden und Einschrumpfen der Brüste bemerkte.

§. 560.

Es ergiebt sich hieraus, daß mehrere Fälle dieses krankhaften Zustandes der Brüste durchaus keiner Hülfe fähig sind, welches eintreten wird, wo die Ursachen der allgemein darniederliegenden Reproduction nicht zu beseitigen sind, oder wo das Uebel auf ursprünglicher Mißbildung des Geschlechtssystems, oder auf unheilbaren Zerstörungen wichtiger innerer Geschlechtsorgane beruht. In andern Fällen hingegen ist es oft möglich, eine vollkommnere Ausbildung der Brüste zu begünstigen oder wiederherzustellen, wobey denn die Ursachen berücksichtigt werden müssen. Reiner Zustand von Schwäche wird den Genuß reichlich nährender, leichtverdaulicher Speisen, den Gebrauch eines kräftigen Weins, die Anwendung tonischer Mittel, der Extrakte der China, des Eisens, der eisenhaltigen Mineralbäder nöthig machen, welche Mittel örtlich durch Waschen der Brüste mit Eau de Cologne, war-

men Wein u. dergl., so wie durch wärmere Bedeckung der Brüste unterstützt werden müssen. Ist der Schwächezustand hingegen bloß Folge von Leiden der Unterleibsorgane des Drüsensystems, so muß, diese Zustände durch resolvirende und andere Mittel zu heben, die erste Sorge des Arztes seyn. Wie endlich dem Darniederliegen der Reproduction im Geschlechtssystem begegnet werden könne, ist bey den Unordnungen der Menstruation und bey andern Gelegenheiten schon mehrmals erörtert worden, worauf wir daher hier zurückweisen.

2) Uebermäßige Ernährung der Brüste und zu große Fettanhäufung um dieselben.

§. 561.

Was das zu beträchtliche Anwachsen der Brüste selbst betrifft, so ist es die Folge ähnlicher Einflüsse, als oben §. 556 u. 557. für die schmerzhaften Empfindungen in diesen Organen genannt worden sind, und kann auch nur durch ähnliche Behandlung (§. 558.) gemindert werden; die Fettanhäufungen hingegen sind immer Folge einer krankhaften Reproduction, wobey die aufgenommenen Stoffe nicht gehörig verarbeitet, sondern als rohe Fettmassen in das Zellgewebe niedergelegt werden; es entstehen daher dergleichen Ablagerungen vorzüglich, wo bey an sich phlegmatischen Individuen durch Mangel an Thätigkeit des Körpers und des Geistes, schlechte Luft und erschlaffende Kost, Stockung der Säfte und unvollkommne Ausarbeitung derselben veranlaßt wird, oder wo die reproductive Thätigkeit durch häufige Ausleerungen (Blutflüsse oder häufiges Aderlassen, zur Gewohnheit gewordenen Gebrauch von erhitzenden Abführmitteln u. s. w.) erschöpft ist, indem hierbey die Natur gleichsam daran gewöhnt wird, schnell, aber eben deßhalb auch unvollkommner die Substanzerzeugung zu bewerkstelligen.

§. 562.

Der Arzt hat hierbey zunächst sein Augenmerk auf die Verdauungswerkzeuge zu richten, und nicht sowohl auf die Verminderung der Stofferzeugung überhaupt zu denken (etwa durch große Einschränkung und Verkürzung der Diät), sondern eine bessere Verarbeitung der bildenden Stoffe einzuleiten. Zu diesem Endzwecke bedient man sich der resolvirenden, so wie der aromatisch bittern Arzneyen, empfiehlt den mäßigen Genuß eines kräftigen Weins und überhaupt eine kräftige, nahrhafte, erregende Kost, dringt auf fleißige Bewegung in freyer trockner Luft und hinlängliche Beschäftigung im Hause, läßt aromatische Bäder gebrauchen, und kann auch wohl, nach v. Siebold's Vorschlag, die Brüste selbst mit von Bernstein oder Zucker durchräucherten Flanellen gelind frottiren oder fomentiren lassen.

2.

Besondere Degenerationen im Innern der Brüste.

§. 563.

Hierher gehören die verschiedenen Geschwülste dieser Theile, welche theils als Verhärtungen, theils als hohle, mit Flüssigkeiten oder geronnenen Massen angefüllte Anschwellungen erscheinen, und welche wir unterscheiden, je nachdem sie entweder einem besondern Gebilde der Brust oder deren gesammtem Parenchyma angehören. Zu den erstern rechnen wir die Anschwellungen der Milchgefäße (Milchknoten), die Anschwellungen der Lymphgefäße, aus welchen, wenn sie sich verdicken und verhärten, die scrophulösen Indurationen, wenn sie sich erweitern und flüßige Lymphe in besondere Säcke ergießen, die Lymphgeschwülste, oder wenn sich diese Säcke mit geronnenen Stoffen ausfüllen, die Balggeschwülste hervorgehen; ferner die krankhaften Zustände der Blutgefäße, indem sich Extravasate (Blutgeschwülste) bilden. Die örtli-

chen Veränderungen des ganzen Parenchyma hingegen, welche dann allerdings zunächst durch krankhafte Thätigkeit der kleinern Blutgefäße, durch chronische Entzündung, unterhalten und vergrößert werden, und endlich zu allgemeiner Zerstörung führen, sind der Skirrhus und Krebs.

1) Von den Milchknoten in den Brüsten.

§. 564.

Diese Anschwellungen charakterisiren sich namentlich durch ihre Entstehung, indem sie sich entweder bey oder nach einem Wochenbette entwickeln, oder durch anderweitig, z. B. bey Unterdrückung des Monatsflusses antagonistisch veranlaßte Milchsecretion bedingt werden. Sie fühlen sich meistens ungleich, als ein Convolut aufgetriebener Gefäße, an, sind ziemlich beweglich und bey der Berührung nicht schmerzhaft; auch vergrößern sie sich nicht, machen sonst keine beträchtlichen Beschwerden und zertheilen sich gewöhnlich entweder, sobald eine neue Schwangerschaft oder Stillungsperiode eintritt, vermöge der größern, neu aufgeregten Gefäßthätigkeit, oder nachdem die etwa ursachlich vorhandene Hemmung der Catamenien wegfällt, oder auch allmählig durch Statt findende Resorption ohne besondere äußere Veranlassungen. Sehr selten ist es, daß sie außer der Periode der Stillung in Entzündung und Eiterung übergehen, und wenig häufiger, und nur bey sehr verdorbener allgemeiner Constitution, kommt es vor, daß sie in skirrhöse Knoten durch hinzutretende chronische Entzündung sich verwandeln.

§. 565.

Die Behandlung solcher Milchknoten hat zunächst auf die Ursachen Rücksicht zu nehmen und diese zu entfernen, also, wo die Auftreibung der Milchkanäle von Hemmung der Catamenien abhängt, die letztern nach oben (§. 208 ff.) gegebenen Regeln zu beseitigen, bey plötzlich unterbrochenem Stillungsgeschäft den Ausfluß der Milch durch warme trockne

Fomentationen, Dampfbäder u. dgl. zu unterstützen u. s. w. — Außerdem aber sind vorzüglich, um die Zertheilung dieser Geschwulst zu bewerkstelligen, Mittel, welche die örtliche Perspiration und die Thätigkeit der aufsaugenden Gefäße erhöhen, in Anwendung zu ziehen. Als solche erwähnen wir für äußerlichen Gebrauch das Bedecken der Brust durch gewärmte Kissen, mit den trocknen Specieb. resolvent., der Hb. Serpilli, Majoranae, Hyosciami u. s. w. gefüllt, das Auflegen von Baumwolle oder Hanfwerg mit dem feinen Pulver der Kamillenblumen, des Melilotenkrautes u. s. w. bestreut; ferner das Bedecken der Brust mit feinem, weichem, mehrfach zusammengelegtem Flanell, mit einem weichen haarigen Thierfell (z. B. von Katzen, Kaninchen, Hasen), ferner das Auflegen zertheilender Pflaster und das Anwenden ähnlicher Einreibungen.

§. 566.

Zu den erstern bedient man sich des Emplastr. de Meliloto, de Cicuta, de Ammoniac. mit dem Emplastro mercuriali, zu den Einreibungen benutzt man das Liniment. vol. camphor. in Verbindung mit dem Unguent. mercur., das Unguent. de Althaea, das Oleum camphoratum. Endlich können zum Zweck der Zertheilung die Dampfbäder, das Einreiben mit durchräuchertem Flanell, die Elektricität und der Galvanismus in Anwendung gezogen werden.

§. 567.

Als innerliche Mittel hingegen verdienen diejenigen vorzüglich angewendet zu werden, welche theils auf das Lymphsystem gelind erregend wirken, theils anderweitige Ausscheidungen befördern. Zu den erstern gehören die Antimonialien und die auflösenden Extrakte, oder frisch gepreßten Kräutersäfte, die Seife, die Mittelsalze, das sel tauri u. s. w.; zu den letztern gehören die von Zeit zu Zeit darzureichenden Abführungen, die mäßige Beförderung der Perspiration durch Liq. Mindereri, Liq. CC. und zweckmäßiges Verhalten.

in diesen Geschwülsten der Brüste hat man zuweilen Knochenkerne, ja ausgebreitete Verknöcherungen*), oder fremde Gebilde, wie Haare, angetroffen.

§. 572.

Die äußere Beschaffenheit dieser Geschwülste überhaupt (welches jedoch auch von den Balggeschwülsten der Brüste gilt) ist von Richter**) sehr treffend in folgenden Worten charakterisirt, indem er sagt: „Gemeiniglich findet man diese Geschwülste unmittelbar unter der Haut, im Zellgewebe, zuweilen aber doch auch in innern Theilen (von den Brüsten gilt dies wohl nicht, indem ich kein Beyspiel auffinden kann, wo die Balggeschwulst z. B. unter der Brustdrüse gesessen hätte). Die Haut, die sie bedeckt, ist unverändert. Sie sind ganz unschmerzhaft und meistentheils weicher anzufühlen, als der Skirrhus. Nur selten entzünden sie sich aus innern oder äußern Ursachen; noch seltener gerathen sie in Eiterung. Zuweilen wachsen sie sehr langsam, zuweilen sehr schnell. Zuweilen hören sie eine Zeit lang auf und fangen nachher von neuem wieder an zu wachsen. Einige, vornehmlich die Speckgeschwülste, erreichen eine ungeheure Größe." —

§. 573.

Es ergiebt sich hieraus auch, wodurch sie sich von andern Anschwellungen der Brüste unterscheiden, von dem Skirrhus nämlich hauptsächlich durch die Schmerzlosigkeit, von den Milchknoten durch die Entstehungsweise, indem den letztern stets wirkliche Milchausscheidung vorausgegangen ist, von den scrophulösen Geschwülsten durch Berücksichtigung der allgemeinen Constitution und ebenfalls durch die Schmerzlosigkeit, und von den Lymph- und Blutgeschwülsten durch die mangelnde Fluctuation und die unveränderte Hautfarbe.

---

*) S. davon Beyspiele gesammelt bey Otto. Handb. d. pathol. Anat. S. 241.

**) Anfangsgründe der Wundarzneyk. Bd. I. S. 302.

§. 574.

Verursacht werden diese Geschwülste am häufigsten durch mechanische Schädlichkeiten, durch Druck, Stoß u. s. w., indem durch Quetschung einer Stelle des Zellgewebes oder eines lymphatischen Gefäßes eine kleine Ablagerung eyweißstoffiger Masse herbeygeführt wird, welche sich mit einem Sacke von verdichtetem Zellgewebe umgiebt, und nun dergestalt reizend auf die benachbarten Theile einwirkt, daß ein andauernder oder periodisch wiederkehrender Zufluß plastischer Stoffe gegen diese Stelle sich bildet, welche denn theils zu Verdickung des gebildeten Sackes, theils zur Vergrößerung der gesammten Geschwulst beytragen. Begünstigt wird ferner die Entwickelung solcher Geschwülste durch allgemeinen scrophulösen phlegmatischen Habitus, oder durch Vorhandenseyn anderer Krankheitsstoffe, der Gicht, der Syphilis, durch unterdrückte anderweitige zur Gewohnheit gewordene Ausscheidungen u. s. w.

§. 575.

Die **Beschwerden**, welche ähnliche Geschwülste erregen, sind nach dem Umfange derselben verschieden. Kleine Balggeschwülste stören die Function der Brüste nicht und werden oft kaum bemerkt; größere hingegen hindern nicht nur die regelmäßige Function derselben, sondern erschweren zuletzt selbst die Bewegung des Arms ihrer Seite, erregen durch Druck theils Einschrumpfen der Brustdrüsen, theils Entzündung, welche in Eiterung übergehen kann, wodurch denn im günstigsten Falle die Geschwulst selbst zerstört wird, mitunter aber auch bösartige Geschwüre übrig bleiben. — Langsame Zertheilung dieser Geschwülste durch Resorption ist fast nie zu erwarten und auch durch Kunst nur selten zu bewerkstelligen.

§. 576.

Die Behandlung dieser Geschwülste zweckt entweder ab auf ihre Beseitigung durch eine aufgeregte Reaction des All-

gemeinen gegen die besondre leidende Stelle, welches namentlich befördert werden kann durch Ausrottung anderweitiger scrophulöser, syphilitischer, arthritischer Dyskrasien und Anwendung von Mitteln, welche im Allgemeinen sowohl als örtlich die Thätigkeit der lymphatischen Gefäße erhöhen; Mittel, von denen schon oben (§. 565 — 567.) die Rede gewesen ist, von welchen indeß bey der geringen Empfindlichkeit dieser Anschwellungen immer die stärksten, z. B. das Gummi Ammoniacum, mit Essig zum Linimente gekocht, der Salmiak, mit Kali in Pulverform auf Baumwolle gestreut, der verdünnte Hirschhorngeist u. s. w. angewendet zu werden verdienen, indem ohne dies der durch Reize dieser Art veranlaßte Uebergang in Entzündung mehr zu wünschen als zu fürchten ist. — Von der Anwendung der Compression, welche bey Balggeschwülsten anderer Theile mitunter empfohlen worden ist, würde sich hier nur dann Nutzen erwarten lassen, wenn die Geschwulst mehr am Rande der Brust sich befände, so daß sie gegen eine Rippe angedrückt werden könnte.

§. 577.

Allen diesen Mitteln aber ist die Operation vorzuziehen, und es verdienen jene überhaupt nur da Anwendung, wo die Kranke zu dieser nicht bewogen werden kann. — Man verrichtet sie entweder so, daß man ganz auf die Weise, wie die Exstirpation des Skirrhus vorgenommen werden muß, die Balggeschwulst ausschält und dabey Bedacht nimmt, daß theils der Sack derselben vollständig hinweggenommen, theils das oft hartnäckig blutende Adergewebe im Umfange desselben mit entfernt werde, oder man gebraucht die Operation nur (welches namentlich von etwas tiefer in die Substanz der Brustdrüse eindringenden Balggeschwülsten und den Breygeschwülsten gilt), um den Sack zu eröffnen, die inneliegende Materie auszuleeren und dann eine Eiterung zu erregen, um den zurückgelassenen Sack durch diese Eiterung zu zerstören.

§. 578.

Richter schlägt zu diesem Endzweck ein dreifaches Verfahren vor: *) entweder nämlich, den Sack durch ein Aetzmittel zu öffnen, die Materie auszuleeren, die innere Fläche des Sacks durch Scarificationen, oder durch Bestreichen mit Spießglasbutter, Vitriolgeist u. s. w. in Entzündung zu setzen, dann die Eiterung durch erweichende Mittel zu befördern und so die völlige Zerstörung des Sackes abzuwarten; oder, wenn die Masse der Balggeschwulst sehr weich ist, sie durch einen eingestochenen Troikart ausfließen zu lassen, dann durch reizende Injectionen von aufgelöstem Höllenstein, TR. Cantharidum u. s. w., welche man bis zur angehenden Entzündung zurückläßt, Eiterung zu erregen und diese dann durch eitermachende Mittel zu behandeln; oder endlich ein mit eitermachenden Mitteln bestrichenes Haarseil durch die Geschwulst zu ziehen, und so ebenfalls entweder die Geschwulst ganz auszurotten, oder sie dergestalt zu verkleinern, daß sie leichter exstirpirt werden kann.

4) Lymphatische und Blutgeschwülste in den Brüsten.

§. 579.

Die Balggeschwülste, wenn sie eine sehr flüssige Substanz enthalten, bilden den unmittelbaren Uebergang in die lymphatischen Geschwülste, und was daher von Entstehung, Erkenntniß und Behandlung jener gesagt ist, gilt auch im Wesentlichen von diesen, nur daß sie es insbesondre sind, die mit Verletzungen eines Lymphgefäßes oder allgemeinen Leiden des Lymphsystems in Verbindung stehen, weshalb bey ihrer Eröffnung mit besonderer Vorsicht zu verfahren ist. — Die Blutgeschwülste, wobey in eine freye Höhle flüssiges Blut ergossen ist, kommen beynahe noch seltener als die lymphatischen Geschwülste vor, und hängen vorzüglich mit Unter-

*) a. a. O. S. 311.

drückungen der Menstruation oder Congestionen nach den Brüsten zur Zeit der klimakterischen Jahre zusammen, wenn sie nicht unmittelbar durch äußere Gewalt und Zerreißung von Blutgefäßen entstanden sind. — Bey ihrer Behandlung ist zunächst auf die dieselben bedingenden allgemeinen Veranlassungen hinlängliche Rücksicht zu nehmen, theils örtlich durch eine kleine Oeffnung (sobald die Masse des ausgetretenen Blutes beträchtlicher ist) die Entleerung zu bewerkstelligen und dann durch fortgesetzten Gebrauch bitterer, die Resorption und Contraction befördernder Mittel (Fomentationen aus den Fl. Arnicae, Hb. Serpill., Hb. Absynth., Flor. Chamomill. rom. u. s. w., mit Wein, Campherspiritus u. s. w. vermischt) die Schließung der Höhle zu befördern.

3) Vom Skirrhus und Krebs der Brüste.

§. 580.

Es ist der skirrhöse und carcinomatöse Zustand der Brüste in so vieler Hinsicht dem gleichnamigen Zustande des Uterus verwandt, daß wir, namentlich was das eigentlich Wesentliche dieser Krankheitsform betrifft, wieder ganz auf dasjenige zurückweisen müssen, was oben (§. 448 ff.) in dieser Hinsicht bemerkt wurde. Demohnerachtet begründet auch hinwiederum das von dem Bau der Gebärmutterwände ganz abweichende Parenchyma der Brustdrüse theils das häufigere Vorkommen an diesem Orte, theils manche Eigenthümlichkeiten im Verlaufe des Uebels, so wie in seiner Behandlung.

§. 581.

Die Erkenntniß des Brustskirrhen wird gegeben durch Beachtung seiner Entwickelungsweise und der damit verbundenen schmerzhaften Zufälle. Gewöhnlich aber zeigt sich anfänglich ein kleiner, wenig schmerzhafter, beweglicher Knoten, welchen die Kranke oft längere Zeit getragen hat, ohne ihn zu bemerken; nach und nach wächst dieser Knoten zwar nicht immer an Umfange, aber dafür alsdann an Härte; seine Beweglichkeit vermindert sich, seine Schmerzhaftigkeit nimmt

zu, und die Kranken klagen entweder über ein anhaltendes Brennen an dieser Stelle, oder über oft wiederkehrende flüchtige Stiche, welche besonders bey plötzlichen Witterungsveränderungen, bey den eintretenden monatlichen Perioden u. s. w. sich verstärken. Dabey zeigt gewöhnlich der allgemeine Habitus etwas Kachektisches, eine blasse gelbliche Hautfarbe, Abmagerung u. s. w. — Endlich aber wird der Knoten plötzlich noch weit schmerzhafter, die Haut über denselben wird blaulich und mißfarbig, und nun bildet sich ein offenes Geschwür, dessen Natur dann freylich nicht mehr zu verkennen ist, wo aber auch meistens der Zustand unheilbar geworden ist.

§. 582.

Ein solches Krebsgeschwür zeichnet sich dann aus durch die harten ungleichen Ränder, durch das höchst mißfarbige Ansehen, durch den in der Tiefe stets fortwüthenden Schmerz und durch den Erguß einer auch hier (wie beym Gebärmutterkrebs) höchst übelriechenden Jauche, bey deren Abgang sich oft Stücke aus dem Grunde des Geschwürs mit ablösen, womit sich oft heftige Blutungen verbinden (wenn das tiefergreifende Geschwür Gefäße zerstört hat), und wobey im Allgemeinen die Reproduction immer mehr sinkt, Zehrfieber eintritt, der Schlaf durch die heftigen nächtlichen Schmerzen verscheucht wird, und zuletzt unter äußerster Abmattung der erwünschte Tod eintritt.

§. 583.

Rücksichtlich der Entstehung des Brustskirrhus und Krebses bemerken wir, daß auch hier, so wenig als bey dem Gebärmutterkrebs, irgend etwas uns berechtigt, einen eigenthümlichen Krankheitsstoff, ein besonderes Krebsgift anzunehmen, vielmehr die Verhärtung an und für sich von anderwärtigen Indurationen nicht wesentlich differirt, jedoch durch eine allgemeine krankhafte Stimmung der Reproduction nicht nur an ihrer Zertheilung gehindert, sondern durch eine im Umkreise derselben sich bildende chronische Entzündung theils vergrößert, theils zu einer bösartigen Eiterung geführt wird.

§. 584.

Obwohl man demnach Hrn. v. Winter*), welcher den Brustkrebs überhaupt mehr für eine allgemeine Krankheit gehalten wissen will, nicht füglich ganz beystimmen kann, so darf man doch von der andern Seite auch nie seine Eigenthümlichkeit zu sehr in lokaler Beziehung betrachten, sondern muß das Wesentliche stets als das Erzeugniß allgemeiner und lokaler Momente auffassen. — Hieraus ergiebt es sich, wie Verhärtungen ursprünglich verschiedener Natur, z. B. scrophulöse Knoten, Milchknoten, Verdichtungen des Zellgewebes durch erlittene Quetschung und Ergießung plastischer Lymphe, doch bey ungünstigen allgemeinen Verhältnissen eben so in den Krebs übergehen können, wie sie im Gegentheil bey günstigern allgemeinen Verhältnissen zur Zertheilung gelangen, und ferner, wie wirklich bereits skirrhös gewordene Knoten, wenn sie an einem Theile exstirpirt worden sind, an einem andern Theile gern sich wieder erzeugen (Beyspiele, auf welche namentlich v. Winter seine oben erwähnte Ansicht gründete).

§. 585.

Es folgt aus allem diesem, daß die entfernten Ursachen des Brustkrebses vorzüglich dreyerley Art seyn können, theils nämlich solche, durch welche überhaupt Verdichtungen und Verhärtungen entstehen können, wohin Stoß, Druck, unterlassenes Selbststillen u. s. w. gehören, theils solche, durch welche eine chronische Entzündung veranlaßt und unterhalten werden kann, als Erkältungen, Mißbrauch erhitzender Getränke, Congestionen nach den Brüsten durch fehlerhafte Menstruation, oder durch die klimakterischen Jahre bedingt, Anwendung zu reizender Mittel u. s. w., theils endlich solche, welche die Reproduction im Allgemeinen untergraben, die Function der Lymphgefäße und des venösen Sy-

*) Ist der Brustkrebs ursprünglich eine örtliche Krankheit? in B. v. Siebold's Chiron. Bd. 2. St. 3.

stems stören, als ungesunde Luft, schlechte Nahrung, frühere syphilitische, scrophulöse, rhochitische Krankheit und Gemüthsleiden. — Zu erwähnen ist jedoch noch, daß die skirrhösen Verhärtungen der Brüste zuweilen auch nur äußere Zeichen eines krankhaften Zustandes des Geschlechtssystems überhaupt und insonderheit des Uterus sind, weßhalb denn Brustskirrhen sehr häufig gleichzeitig mit Scirrhus und Carcinoma uteri vorkommen. — Die Einwirkungen endlich, welche vorzüglich den Uebergang des Skirrhus in offenes Krebsgeschwür befördern können, sind im Ganzen wieder ziemlich dieselben, welche die Entstehung des Skirrhus überhaupt begünstigen; die häufigsten unter denselben sind mechanische Reizung, der Gebrauch erweichender Mittel, vorzüglich der Breyumschläge, die klimakterischen Jahre u. s. w. — Im Ganzen pflegt der Uebergang in Krebsgeschwür immer um so eher zu erfolgen, je verdorbener die allgemeine Constitution ist, um so später hingegen und oft erst nach einer langen Reihe von Jahren, oder gar nicht, je kräftiger dieselbe ist.

§. 586.

Die Prognose muß bey einem Uebel dieser Art stets ungünstig ausfallen, da es immer ein Zusammentreffen besonders glücklicher Umstände erfordert, wenn die Heilung gelingen soll. Nur wo die Verhärtung und Entzündung im Umkreise derselben offenbar in Folge anderweitiger krankhafter Zustände, z. B. bey Unterdrückung der Menstruation, entstanden ist, und diese primären Abnormitäten günstige Aussicht für Heilung gewähren, oder hinwiederum, wo das Uebel mehr aus örtlichen, namentlich mechanischen, Einflüssen entsprungen, an sich noch neu, und die allgemeine Constitution kräftig ist, überhaupt aber weder wegen zu beträchtlichem Umfang und Verhärtung, noch wegen veränderter Hautfarbe und heftiger werdenden Stichen und Jucken der nahe Uebergang in Krebs befürchtet werden darf, kann eine günstigere Prognose gestellt werden, dahingegen bey höherem Grade des Uebels, besonders wenn schon die benachbarten Theile mit ergriffen sind, die Knoten mit den darunter liegenden

Theilen sich fest verbunden haben, die Achseldrüsen mit angeschwollen sind, und ganz vorzüglich, wo das Krebsgeschwür bereits völlig ausgebrochen ist, Rettung der Kranken fast nie mehr gelingen kann.

§. 587.

Die Behandlung kann, so lange das Uebel noch als skirrhöse Verhärtung erscheint, entweder auf Zertheilung oder unmittelbar auf Ausrottung des Knotens gerichtet seyn; im Falle des ausgebrochenen Krebses findet, wenn überhaupt noch Hülfe möglich ist, diese insgemein nur mittelst des Messers Statt, und in den Fällen endlich, wo wegen ausgebreitetem, den benachbarten Theilen bereits mitgetheilten krebshaftem Zustande an der Heilung gänzlich verzweifelt werden muß, kann bloß von palliativer Behandlung die Rede seyn.

§. 588.

Zuerst betrachten wir diejenigen Mittel, welche zur Zertheilung krebsartiger Knoten der Brüste die heilende Kunst darbietet. Hierbey ist eines Theils wichtig, eben so wie bey den Skirrhen des Uterus, auf die allgemeine krankhafte Disposition Rücksicht zu nehmen, gegen scrophulöse, syphilitische, rheumatische, arthritische Zustände ein zweckmäßiges Verfahren eintreten zu lassen, und auf Verbesserung der äußern Verhältnisse der Kranken dadurch zu wirken, daß man sie in gesundere Luft bringt, ihnen eine leicht verdauliche, gelind nährende, besonders mehr vegetabilische Diät anordnet, und durch den Gebrauch von allgemeinen Bädern, so wie vorzüglich durch Aufheiterung des Gemüths den Stand der Reproduction zu erhöhen und zu verbessern sucht.

§. 589.

Außer diesen allgemeinen Maßregeln muß nun ferner das specielle Heilverfahren namentlich bezwecken: theils die chronische Entzündung, durch welche die abnorme Bildung stets verstärkt wird, zu mäßigen, theils die Aufsaugung und Rückbildnng der Verhärtungen zu befördern. In ersterer,

besonders wichtiger Hinsicht*) wird die sorgfältige Vermeidung aller den Organismus gewaltsam erregender Einflüsse, erhitzender Getränke und reichlicher Diät namentlich, zur Pflicht, man reicht von Zeit zu Zeit kühlende Abführungen, und kann, vorzüglich wenn die Entzündung durch lebhaftere Schmerzen sich äußert, bey kräftigern Naturen selbst wiederholte örtliche oder allgemeine Blutentziehungen, den Gebrauch kühlender Emulsionen, des Salpeters u. s. w. nicht entbehren; dahingegen bey sehr schwächlicher oder kachektischer Constitution der Entzündung mehr durch das antiphlogistische Regimen, durch mäßige Beförderung der Hautthätigkeit, so wie durch den vorsichtigen innern und äußern Gebrauch des Queckſilbers entgegengewirkt werden muß.

§. 590.

Um ferner die Zertheilung der schon krankhaft verbildeten Stellen selbst zu bewerkstelligen, dienen die stärkern, unter den schon oben (§. 565 u. 566.) erwähnten, Mittel, das Emplastr. de Cicuta und Empl. mercuriale, das sal Tauri mit sal ammoniac., die frisch gequetschten Blätter von der Calendula officinalis, dem Sedum acre, der Belladonna, das Unguentum neapolit. mit dem Liniment. vol. camphorat. u. s. w. Hierbey muß übrigens immer die Wirkung der örtlichen Wärme mit zugezogen werden, das Tragen zertheilender Kräuterkissen oder warmer Thierfelle Statt finden, so wie innerlich das Extract. Cicutae, Belladonnae, die Merkurialien und Antimonialien, der Kirschlorbeer angewendet werden; und so kann denn allerdings zuweilen, namentlich in Fällen, wo die Kranken durchaus zur Operation sich nicht entschließen können, mittelst anhaltender Befolgung dieser Methode, Rückbildung in den nor-

*) Besonders hat hierauf Lasserre in einem interessanten Aufsatze des Journal universel des sciences médicales Juin 1819. p. 289. aufmerksam gemacht.

malen Zuſtand bewirkt, oder in andern Fällen, wo die Verwachſung des Krebsknotens mit dem Bruſtmuskel die Operation verhinderte, erſterer vielleicht beweglicher und ſo zur Operation geſchickter gemacht werden. †)

§. 591.

Ehe wir nun die Operation ſelbſt näher durchgehen, iſt es noch nöthig, einiges über die mediciniſche Behandlung des offenen Bruſtkrebſes beyzufügen, welche nämlich einen doppelten Zweck haben kann, d. i. entweder auch in dieſem Stadio der Krankheit, wo ſie in der Regel unheilbar iſt, noch einen Verſuch zur Rettung der Kranken zu machen, oder nur palliativ gegen die heftigen Schmerzen und öfters eintretenden Blutungen Linderung zu ſchaffen. Den erſteren Zweck hat die fortgeſetzte innere und äußere Anwendung mehrerer Kräuterſäfte, z. B. des Schierlings, der Belladonnä, des Kirſchlorbeers, des rothen Fingerhuts, der Ringelblume (Calendula officinalis), des Onopordon acanthium, des Sedum acre, Chenopodium bonus Henricus u. a. m. — Ferner der Gebrauch des Arſeniks (obwohl dieſes hier nur mit der größten Vorſicht angewendet werden darf), der äußere Gebrauch der ſalzſauren Dämpfe, *) das Aufſtreuen des Kohlenpulvers, **) das Auflegen einer lebenden Kröte auf das Krebsgeſchwür, ***) die ſchon oben erwähnte Anwendung des Goldſalzes und mehrerer anderer bald hier bald da empfohlener

†) Zuweilen hat man auch (namentlich Young) gegen Krebsknoten der Brüſte, wie gegen die Balggeſchwülſte derſelben, die Anwendung eines mechaniſchen Druckes empfohlen, allein wir zweifeln ſehr an der Nützlichkeit dieſes Verfahrens, ja befürchten vielmehr dadurch den Uebergang in Krebsgeſchwür beſchleunigt zu ſehen (m. ſ. die Nachricht von einer unglücklich abgelaufenen Behandlung dieſer Art in d. Salzb. medic. chirurg. Zeit. 1819. Nro. 13. aus d. Edinburgh med. and. surg. Journal.

*) S. Hufeland's Journ. f. d. prakt. Heilk. 1809. 6s St.

**) S. ebendaſ. Bd. XXV. St. 1.

***) S. Richter Anfangsgr. d. Wundarznk. Bd. I. S. 298.

Mittel, welche indeß gewöhnlich bey wiederholter Anwendung wenig geleistet haben (vergl. §. 459. 460.).

§. 592.

Was die bloß Linderung der quälendsten Zufälle bewirkenden Mittel anbelangt, so steht wieder unter den die heftigsten Schmerzen beruhigenden das Opium oben an, womit äußerlich Fomentationen des Krebsgeschwürs mit Aufgüssen der Cicuta, oder Abkochungen der Mohnköpfe verbunden werden können. Zur Verminderung des Ausflusses und des höchst übeln Geruchs dieser Geschwüre empfiehlt sich ferner das Aufstreuen von Kohlenpulver oder Anwendung von Kohlensalbe zum Verband, das Auflegen eines Karottenbreyes mit etwas Opiattinktur, vielleicht auch ganz vorzüglich des empyreumatischen Holzessigs, dessen stark antiseptische Kraft man neuerlich erprobt hat. Zur Beseitigung der Blutungen benutzt man das Aufdrücken eines Schwammes mit einer Mischung aus dem concentrirten Infus. serpilli und Weingeist befeuchtet und mit etwas styptischem Pulver bestreut, ja in manchen Fällen wird die Anwendung des glühenden Eisens kaum umgangen werden können. Innerlich ordnet man säuerliche Getränke (vorzüglich mit mineralischen Säuren), das Dowersche Pulver, die Phosphorsäure u. s. w. an, und läßt ein sehr ruhiges Verhalten beobachten.

§. 593.

Die oft so geringe Wirkung dynamischer Mittel läßt nun, namentlich so lange das Uebel noch auf der Stufe des Skirrhus verweilt, die Operation allerdings als das zweckmäßigste Mittel zur Heilung erkennen; Gegenanzeige zu derselben würde es jedoch abgeben, wenn man den Skirrhus mehr für allgemeine, als für örtliche Krankheit zu halten berechtigt wäre; allein wie oben bemerkt wurde, ist er beides, oft nur das eine mehr als das andere, und eben deßhalb muß es ein wichtiger Theil der Heilung seyn, wenn

an den Wänden derselben noch verhärtetes Zellgewebe, oder krankhafte Gefäße sich vorfinden; auch diese müssen dann hinweggenommen werden, und nun erst schreitet man zum Schluß der Wunde. In Fällen, wo es möglich war, den Grund derselben von allem Krankhaften zu reinigen, und keine Unterbindung von Gefäßen nöthig war, zieht man sodann die Wunde durch Heftpflasterstreifen zusammen, bewirkt durch das Mittel einer starken Compresse und umgelegte Binden das Andrücken der Haut an den Grund der Wunde, und sucht so die schnelle Vereinigung zu bewerkstelligen; außerdem wird es nöthig, die Wunde mit Charpie anzufüllen und die Heilung durch Eiterung zu Stande zu bringen.

§. 598.

Ist nun aber der Skirrhus irgend von beträchtlichem Umfange, so thut man auf jeden Fall besser, sogleich die ganze Brust hinwegzunehmen,*) welches dann noch unerläßlicher wird, wenn bereits Krebs eingetreten ist, oder wenigstens die Brust in ihrem ganzen Umfange verhärtet ist, ja zuweilen müssen hierbey sogar, wenn gleichzeitig schon eine oder mehrere Achseldrüsen verhärtet sind (ein Fall, in welchem freylich zuweilen das Uebel schon allzusehr überhand genommen hat und mitunter die Operation gar nicht mehr erlaubt), auch diese mit hinweggenommen werden; obwohl man auch berechtigt ist, da, wo etwa diese Achseldrüsen sehr tief liegen und die Operation derselben deßhalb sehr gefährlich erscheint, zuvörderst die Ausrottung der Brust allein zu unternehmen, und unter allgemeiner zweckmäßiger Behandlung dann abzuwarten, ob vielleicht die mitunter (wie durch einige von Richter angeführte Fälle erwiesen wird) nur consensuell angeschwollenen Drüsen sich von selbst zertheilen, dahingegen

*) Richter (Anfangsgr. d. Wundarznk. 4r Bd. S. 416.) macht es sogar wahrscheinlich, daß der Schmerz hierbey nicht viel größer sey, als bey bloßer Exstirpation. Ueberhaupt verdient hierüber die ganze treffliche Abhandlung Richters a. a. O. nachgelesen zu werden.

allerdings, sobald sie vielmehr stärker anschwellen, ihre Exstirpation ungesäumt nachgeholt werden muß.

§. 599.

Die Ausrottung der gesammten Brust verrichtet man am besten bey einer sitzenden Stellung der Kranken, wo sie von zwey Gehülfen hinlänglich unterstützt wird, und nach hinlänglicher Vorbereitung der Apparate zur Stillung eintretender Blutung und zum Verband. Mehrere haben auch bey der Kranken, selbst als Vorbereitung zur Operation, die Milchdiät, mehrere Abführungen, das Legen eines Fontanells empfohlen, welches allerdings auch unter manchen Umständen, namentlich bey Neigung zu gastrischen Unordnungen, bey anderweitigen, das Uebel unterhaltenden, noch nicht ganz ausgerotteten Krankheitsstoffen gewiß mit Nutzen zu befolgen ist. — Die Hautöffnung zur Ausschälung der Brust wird sodann in schiefer Richtung von der Schulter gegen den untern Theil des Brustbeins gemacht, so daß zwey halbmondförmige in der Mitte (sobald übrigens die Haut noch gesund ist), nur gegen drey Finger breit auseinanderstehende Schnitte die Warze einschließen (ist die Haut selbst schadhaft, so muß freylich die Hautwunde größer werden, allein auch die Heilung erfolgt dann weniger leicht). Die Länge des Schnittes muß die der Brustdrüse aufwärts und abwärts ohngefähr einen Finger breit übertreffen.

§. 600.

Um nun das Ausschälen selbst zu bewerkstelligen, trennt man erst den einen Hautlappen von der Brust von außen nach innen, dann die Brust vom Brustmuskel und endlich die Brust vom andern Hautlappen von innen nach außen ab. Indem man hier zuerst die Brust von dem einen und zuletzt von dem andern Hautlappen absondert, welches durch das Messer geschehen muß, nimmt man sich sehr in Acht, daß nichts Krebshaftes an der Haut sitzen bleibe; und eben so

sorgfältig verfährt man bey dem Ablösen der Brust vom Brustmuskel selbst, welches wieder mehr durch die Finger und den Scalpelstiel geschehen muß, indem man stets vom untern Winkel der Wunde anfängt; damit man nicht bey dem Trennen in entgegengesetzter Richtung zuletzt durch die Blutung gestört werde. Findet man hierbey Brust und Brustmuskel fest verbunden, so muß ein Stück des letztern selbst mit hinweggenommen werden, und ist endlich die Brust ganz hinweggenommen, so muß man den Grund der Wunde nochmals auf das Genaueste untersuchen, damit alles, was noch irgend verdächtig scheinen könnte, völlig hinweggenommen werde; hierauf läßt man die Wunde etwas ausbluten, stillt sodann das Blut durch Aufdrücken eines in kaltes Wasser mit etwas Weingeist getauchten Schwammes, oder bey größern Gefäßen durch die Unterbindung.

§. 601.

Das Schließen der Wunde geschieht in den meisten Fällen bloß durch Heftpflasterstreifen, nur, wo sehr viel Haut verloren gegangen ist, möchte die blutige Nath nicht ganz zu entbehren seyn. Man bedeckt die Wunde sodann durch eine starke Compresse und befestigt dieselbe durch die von Richter*) empfohlne Binde. Zugleich müssen die Bewegungen des Arms dieser Seite durch Tragen in einer Binde beschränkt und ein antiphlogistisches Verhalten beobachtet werden. Die weitere Behandlung hat nichts Ausgezeichnetes. Da man zuweilen üble Zufälle in der Wunde vom Eintritt der monatlichen Periode bemerkt hat, so thut man wohl, die Operation stets nach dem letzten Eintritt dieser Periode zu unternehmen. — Ist nun aber endlich auch die Wunde wirklich glücklich geheilt, so muß demohnerachtet die Kur noch nicht als völlig beendigt angesehen, sondern es müssen alle die oben (§. 588 — 590.) genannten Maaßregeln fortwäh-

*) a. a. O. S. 411.

rend angewendet werden, welche dazu dienen können, auch die im Allgemeinen begründete krankhafte Reproduction zu beseitigen; zugleich muß die Narbe fortwährend durch ein aufgelegtes Thierfell warm gehalten und gegen alle Reizung geschützt werden, und nur durch gleichzeitiges Beobachten aller dieser Heilregeln kann denn mitunter die völlige Genesung gehofft werden.

V.

Von einigen krankhaften Zuständen der äußern Geschlechtstheile.

§. 602.

Die äußern weiblichen Geschlechtstheile können, außerdem daß sie, wie jeder anderer Theil der Oberfläche des Körpers, verschiedenen Verletzungen unterworfen sind, welche dann nicht wesentlich andere Behandlung als an andern Stellen des Körpers fordern, vorzüglich mancherley Degenerationen, oder auch wohl krankhafte Aussonderungen zeigen, von denen wir noch einige der wichtigsten besonders aufführen müssen.

§. 603.

Erstens die Verletzungen betreffend, so ist hier namentlich der Zufälle zu gedenken, welche bey Neuverheiratheten mitunter auf die Verletzung des Hymens folgen und zu welchen sich, namentlich bey beträchtlicher Engigkeit der Scheidenöffnung, leicht Entzündung und Anschwellung der Schamlefzen gesellen. Man wird diese Zufälle am schnellsten durch Anwendung solcher Mittel beseitigen, welche auch an andern Stellen des Körpers, sobald Quetschung und Druck allein die Oberfläche wund gemacht haben, am schnellsten Hülfe gewähren; Umschläge von Bleywasser, oder vom Absud der Hb. serpilli, absynthii, des Cort. Quercus u. s. w.,

§. 608.

Die Warzen sind von ungleicher Oberfläche und wenig veränderter Hautfarbe; sie sind von geringer Empfindlichkeit, wachsen aber schnell, verursachen auf der gegenüberliegenden Wandung der Geschlechtstheile anhaltende Reizung, und, sobald sie in größerer Anzahl vorhanden sind, einen schleimigen Ausfluß.

§. 609.

Da diese Auswüchse fast immer venerischen Ursprungs sind, so muß man, wenn gleichzeitig noch andere Spuren der Ansteckung oder wohl gar noch offene Geschwüre gefunden werden, zunächst zur antisyphilitischen Behandlung durch Merkurialmittel schreiten, und damit fortfahren, bis alle nach Heilung der Chanker etwa zurückgebliebene Härte verschwunden ist. Die Warzengeschwülste selbst werden am besten durch Wegschneiden mittelst der Schere entfernt, nur wo wenige Warzen sich vorfinden und bey sehr empfindlichen Subjekten kann man statt dessen das Abbinden durch einen seidenen gewichsten Faden wählen. Wo sie dagegen sehr zahlreich sitzen, rathet Clarke, die ganze Hautpartie, auf welcher sie sich befinden, durch einen Schnitt mit der Schere zu entfernen. Die Blutung kann man durch Betupfen mit Höllenstein stillen, und die Wunden heilen gewöhnlich sehr bald.

§. 610.

Wo durch Syphilis die Haut der Schamlefzen überhaupt verhärtet und zu dergleichen Excrescenzen geneigt ist, oder auch, wo die Warzen gern nach der Ausrottung wiederkehren, ist es zweckmäßig, Mittel anzuwenden, welche die Thätigkeit der feinern Gefäße in diesen Theilen erhöhen und einen regern Stoffwechsel und dadurch gesundere Produktivität befördern. Dazu dienen aromatische Bidethäder, die Aqua phagadaenica, die Auflösung von Kupfervitriol, von

Höllenstein u. s. w. Um endlich den zuweilen nachbleibenden Schleimfluß zu heilen, wird man nach ähnlichen Regeln, wie oben (§. 604.) gegeben sind, verfahren.

VI.

Von einigen krankhaften Zuständen der weiblichen Harnwege.

§. 611.

Es ist hier endlich noch der Ort derjenigen krankhaften Zustände der Harnwerkzeuge zu erwähnen, welche dem weiblichen Geschlecht eigenthümlich sind, und es versteht sich sonach von selbst, daß die Krankheiten der Nieren, der Ureteren, und selbst die mehresten derer, welche die Blase befallen können, nicht hierher zu rechnen sind.*). Dagegen bietet die weibliche Harnröhre mehrere Ausartungen dar, und diese sowohl, als die besondere Art, erzeugte Harnsteine aus der Blase zu entfernen, machen hier noch eine eigene Betrachtung nöthig.

1) Von der beträchtlichen Erweiterung der weiblichen Harnröhre.

§. 612.

Dieser Kanal, welcher überhaupt an Weite bey Frauen, vorzüglich wenn sie ein oder mehrere Male geboren haben, die Weite der jungfräulichen Urethra bedeutend übertrifft, besitzt eine so große Ausdehnbarkeit, daß man in einzelnen Fällen ihn bis zum Durchmesser eines halben oder ganzen Zolles erweitert gefunden hat, und dadurch öfters (obwohl

*) Von der Dysurie, Ischurie, Enuresis und den Harnfisteln, in sofern sie in Folge der Schwangerschaft oder Geburt eintreten, wird im zweyten Theile die Rede seyn.

lich bey jungen vollsaftigen Frauen, zumal wenn diese Theile durch ausschweifende Lebensweise öfters gereizt werden, die Venen der Vagina sowohl als der Urethra leicht in einen Zustand bleibender Ueberfüllung, schwellen an und erregen dadurch Zufälle, welche den Hämorrhoidalbeschwerden ganz analog sind, wie diese sich mit Tenesmus, vermehrter Empfindlichkeit und Schleimabgang gern verbinden, und selbst zu wuchernden Auswüchsen oder entzündlichen Zuständen Veranlassung werden können. Erfolgt dieses mehr an der Mündung der Harnröhre, so bildet dieß die erste, entsteht es im ganzen Verlaufe derselben, so bildet es die zweyte der von Clarke beschriebenen Krankheitsformen.

§. 616.

Die Behandlung anlangend, so muß sie theils allgemein, theils örtlich seyn; in ersterer Hinsicht, welche namentlich, wo das Uebel die ganze Urethra trifft, von Wichtigkeit ist, muß die Kranke auf eine kühlende antiphlogistische Diät und Lebensordnung gesetzt werden, gelinde Abführmittel aus den Schwefelblumen und Weinsteinrahm, der Pulpa tamarindorum u. s. w. sind anzuwenden, und alle Reize, wodurch die Geschlechtswerkzeuge und Harnwege aufgeregt werden könnten, sorgfältig zu vermeiden. Ist die Plethora überdies beträchtlich, die Menstruation vielleicht sparsam oder unterdrückt, so können selbst allgemeine Blutentziehungen mit Nutzen angewendet werden.

§. 617.

Was die Gefäßgeschwulst an der Mündung der Harnröhre betrifft, so rathet Clarke vorzüglich zur Wegschaffung derselben entweder durch die Abbindung oder durch die Schere, welches allerdings, sobald sie eine beträchtliche Größe und Schmerzhaftigkeit erreicht hat, das zweckmäßigste bleibt, dahingegen bey einem geringern Grade des Uebels oft schon adstringirende kalte Fomentationen aus dem Aufguß von Ab-

sinthium, serpillum, mit rothem Wein, Tinct. Terrae Catechu u. s. w., nebst dem Einlegen einer starken Kerze und dem dadurch verursachten Zusammendrücken der Geschwulst vollkommen ausreichen. Wird die Ausrottung nothwendig, so ist die Ligatur vorzuziehen, welche meistens in Zeit von vierundzwanzig Stunden das Uebel beseitigt. Bey dem Wegnehmen mit der Schere wird von Clarke das Betupfen mit dem Causticum commune mitius vorzüglich empfohlen, um das Wiederkehren der Geschwulst zu verhindern.

§. 618.

Bey ähnlichen Anschwellungen der innern Harnröhrenwandung überhaupt ist die Behandlung zwar namentlich auf das oben erwähnte allgemeine Verfahren eingeschränkt, außerdem aber sind hier ganz vorzüglich die örtlichen Blutentziehungen unentbehrlich, entweder durch Ansetzen von Blutigeln neben den großen Schamlefzen, oder nach Clarke's Rath durch unmittelbares Eröffnen der stärker angeschwollenen Venen auf der innern hervorgetretenen Fläche der Urethra. Nach vollzogener Blutentleerung aber müssen dann wieder die im vorigen Paragraph angeführten Mittel, oder, bey großer Empfindlichkeit, das Kalk- oder Bleywasser kalt angewendet werden, und sie können auch hier durch den Druck einer Kerze unterstützt werden.

3) Von den Steinbeschwerden des weiblichen Geschlechts.

§. 619.

Vermöge der beträchtlicheren Weite der weiblichen Urethra ist es zwar seltener, daß bey Frauen sich größere Steine in der Harnblase erzeugen können, indem sie gewöhnlich bald nach ihrer Bildung ausgestoßen werden; demohnerachtet kommt es zuweilen vor, und es ist besonders nöthig, daß der Arzt für Frauenkrankheiten darauf achte und die Zeichen derselben

kenne, weil er die Ursachen der Schmerzen und sonstigen Beschwerden außerdem leicht in den Geschlechtsorganen selbst suchen und dadurch von Ergreifung eines allein zweckmäßigen Heilverfahrens abgehalten werden könnte.*)

§. 620.

Als Zeichen des Blasensteins sind vorzüglich die mannichfaltigen schmerzhaften Empfindungen in der Blasengegend zu betrachten, welche in hohem Grade zunehmen, wenn die Kranke sich viel bewegt oder längere Zeit steht. Vorzüglich nach der Entleerung der Blase vom Urin bleiben krankhafte Empfindungen zurück, ja der Abfluß des Urins selbst wird oft, plötzlich (indem sich der Stein vorlegt) unterbrochen, und nur, nachdem die Kranke die horizontale Lage angenommen hat, wird der Abgang wieder frey. Zugleich bewirkt der Reiz des Steins conseusuelle Erregungen benachbarter Organe, Jucken der äußern Geschlechtstheile, Pressen, Drang zum Stuhlgange, ja wirkliche Zufälle einer Blasenentzündung (vorzüglich wenn der Stein sehr rauhen ist), oder Schleimflüsse aus der Mutterscheide und Harnröhre. Der Urin selbst ist meistens trübe, mit vielem Schleim, oft mit Eiter oder Blut vermischt, und setzt gewöhnlich (welches eins der wichtigsten Kennzeichen abgiebt) bey ruhigem Stehen Sand ab.

---

*) So suchte vor einigen Jahren eine Frau, angeblich wegen eines Gebärmuttervorfalls (gegen welchen sie sich schon einige Pessarien anderwärts ohne Erleichterung hatte legen lassen) bey mir Hülfe. Da wirklich, wahrscheinlich in Folge öftern schmerzhaften Pressens beym Uriniren, der Uterus etwas vorgefallen war, sollte ein elastisches Pessarium eingelegt werden, allein die Schmerzen wurden alsbald heftiger. Ich entfernte das Pessarium, beobachtete den Harn, fand ihn mit Gries vermischt, und entdeckte nun beym Sondiren einen beträchtlichen Stein als die Ursache ihres Leidens, welcher sodann durch den Schnitt glücklich entfernt wurde.

§. 621.

Ganz zuverläßig indeß kann man sich vom Vorhandenseyn des Steins erst durch das Sondiren der Harnblase mittelst des Catheters überzeugen, wobey übrigens, wenn vielleicht der Blasenstein in einer Falte oder Vertiefung der Blase sich verbergen sollte, die Kranke den Urin so lange anhalten muß, bis zu erwarten ist, daß durch diese Ausdehnung der Stein selbst frey geworden sey. Auch von der Beschaffenheit der Oberfläche, von der Größe des Steins kann der Arzt durch diese Untersuchung Kenntniß erhalten, ja man ist zuweilen recht wohl im Stande, den Stein durch den in die Vagina eingebrachten Finger selbst zu erreichen und zu untersuchen.

§. 622.

Was nun die Ursachen zur Entstehung des Steins, die ärztliche Behandlung der Anlage zur Steinerzeugung und die Anwendung der Mittel, um die Auflösung des Steins zu bewirken, betrifft, so kann dieses weiter nicht Gegenstand unserer Erörterungen seyn, da es nicht wesentlich von dem abweicht, was über die Steinkrankheit überhaupt die specielle Therapie lehrt. Es ist daher nur zu erwähnen, theils daß die Methode, den Stein durch Einspritzung chemischer, der Natur des Steins angemessener Flüssigkeiten aufzulösen,*) hier wegen der Weite und Kürze der weiblichen Urethra leichter Anwendung findet, theils daß die Methode, den Stein durch die Operation wegzunehmen, gleichfalls leichter als beym männlichen Geschlecht, überhaupt aber in mehrerer Hinsicht von dem im männlichen Geschlecht zu unternehmenden Steinschnitt verschieden sey, worüber daher noch Einiges beyzufügen ist.

*) Hierher gehört der Vorschlag Ritter's (s. Hufeland's Journal für die prakt. Heilk. Bd. XXV. Heft 2.), die alkalische Rinde der Harnsteine durch verdünnte Salzsäure, den gelben gesäuerten Kern derselben durch Kalilauge aufzulösen.

§. 623.

Man hat aber bey der Steinoperation im weiblichen Geschlecht mehrere Arten zu unterscheiden: erstens nämlich die Extraction ohne Schnitt, durch die bloße Ausdehnung der Urethra, wobey der Stein entweder aus der Harnblase selbst, oder aus der Harnröhre, wenn er bereits in diese herabgetreten ist, ausgezogen wird, und zweytens die Extraction durch den Schnitt.

§. 624.

Da, wie schon oben erwähnt, die Ausdehnbarkeit der weiblichen Harnröhre sehr groß ist, so verdient die Ausziehung des Steins ohne Schnitt in allen Fällen, wo man sich durch sorgfältige Untersuchung von der Kleinheit des Steins überzeugt hat, den Vorzug. Die Ausdehnung selbst muß, damit nicht ein Unvermögen, den Harn zu halten, zurückbleibe, sehr langsam gemacht werden, und man kann sich zu diesem Endzweck entweder nach Bromfield eines kleinen thierischen Blinddarms bedienen, welcher erst durch eine Sonde in die Blase gebracht, und dann durch eingespritztes Wasser ausgedehnt wird, oder, nach Richter, zweyer Conductoren, von welchen der männliche zuerst auf einer geraden Hohlsonde, und dann der weibliche auf dem männlichen eingebracht wird, und wodurch man, indem der eine unbeweglich unter dem Schambogen liegt und der zweyte beweglich nach unten und rechts und links bewegt wird, die Urethra allmählig so weit ausdehnt, bis der Stein gefaßt und, wie in andern Fällen durch die Schnittwunde, ausgezogen werden kann. — Steckt der Stein bereits in der Harnröhre (welches jedoch beym weiblichen Geschlecht selten vorkommt), so kann er gewöhnlich mittelst eines kleinen gebogenen Steinlöffels ausgezogen werden; außerdem müßte die Harnröhre seitwärts gespalten, und dann das Ausziehen verrichtet werden.

§. 625.

Die Ausziehung des Steins durch den Schnitt geschieht am besten so, daß nach eingebrachter gerinnter Sonde zuerst mittelst eines schmalen geraden stumpfspitzigen Bisturi's seitwärts in der Richtung nach der Mitte, zwischen der Oeffnung des Afters und dem Sitzbeinhöcker (um die Mutterscheide nicht zu verletzen), eingeschnitten, dann in die Schnittwunde auf der Sonde das Gorgeret und endlich auf diesem die Steinzange eingebracht wird, um so nach denselben Regeln, wie beym männlichen Geschlecht, den Stein zu fassen und auszuziehen. Für sehr große Steine hat man zuweilen den Steinschnitt durch die Mutterscheide zu machen empfohlen; allein immer wird hier zu fürchten seyn, daß eine Fistel zurückbleibe, oder es sind andere, besonders für nachfolgende Entbindungen unangenehme Zufälle nicht zu vermeiden, weshalb es denn für ähnliche Fälle allerdings zweckmäßiger seyn dürfte, die hohe Geräthschaft anzuwenden, und den Stein sonach über dem Schambogen herauszunehmen, wobey der Vortheil Statt findet, daß man ihn durch die Mutterscheide gegen die Wunde hindrücken kann. — Die Behandlung nach der Operation ist übrigens von der beym männlichen Geschlecht anwendbaren nicht wesentlich unterschieden.

Dritte Abtheilung.

Von den Krankheiten in der letzten Lebensperiode des weiblichen Körpers.

§. 626.

Es ist bereits früher (§. 81.) erwähnt worden, daß in dem höhern Lebensalter des Weibes eigenthümliche Krankheiten fast eben so wenig als in der ersten Lebensperiode vorkommen, wovon der Grund in dem hier immer sichtbarer werdenden Erlöschen der Geschlechtseigenthümlichkeit überhaupt gesucht werden muß. Wenn aber auch neue, dieser letzten Periode ausschließend eigene Krankheitsformen kaum aufgeführt werden können, so ist es dagegen um so häufiger, daß Krankheiten, welche wir unter der zweyten Abtheilung haben kennen lernen, in diese dritte Periode sich fortpflanzen. Vorzüglich gehören dahin alle diejenigen, welche an und für sich selbst auf Schlaffheit und Abwelken oder Degeneriren der Geschlechtsorgane beruhen; daher kommen denn passive Blutungen, Schleimflüsse, Verhärtungen oder Verknöcherungen der Geschlechtstheile, fehlerhafte Lagen derselben, krebshafte Zustände, polypöse Auswüchse u. s. w., in den höhern Jahren des weiblichen Geschlechts sehr häufig vor, indem sie entweder aus den früheren Jahren mit in diese spätern übergetragen werden, oder indem sie wirklich erst in den Jahren nach Erlöschen der Menstruation entstehen, wenigstens durch diese Revolution verschlimmert werden, oder einen andern Charakter annehmen.

§. 627.

Bey allen diesen Beschwerden kann nun auch in den höhern Lebensjahren eine andere Behandlung, als bereits oben angegeben worden, nicht Statt finden, und wir müssen hierüber auf die zweyte Abtheilung zurückweisen. Dagegen blei-

ben uns hier noch diejenigen Regelwidrigkeiten zu betrachten übrig, welche das Aufhören der Menstruation verursacht, indem es entweder zu zeitig erfolgt, oder der Monatsfluß zu lange andauert.

I. Zu zeitiges Erlöschen der Menstrualfunction.

§. 628.

So wie der Eintritt der Menstruation nach der verschiedenen Individualität an sehr verschiedene Jahre geknüpft ist, und sonach der Begriff der zu zeitigen Menstruation bloß nach der Einwirkung der erscheinenden Regeln auf das Allgemeinbefinden abgemessen werden konnte, so müssen wir auch, da gleicher Weise das Aufhören der Menstruation nicht in allen Frauen an denselben bestimmten Zeitpunkt geknüpft ist, das zu zeitige Aufhören derselben nur in den Fällen annehmen, wo bemerkt wird, daß dadurch eine Disharmonie mit den übrigen körperlichen Functionen gesetzt, und krankhafte Zufälle veranlaßt werden.

§. 629.

Die Ursachen und Folgen des zu zeitigen Verschwindens der Menstruation haben Vieles gemein mit dem, was früher über die sparsame, seltene und unterdrückte Menstruation bemerkt worden ist. Bedingt wird das zeitigere Aufhören der Regeln nämlich wiederum theils durch lokale, theils durch allgemeine Regelwidrigkeiten: die lokalen bestehen vorzüglich in krankhaften Zuständen des Uterus selbst, in Degenerationen seiner Substanz, in Schleimflüssen u. s. w., wobey die Folgen für das allgemeine Befinden stets um so beträchtlicher seyn werden, je mehr die Reproduction überhaupt noch kräftig ist. Diese Folgen bestehen dann in Congestionen, vikariirenden Blutungen, und als Rückwirkungen des Gefäß-

ſyſtems auf das Nerven- und Verdauungsſyſtem in vielfachen hyſteriſchen, rheumatiſchen, gichtiſchen Zufällen und mannichfaltigen Verdauungsbeſchwerden, welche Leiden dann ſämmtlich oft durch die örtlichen krankhaften Zuſtände, die dadurch verurſachten Schmerzen, Rückwirkungen auf benachbarte Organe u. ſ. w., erhöht werden.

§. 630.

Von allgemeinen Krankheitszuſtänden, welche das zeitigere Aufhören der Menſtruation bedingen, iſt vorzüglich der Erſchöpfung reproduktiver Thätigkeit, durch akute oder chroniſche Krankheiten, unter welchen vorzüglich die mannichfachen Unterleibsleiden durch die im höhern Alter ſo oft eintretenden Unordnungen im Pfortaderſyſtem zu erwähnen ſind, oder durch ungünſtige äußere Verhältniſſe, ungeſunde Luft und Nahrung, durch Gemüthsleiden u. ſ. w., zu gedenken. Hier iſt das Außenbleiben der Menſtruation bloß Symptom der allgemeinen Krankheit, und kann auch an und für ſich einer beſondern Behandlung nicht unterworfen ſeyn. — Es iſt ſonach für alle Fälle zu zeitig verſchwindender Menſtruation eine genaue Unterſuchung des Zuſtandes der Geſchlechtsorgane ganz vorzüglich wichtig, um ſowohl die Prognoſe als den Punkt, auf welchen die ärztliche Hülfsleiſtung zu wirken habe, näher zu beſtimmen.

§. 631.

Rückſichtlich der Behandlung iſt auch hier ganz vorzüglich vor dem bloß ſymptomatiſchen Verfahren zu warnen, welches darauf ausgeht, nur den Blutfluß ſelbſt wiederum durch Anwendung treibender Mittel u. ſ. w. hervorzurufen; vielmehr muß es der Hauptzweck des Arztes bleiben, das Gleichgewicht allgemeiner organiſcher Thätigkeit wiederherzuſtellen, örtliche Krankheiten der Geſchlechtsorgane nach oben angegebenen Regeln möglichſt zu beſeitigen, und dann unter einem angemeſſenen Verhalten der Kranken abzuwarten, ob die periodiſche Blutausſcheidung noch für einige Zeit wieder-

kehre oder nicht, in welchem letztern Falle sodann gewöhnlich nur die Vermeidung von allen das Gefäß- und Nervensystem gewaltsam erregenden Einflüssen das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten vermag.

II. Von der zu lange fortdauernden Menstrualfunction.

§. 632.

Auch diese Regelwidrigkeit läßt sich, gleich der vorhergehenden, nicht nach einem gewissen Lebensalter, sondern nach der Rückwirkung auf das allgemeine Befinden definiren, und steht in sofern namentlich der zu reichlichen oder zu häufigen Menstruation nahe.

§. 633.

Die krankhafter Weise zu lange fortdauernde Menstruation kann vorzüglich in dreifacher Hinsicht verursacht werden: entweder durch allgemeine Vollsaftigkeit in Folge sehr reichlich nährender Diät und sitzender Lebensweise, wobey durch die Menstruation selbst zwar für den Augenblick Erleichterung geschafft wird, aber zugleich durch die öfters wiederkehrenden Congestionen nach den Geschlechtsorganen passive Blutungen und vielfältige Degenerationen vorbereitet werden; oder die andauernde Menstruation wird bedingt durch sehr erhöhte Erregbarkeit der Geschlechtsorgane, welche die Folge ist einer im Allgemeinen sehr reizbaren Constitution, oder einer reizenden, erhitzenden Diät, oder ausschweifender Lebensart; oder endlich, es sind organische Krankheiten der Geschlechtstheile und namentlich des Uterus vorhanden (wohin vorzüglich die fehlerhaften Lagen und die schwammige Auflockerung seiner Substanz gehören), welche diese andauernden periodischen Blutergießungen bedingen.

§. 634.

Die Folgen des durch die letztern beiden Ursachen bedingten verlängerten Menstrualflusses sind gewöhnlich weit eindringender und gefährlicher, als des durch die erstere veranlaßten; sie bestehen in Entkräftung, Störung der Verdauungsfunction, Schleimflüssen, Wassersuchten, Fieberbewegungen u. s. w., ja sie geben wohl zu wahren Metrorrhagien Veranlassung und können unmittelbar tödtlich werden.

§. 635.

Die Behandlung muß gänzlich den genannten Ursachen entsprechen, darf daher nie direkt die Unterdrückung dieser Blutergießung sich zum Zweck machen, und muß daher ganz nach den Grundsätzen eingeleitet werden, welche wir oben bey der zu reichlichen Menstruation ausführlich erörtert haben.

§. 636.

Auch die im hohen Alter sich zuweilen von neuem zeigende Menstruation ist nach ähnlichen Grundsätzen zu betrachten, wie die zu lange anhaltende, und fordert mit dieser eine ziemlich gleiche Behandlung. —

Im Allgemeinen kann man übrigens behaupten, daß alle die genannten regelwidrigen Erscheinungen der Menstrualfunction im höhern Alter, außer insofern sie durch andere, namentlich organische Krankheiten der Geschlechtstheile veranlaßt sind, nicht leicht Statt finden werden, wenn das Weib bey Annäherung der klimakterischen Jahre die Regeln der Hygiastik, welche früher überhaupt, und für diese Periode insbesondre aufgeführt sind (§. 111 u. f. §. 130. 132.), sorgfältig beobachtet; so wie hinwiederum auch die Berücksichtigung der Diät und des Regimens oben an steht, wenn es zur Aufgabe wird, entstandene Regelwidrigkeiten dieser Art zu beseitigen.

Erklärung

der zum ersten Theile gehörigen Tafel I.

Fig. I. Die innern Genitalien eines neugebornen Mädchens. — a. b. Gebärmuttergrund und Körper; b. c. Mutterhals; d d. Mutterröhren; e e. Ovarien; f. Mutterscheide; g g. runde Mutterbänder; h h. breite Mutterbänder.

Fig. II. Der hochschwangere Uterus, in welchem der äußerste Grad der Entwickelung dieses Organs, wo es fast ganz Gebärmutterkörper ist, und der Mutterhals beynahe verschwunden ist, im Gegensatz zur Fig. I., wo der Gebärmutterkörper noch der kleinste Theil ist, sich darstellt. — a. Gebärmuttergrund; b. Gebärmutterkörper; c. Muttermund mit einem kleinen Ueberrest des Mutterhalses; d. Vagina; e e. runde Mutterbänder.

Fig. III. Darstellung der obern Oeffnung des kleinen weiblichen Beckens. Sie bildet einen Kreis, von welchem durch das Einspringen des Vorbergs a ein mondsichelförmiger Theil abgeschnitten wird. — a b. Conjugata; c d. Querdurchmesser. e f, g h schräge Durchmesser.

Fig. IV. Darstellung der mittleren Oeffnung der Höhle des kleinen Beckens. Sie bildet einen Kreis, welchem durch die Einbiegung des Kreuzbeins ein mondsichelförmiger Abschnitt zugesetzt wird. a b. gerader, c d. Querdurchmesser.

Fig. V. Darstellung des Ausganges vom kleinen Becken. Er bildet einen Kreis, von welchem durch das Einspringen des Schwanzbeins (außer der Geburtsperiode) ein Stück weggenommen wird; a b. gerader, c d. Querdurchmesser.

Fig. VI. Senkrechter Durchschnitt der Höhle des kleinen Beckens: a b. Kreuzbein; b c. Schwanzbein; d f. Schamfuge. — d a. Conjugata, e g. gerader Durchmesser der Beckenhöhle, f c. gerader Durchmesser des Beckenausganges; h i. Axe der obern Beckenapertur; l m. Axe der untern Beckenapertur; k. Winkel, wo sich beide Axen schneiden; i l. Abschnitt des mit der Hälfte des geraden Durchmessers der Beckenhöhle beschriebenen Kreises, welcher die eigentliche Führungslinie der Beckenkrümmung darstellt, x y. Horizont; v z. Perpendikularlinie des weiblichen Körpers.

Fig. VII. Oſiander's Hysterotom. Die Länge des Ganzen 11 Zoll; a b. messingene Scheide; c d. zwey Messer einzeln oder zusammen hervorzuschieben durch den Drücker; e f. Handgriff von Ebenholz.

Fig. VIII. Sauter's Instrument zum Unterbinden der Gebärmutterpolypen; a b. die fischbeinernen Conductoren, welche 9 Zoll lang sind; h. Schnur von Paternosterkügelchen, deren unterstes und oberstes von Rindshorn gearbeitet, mit zwey Oeffnungen versehen und für die Unterbindungsschnur etwas ausgeschnitten sind; f. oberstes, g. unterstes Kügelchen; d. Polypenwurzel; e. Polyp.

Fig. IX. Levret's ungestielter eyförmiger Mutterkranz aus Kork mit Wachsmasse überzogen.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Maasstab für Fig. II bis VI.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. VII.



Fig. XI.

Fig. XII.

Fig. XVII.



Fig. VIII.



Carus del.

J.F. Schröter sc.

Fig. X. Hunold's ungestielter elastischer Mutterkranz aus einem Fischbeinringe mit einem Netze von Haaren.

Fig. XI. Zeller's gestielter Mutterkranz aus Holz.

Fig. XII. Juville's ungestielter elastischer Mutterkranz aus einer Flasche von elastischem Harz, mit einem eingelegten kleinen goldenen Trichter (a), unten mit einem Bande versehen (b).

Verbesserungen.

Seite 20. §. 38. Zeile 4 von oben statt geraden lies gerade.
* — 43. Z. 21. v. oben st. Nervensystem l. Gefäßsystem.
— 88. — 1. v. oben st. Schmidtmüller l. Schmidmüller.
— 101. — 2. v. oben st. anlasse l. veranlasse.
— 118. — 2. v. oben st. hiezu l. hinzu.
— 124. §. 165. Z. 5. v. oben st. Gemürhs l. Gemüths.
— 137. §. 183. Z. 9. v. oben st. verrögerte l. verzögerte.
* — 193. in der Note † Z. 2. v. u. st. Seherabgabe l. Sehergabe.
— 205. §. 266. Z. 10. v. oben st. Mittle l. Mittel.
— 211. §. 272. Z. 6. v. oben st. in den l. den.
* — 211. in d. Note Z. 1. v. oben st. Organismus l. Magnetismus.
— 268. §. 344. letzte Z. st. Schmerzens l. Schmerzes.
— 297. Z. 2. v. oben st. wenn sie sich l. wenn sie.
— 322. §. 416. Z. 4. st. *) l. **)
* — 399. §. 530. Z. 3. v. oben st. Mittelfleischbruch l. Mutterscheidenbruch.
— 406. §. 542. Z. 2. v. u. st. *) l. **)
— 440. Z. 6. v. oben st. grstört l. gestört.

Die mit einem * bezeichneten Druckfehler bittet man vorzüglich als sinnentstellend, vor dem Lesen zu verbessern.

Den Freunden der vergleichenden Anatomie

zeige ich hiedurch an, daß in meinem Verlage ein neues umfassendes Werk über diese Wissenschaft erschienen ist, unter dem Titel:

Lehrbuch der Zootomie,

mit steter Hinsicht auf Physiologie ausgearbeitet, und durch 20 Kupfertafeln erläutert.

von

D. C. G. Carus,

Professor der Entbindungskunde zu Dresden.

gr. 8. 1818. Preis 6 Thlr. 16 Gr.

Der Herr Verfasser, bekannt namentlich durch eine mit allgemeinem Interesse aufgenommene Schrift über das Nervensystem, giebt hierin die Geschichte der einzeln organischen Systeme nach ihrer Entwickelung in der Stufenfolge thierischer Geschöpfe, von der niedrigsten Bildung bis zum Menschen, so zwar, daß, obwohl eine Kenntniß menschlicher Anatomie vorausgesetzt ist, demohnerachtet überall das Ausgezeichnete menschlicher Bildung hervorgehoben wird. Wie demnach auf der einen Seite im Werke selbst, die Vervollkommnung der Organisation nach den einzelnen Gebilden verfolgt, und zugleich die individuelle Entwickelung des Thierkörpers in den verschiedenen Gattungen dargestellt ist, so liefern auf der andern Seite die beigefügten Kupfertafeln (mit ihren Erklärungen ein eigenes in 4to ausmachendes Heft) eine leichtfaßliche Uebersicht der verschiedenartigen thierischen Organisation nach den einzelnen Klassen. Man findet nämlich die 1. Tafel ausschließend der Anatomie der Pflanzenthiere, die 2 — 4. der der Weichthiere, die 5 — 7. der der Gliederthiere (Würmer, Crustaceen und Insekten), die

8 — 10. der der Fische, die 11 — 13. der der Amphibien, die 14 — 16. der der Vögel, die 17 — 20. der der Säugthiere bestimmt; wobei noch zu bemerken, daß diese zwanzig vom Verfasser selbst gezeichneten und in Umrissen gestochenen Tafeln 331 Figuren enthalten, von welchen 200 neu nach der Natur entworfen wurden.

Gerhard Fleischer der Jüngere
Buchhändler in Leipzig.